



Nationellt kvalitetsregister för
öron-, näs- och halssjukvård

Nationellt kvalitetsregister
öron-, näs- och halssjukvård

Datarapport 2015



SVENSK ÖNH-TIDSKRIFT
*Svensk förening för otorhinolaryngologi
huvud- och halskirurgi*



Taylor & Francis
Taylor & Francis Group



INNEHÅLL

INLEDNING

| | |
|--|-----|
| Joacim Stalfors, registerhållare | 3 |
| Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi | 5 |
| Registret för otoskleroskirurgi | 9 |
| Otosklerosregistret och Myringo- ossikuloplastikregistret | 11 |
| Myringo- och Ossikuloplastikregistret..... | 14 |
| Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan..... | 24 |
| Septumplastikregistret | 31 |
| Tonsilloperationsregistret | 37 |
| Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna | 261 |
| Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering..... | 264 |

DATARAPPORT 2015

STATISTIK

Bengt Bengtsson, Statistiska konsultgruppen
Jan Ekelund, Registercentrum Västra Götaland

REDAKTION

Redaktör: Joacim Stalfors
Projektledning: Lisa Hellgård
Kontaktinformation:
Lisa Hellgård
Registercentrum Västra Götaland
417 45 Göteborg
Tel. 072-516 90 50
lisa.hellgard@registercentrum.se
joacim@stalfors.se

FÖRLAG

Svensk ÖNH-tidskrift utges av
Taylor & Francis AB

Kontaktinfo – förlag
Per Sonnerfeldt
Box 3255
103 65 Stockholm
Tel: 08-440 80 40
Fax: 08-440 80 50
per.sonnerfeldt@informa.com

TRYCK:

Åtta.45 Tryckeri AB

Kvalitetsregister kan bidra till att göra vården bättre

Kvalitetsregister beskriver resultatet av olika behandlingar. Genom att studera skillnader i resultat kan insikter fås som kan bidra till förbättringar i vården, vilket är det övergripande syftet med våra kvalitetsregister.

AV JOACIM STALFORS

Kvalitetsregister beskriver resultatet av olika behandlingar. Genom att studera skillnader i resultat kan insikter fås som kan bidra till förbättringar i vården, vilket är det övergripande syftet med våra kvalitetsregister.

Sedan förra årsrapporten publicerades har samtliga nio ÖNH-kvalitetsregister utvecklats starkt. Många register förväntas få så hög täckningsgrad att data i hög grad kan anses spegla den kliniska verksamheten. Detta är resultatet av ett gediget arbete som utförts lokalt av läkare, sjuksköterskor och sekreterare. Tack till er alla!

Nu har flera av våra delregister tillräcklig mängd data för att kunna analysera variation i utfall och studera vad som bidrar till olika resultat. Det är viktigt att data från delregistren finns tillgängligt för lokal analys och detta finns sammanställt i denna datarapport.

ÖNH-kvalitetsregister är ett utskott i SFOHH och därför vår gemensamma angelägenhet. Genom registren har vi en unik möjlighet att definiera begreppet kvalitet och hur denna ska mätas, men det fodrar även att vi arbetar med frågan! För varje register finns en referensgrupp som gör ett viktigt arbete med att analysera data, förvalta och utveckla registret samt ha kontakt med verksamheterna. Tyvärr ser jag en oroande trend att verksamheter i högre grad har svårt att låta sina medarbetare arbeta med kvalitetsregister. Om professionen ska få fortsatt förtroende att sköta kvalitetsregister måste denna fråga adresseras. På klinikerna rekommenderas att verksamhetens resultat studeras med frågeställningen ”Är vi så bra som möjligt?”. Om svaret är ”nej” rekommenderas initiering av förbättringsarbete. Genom ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete kan säkert alla kliniker i landet få lika bra resultat som de bästa, och det måste vara målet med vårt utvecklingsarbete. För att kvalitetsuppföljning skall fungera behöver förutsättningar för detta skapas lokalt. Naturligtvis kostar detta en slant, men är det verkligen billigast att inte ha någon kvalitetsuppföljning?



Vi befinner oss i slutet av en medveten satsning på kvalitetsregister. Under åren 2012 till 2016 har staten och landsingen satsat cirka 1,5 miljarder på kvalitetsregister. Detta har möjliggjort en professionalisering för ÖNH-kvalitetsregistren och alla register har nu en modern IT-plattform, ny hemsida och spännande projekt på gång. Ett urval av frågeställningar som belysts med hjälp av registerdata är:

- patienternas upplevda nytta av hörapparat
- hur risken för postoperativ blödning efter tonsillektomi kan reduceras
- hur indikationer tillämpas vid operation av godartade stämbandsförändringar
- följsamhet till rekommendationen att barn som opereras med rör pga nedsatt hörsel verkligen hörseltestas före och efter ingreppet.
- smärtbehandling i samband med tonsilloperation hos barn och ungdomar

För 2017 finns inget avtal för finansieringen ännu klart. Mycket talar för en minskning av budgeten med 15 %, vilket ger hyfsade förutsättningar men kommer kräva prioriteringar. Alla är eniga om att kvalitetsregistren har ett mycket stort värde för sjukvårdens utveckling men regeringen och SKL har ännu inte kommit överens om hur finansieringen ska ske långsiktigt efter 2017.

Se registerdata som vår gemensamma skatt. Våra delregister blir i allt högre utsträckning mogna att använda för verksamhetsbeskrivning, förbättringsprojekt och forskning. Det

är glädjande att se hur registren har bidragit till både forskning och ST-kvalitetsprojekt. Hittills har registerdata från våra kvalitetsregister bidragit till:


- 10 publicerade vetenskapliga publikationer
- Cirka 20 pågående vetenskapliga arbeten
- Registerdata används i 6 doktorandprojekt
- Minst 23 genomförda ST-kvalitetsprojekt
- Minst 7 pågående ST-kvalitetsprojekt

Varje klinik äger sin egen data. Tillgång till expertis från respektive referensgrupp finns alltid för att få stöd eller hjälp i analyser. Om någon önskar tillgång till nationella registerdata för forskning rekommenderas kontakt med respektive referensgrupp för beskrivning av hur den processen går till.

Till sist vill jag uppmärksamma alla på vår nya hemsida på www.orlqualitysweden.se. Där finner du såväl information om registren som resultat.

Joacim Stalfors

Registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård



Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi 2015

Efter stämbandskirurgi i röstförbättrande syfte har patienter historiskt sett uppmanats till röstvila. Denna rekommendation har inte vilat på vetenskap utan mer på beprövad erfarenhet. I Skåne har man under flera år haft en annan hållning till röstvila postoperativt. Patienterna

sjukskrivs men får instruktioner om att tala som vanligt. Nedan visas patienternas egen uppfattning hur de använt rösten efter operation av stämbandspolyp. De fem kliniker som registrerat flest patienter redovisas här.




Fig 1.




Fig 2.

I figur 2 redovisas patientens egenskattning av röstförändring samt röst användning efter operation. Figuren gäller operation av stämbandspolyp och omfattar hela registrets patientmaterial sedan 2009.

Syftet med fonokirurgi är att med operation förbättra patientens egen upplevelse av röstbesvär. För att mäta denna används ett egenskattningsinstrument, Voice Handicap 10. Patienten får i 10 frågor skatta sin röst innan och 4 månader efter operation. Höga poäng betyder stora besvär. Efter operationen skattar patienten även sin upp-




Fig 3.

levda röstförändring som: mycket bättre, bättre, oförändrad, sämre eller mycket sämre. I figur 3 illustreras hur de patienter som har små besvär preoperativt (max VHI 8) tenderar att vara mindre nöjda efter operation än de som har större besvär (minst VHI 9) innan operationen.

Registret omfattar 6 diagnoser. Det finns också möjlighet att registrera annan diagnos. Nöjdhetsgraden i patienternas egenskattning 4 månader postoperativt ligger för specificerad diagnos kring 90%. Se fig 4.




Fig 4.

Täckningsgrad 2015

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

Täckningsgraden är ett mått på hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns i kvalitetsregistret. Med avsedda populationen menas alla patienter som behandlats i Sverige under 2015 och som uppfyller kvalitetsregistrets inklusionskriterier.

Täckningsgrad beräknad på PAR (Socialstyrelsens Patientregister)

Vad visar tabellen?

Kolumnerna visar:

Kvalitetsregister – antalet patienter i kvalitetsregistret, och vilken andel patienterna i kvalitetsregistret utgör av den avsedda populationen (här beräknas det som antalet i kvalitetsregister + antalet i PAR). Detta är kvalitetsregistrets täckningsgrad.

Patientregistret – antalet patienter i PAR (Patientregistret), och vilken andel patienterna i PAR utgör av den avsedda populationen (här beräknas det som antalet i kvalitetsregister + antalet i PAR).

Matchar – antalet patienter som återfinns i både kvalitetsregistret och PAR, och vilken andel detta antal utgör av den avsedda populationen (här beräknas det som antalet i kvalitetsregister + antalet i PAR).

Totalt – antalet patienter i kvalitetsregistret + antalet patienter i PAR. I tabellen sätts detta antal som den avsedda populationen.

Täckningsgradsjämförelse - Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi vs Patientregistret 2015 | Totalt

| | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt |
|--|-------------------|------|------------------|------|---------|------|--------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal |
| RIKET | 60 | 40,8 | 118 | 80,3 | 31 | 21,1 | 147 |
| 01 Stockholm | 29 | 60,4 | 40 | 83,3 | 21 | 43,8 | 48 |
| Karolinska universitetssjukhuset Hudding | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Karolinska universitetssjukhuset Solna | 29 | 67,4 | 35 | 81,4 | 21 | 48,8 | 43 |
| 03 Uppsala | 1 | 16,7 | 6 | 100 | 1 | 16,7 | 6 |
| Akademiska sjukhuset | 1 | 16,7 | 6 | 100 | 1 | 16,7 | 6 |
| 04 Södermanland | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| Nyköpings lasarett | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| 05 Östergötland | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 |
| Universitetssjukhuset i Linköping | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Vrinnevisjukhuset | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| 06 Jönköping | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 |
| Länssjukhuset Ryhov | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 |
| 08 Kalmar | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Västerviks sjukhus | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| 09 Gotland | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Visby lasarett | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 10 Blekinge | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blekingesjukhuset | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 Skåne | 3 | 16,7 | 17 | 94,4 | 2 | 11,1 | 18 |
| Helsingborgs lasarett | 2 | 66,7 | 3 | 100 | 2 | 66,7 | 3 |
| Kristianstads sjukhus | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skånes universitetssjukhus | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Skånes universitetssjukhus Lund | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| Skånes universitetssjukhus Malmö | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 |
| Ystads lasarett | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Halland | 4 | 80 | 2 | 40 | 1 | 20 | 5 |
| Hallands sjukhus Halmstad | 4 | 80 | 2 | 40 | 1 | 20 | 5 |
| 14 Västra Götaland | 10 | 55,6 | 9 | 50 | 1 | 5,6 | 18 |
| Lundby sjukhus | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NU-sjukvården | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | 1 | 16,7 | 6 | 100 | 1 | 16,7 | 6 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 5 |
| 17 Värmland | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| Karlstads sjukhus | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| 18 Örebro | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| 19 Västmanland | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| Västerås lasarett | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| 20 Dalarna | 8 | 50 | 11 | 68,8 | 3 | 18,8 | 16 |
| Falu lasarett | 8 | 50 | 11 | 68,8 | 3 | 18,8 | 16 |
| 21 Gävleborg | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Gävle sjukhus | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| Hudiksvalls sjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 22 Västernorrland | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Sundsvalls sjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Västerbotten | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| Norrlands universitetssjukhus | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| 25 Norrbotten | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Sunderbyns sjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |

Källa: FONO-registret (ÖNH), Patientregistret.
 REGISTERSERVICE
 registerservice@socialstyrelsen.se
 2016-12-08

Täckningsgrad för Otosklerosregistret

Täckningsgraden är ett mått på hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns i kvalitetsregistret. Med avsedda populationen menas alla patienter som behandlats i Sverige under 2015 och som uppfyller kvalitetsregistrets inklusionskriterier.

Otosklerosregistret har i år valt att beräkna sin täckningsgrad med två olika datakällor. Detta för att det är svårt att hitta exakt motsvarande målpopulationer i datakällorna, dvs operationerna kan redovisas på olika sätt och man riskerar därför att missa operationer till målpopulationen. Med täckningsgrad för otosklerosregistret avses andelen stigbygeloperationer utförda på patienter enbart med diagnosen otoskleros. I täckningsgraden beräknad på Socialstyrelsens patientregister medtas stigbygeloperationer utförda på patienter även med andra diagnoser än otoskleros.

De två olika analyserna hamnar dock nära varandra i resultat, och det borde vara ett tecken på att den sanna täckningsgraden ligger på drygt 80 %.

Täckningsgrad beräknad på PAR (Socialstyrelsens Patientregister)

Vad visar tabellen?

Kolumnerna visar:

Kvalitetsregister – antalet patienter i kvalitetsregistret, och vilken andel patienterna i kvalitetsregistret utgör av den avsedda populationen (här beräknas det som antalet i kvalitetsregister + antalet i PAR). Detta är kvalitetsregistrets täckningsgrad.

Patientregistret – antalet patienter i PAR (Patientregistret), och vilken andel patienterna i PAR utgör av den avsedda populationen (här beräknas det som antalet i kvalitetsregister + antalet i PAR).

Täckningsgrad beräknad på SÖF (Svensk Öronkirurgisk Förening)

Vad visar tabellen?

Kolumnerna visar:

Enkät A: Otosklerosregistret – 2015 – antalet registrerade patienter i kvalitetsregistret under 2015.

Svensk Öronkirurgisk Förening 2015 – antalet rapporterade operationer (enligt kvalitetsregistrets inklusionskriterier) i föreningens statistik över genomförda operationer under 2015.

Täckningsgrad – antalet registrerade i kvalitetsregistret dividerat med antalet rapporterade till SÖF.

| Enhet | Enkät A: Otoskleros Registret - 2015 | Svensk Öronkirurgisk Förening 2015 | Täckningsgrad |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Akademiska sjukhuset | 48 | 53 | 90 % |
| Blekingesjukhuset | 2 | 2 | 100 % |
| Centrallasarettet Växjö | 1 | 1 | 100 % |
| Centralsjukhuset Kristianstad | 3 | 12 | 25 % |
| Centralsjukhuset i Karlstad | 11 | 11 | 100 % |
| Falu lasarett | 19 | 21 | 90 % |
| Gävle sjukhus | 6 | 14 | 42 % |
| Halmstad sjukhus | 3 | 8 | 37 % |
| Helsingborgs lasarett | 1 | 2 | 50 % |
| Karolinska Universitetssjukhuset | 96 | 111 | 86 % |
| Länssjukhuset i Kalmar | 6 | 6 | 83 % |
| NU-sjukvården, Trollhättan | 4 | 4 | 100 % |
| Norrbottnens läns landsting | 10 | 12 | 83 % |
| Norrlands Universitetssjukhus | 8 | 8 | 100 % |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | 36 | 41 | 87 % |
| Skåne Universitetssjukhus, Lund, Malmö | 15 | 28 | 53 % |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | 0 | 5 | 0 % |
| Universitetssjukhuset i Linköping | 17 | 19 | 89 % |
| Universitetssjukhuset Örebro | 10 | 10 | 100 % |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 2 | 3 | 66 % |
| Örnsköldsviks sjukhus | 27 | 30 | 90 % |
| Total | 325 | 394 | 82 % |

| | Kvalitetsregister | | Patientregistret | |
|---|-------------------|------|------------------|------|
| | Antal | % | Antal | % |
| RIKET | 328 | 80,8 | 378 | 93,1 |
| 01 Stockholm | 96 | 85,7 | 106 | 94,6 |
| Karolinska universitetssjukhuset Solna | 96 | | 104 | 94,5 |
| Lewis D A - Läkarmottagning o hälsotjän | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 03 Uppsala | 49 | 81,7 | 54 | 90 |
| Akademiska sjukhuset | 49 | 81,7 | 54 | 90 |
| 05 Östergötland | 17 | 89,5 | 16 | 84,2 |
| Universitetssjukhuset i Linköping | 17 | 89,5 | 16 | 84,2 |
| 07 Kronoberg | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Centrallasarettet i Växjö | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 08 Kalmar | 6 | 75 | 8 | 100 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 6 | 100 | 6 | 100 |
| Västerviks sjukhus | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 09 Gotland | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Visby lasarett | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 10 Blekinge | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Blekingesjukhuset | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 12 Skåne | 20 | 51,3 | 38 | 97,4 |
| Helsingborgs lasarett | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Kristianstads sjukhus | 3 | 30 | 9 | 90 |
| Skånes universitetssjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Skånes universitetssjukhus Lund | 11 | 64,7 | 17 | 100 |
| Skånes universitetssjukhus Malmö | 5 | 50 | 10 | 100 |
| 13 Halland | 3 | 33,3 | 9 | 100 |
| 42020 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Hallands sjukhus Halmstad | 3 | 37,5 | 8 | 100 |
| 14 Västra Götaland | 40 | 80 | 49 | 98 |
| NU-sjukvården | 4 | 100 | 4 | 100 |
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | 36 | 87,8 | 40 | 97,6 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 17 Värmland | 11 | 100 | 9 | 81,8 |
| Karlstads sjukhus | 11 | 100 | 9 | 81,8 |
| 18 Örebro | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 |
| 19 Västmanland | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Västerås lasarett | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 20 Dalarna | 19 | 90,5 | 18 | 85,7 |
| Falu lasarett | 19 | 90,5 | 18 | 85,7 |
| 21 Gävleborg | 7 | 58,3 | 9 | 75 |
| Gävle sjukhus | 7 | 58,3 | 9 | 75 |
| 22 Västernorrland | 27 | 96,4 | 27 | 96,4 |
| Örnsköldsviks sjukhus | 27 | 96,4 | 27 | 96,4 |
| 24 Västerbotten | 8 | 88,9 | 9 | 100 |
| Norrlands universitetssjukhus | 8 | 88,9 | 9 | 100 |
| 25 Norrbotten | 10 | 90,9 | 11 | 100 |
| Sunderbyns sjukhus | 10 | 90,9 | 11 | 100 |
| Sundsvalls sjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 24 Västerbotten | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Norrlands universitetssjukhus | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 25 Norrbotten | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Sunderbyns sjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 |

Källa: FONO-registret (ÖNH), Patientregistret.
REGISTERSERVICE
registerservice@socialstyrelsen.se
2016-12-05

Undersökning om nyttan av Otosklerosregistret och Myringo- och ossikuloplastikregistret

De två öronkirurgiska registren, otoskleros- och myringo-ossikuloplastikregistren genomförde under våren en webundersökning riktad till de svenska öronkirurgerna som är medlemmar i svensk Öronkirurgisk förening (SÖF). Syftet var att få en uppfattning om nyttan och användningen av de två registren. Utskick via e-post med kopplad enkät (13 frågor) gjordes till samtliga medlemmar i SÖF och svarsfrekvensen blev ca 50 %.

KARIN STRÖMBÄCK OCH P.O. ERIKSSON

Glädjande nog svarade hela 90 % att man ansåg det viktigt eller mycket viktigt att klinikerna registrerar i de otokirurgiska registren (Fig 1.)! Det visar sig att 60 % svarar att man har laddat ner eller tagit del av den egna klinikkens otokirurgiska registerdata det senaste året (Fig 2)! Men när vi tolkar svaren antyder dessa att en bättre och enklare hemsida kunde ha förenklad möjligheterna till att hämta hem klinikkens data.

Öronkirurgerna har en mer blandad uppfattning över nyttan och verktyget som kvalitetsregistret utgör för att kunna följa ingrepp. Femtio procent uppger nytta registerdata för uppföljning av operationer, men 31 % använder inte registren (Fig 3). Kanske använder kirurgerna egna databaser för att följa sina resultat? De två registren har också olika uppföljnings och återrapporteringsfrekvenser.




Fig 1. Närmare 90% av de svarande öronkirurgerna instämmer i påståendet att det är viktigt att vi registrerar i de otokirurgiska registren.




Fig 2. Ungefär 60% av de svarande anger att man har laddat ned, eller tagit del av den egna klinikkens resultat från myringo- och/eller ossikuloplastikregistret.

Otosklerosregistret har en hög täckningsgrad och tillfredsställande inrapportering av data efter återbesök (69 %). Dessutom finns inrapporterade data sedan 2004, vilket underlättar kvalitetsjämförelse över tid men också mellan kliniker.

Myringo- ossikuloplastikregistret begränsas av att det nystartade 2013 och att det nu endast kan rapportera resultat från ingrepp utförda före februari 2015 för att ge möjlighet till klinikerna att hinna med återbesök. Glädjande har många kliniker en uppföljningsfrekvens på över 80 %, men enstaka kliniker med mycket låg uppföljningsfrekvens sänker medelvärdet. Detta år kommer








Fig 3. I påståendet "Jag har nytta av de otokirurgiska registren för att följa upp mina operationsresultat", varierar uppfattningen bland svarande öronkirurger. Femtio procent anger nytta och 31% anger ingen eller liten nytta av registren för uppföljning av resultaten.

myringo- ossikuloplastikregistret för första gången att redovisa kliniks specifika resultat i den kommande digitala årsrapporten.

De otokirurgiska registrens mål är att klinikerna ska kunna använda data för utvecklingsarbete eller ST-projekt i en ökad omfattning i framtiden. Idag framgår det av enkätundersökningen att detta görs bara i en liten omfattning. Lättillgänglig data och goda återrapporteringar av återbesök och patientenkäter bör kvalitetsregistren eftersträva! En vanligt förekommande uppfattning är att klinikerna inte hinner med sina återbesök och att detta försämrar möjligheten till att registrera data till registren. Enkätundersökningen angav det motsatta, trots att nästan 60 % av de svarande anger att patienten själv får kontakta kliniken för att boka tid för ett återbesök anger över 80 % att man hinner med återbesöken "ganska ofta" eller "de flesta".

Med anledning av svårigheten att få in patientenkäterna förhöorde vi oss också om rutinerna för distribution av dessa. Ungefär lika många svarade att man använder e-post, skickar enkäten till patienten, skickar den med kallelsen till återbesöket eller lämnar till patienten vid återbesöket.

För att veta hur det egentligen går och hur vi kan förbättra oss måste all kirurgi dokumenteras och utvärderas. Våra patienter kommer att tacka oss.



Myringo- och ossikuloplastikregistret

Täckningsgrad 2015 för Myringo- och ossikuloplastikregistret

| Enheter i registret: | Svensk öron-kirurgisk förening | Kvalitetsregister-data | Täckningsgrad fettpluggning | Svensk öron-kirurgisk förening2 | Kvalitetsregister-data3 | Täckningsgrad konventionell myringoplastik | Täckningsgrad konventionell myringoplastik och fettplugg | Svensk öron-kirurgisk förening4 | Kvalitetsregister-data5 | Täckningsgrad | Svensk öron-kirurgisk förening6 | Kvalitetsregister-data7 | Täckningsgrad myringoplastik-ossikuloplastik | Total täckningsgrad registret |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | Fettplugg | Fettplugg | | Konventionell myringoplastik | Konventionell myringoplastik | | | Ossikuloplastik | Ossikuloplastik | | Myringo-ossikuloplastik | Myringo-ossikuloplastik | | |
| Borås | 6 | 5 | 83,3 | 20 | 14 | 70,0 | 73,1 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 2 | 28,6 | 79,4 |
| Eskilstuna + Nyköping | 3 | 2 | 66,7 | 12 | 6 | 50,0 | 53,3 | 0 | 0 | | 6 | 7 | 116,7 | 66,7 |
| Falun | 3 | 3 | 100,0 | 32 | 29 | 90,6 | 91,4 | 2 | 1 | 50,0 | 7 | 10 | 142,9 | 93,2 |
| Gävle | 5 | 3 | 60,0 | 12 | 6 | 50,0 | 52,9 | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 2 | 33,3 | 68,0 |
| Gbg SU | 16 | 15 | 93,8 | 65 | 48 | 73,8 | 77,8 | 10 | 1 | 10,0 | 2 | 2 | 100,0 | 80,6 |
| Halmstad | 1 | 6 | 600,0 | 20 | 19 | 95,0 | 119,0 | 5 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 33,3 | 113,8 |
| Hudiksvall | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,0 |
| Helsingborg | 2 | 3 | 150,0 | 16 | 14 | 87,5 | 94,4 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 200,0 | 96,0 |
| Jönköping | 0 | 0 | | 25 | 26 | 104,0 | 104,0 | 4 | 3 | 75,0 | 7 | 7 | 100,0 | 102,8 |
| Kalmar | 6 | 4 | 66,7 | 14 | 16 | 114,3 | 100,0 | 0 | 1 | | 3 | 2 | 66,7 | 100,0 |
| Karlskrona | 3 | 4 | 133,3 | 15 | 10 | 66,7 | 77,8 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 133,3 | 81,8 |
| Karlstad | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7 | 91,7 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 3 | 75,0 | 94,7 |
| Kristianstad | 0 | 0 | | 20 | 12 | 60,0 | 60,0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 25,0 | 69,2 |
| Linköping | 0 | 0 | | 40 | 29 | 72,5 | 72,5 | 9 | 4 | 44,4 | 9 | 8 | 88,9 | 81,0 |
| Lund-Malmö | 5 | 4 | 80,0 | 43 | 34 | 79,1 | 79,2 | 18 | 1 | 5,6 | 17 | 9 | 52,9 | 88,0 |
| NU-sjukv | 7 | 5 | 71,4 | 9 | 8 | 88,9 | 81,3 | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 5 | 166,7 | 85,7 |
| Skövde | 9 | 3 | 33,3 | 18 | 13 | 72,2 | 59,3 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 59,3 |
| Sthlm Karolinska | 16 | 7 | 43,8 | 219 | 140 | 63,9 | 62,6 | 51 | 10 | 19,6 | 57 | 38 | 66,7 | 74,3 |
| Sunderbyn | 0 | 0 | | 27 | 21 | 77,8 | 77,8 | 2 | 1 | 50,0 | 5 | 6 | 120,0 | 82,4 |
| Sundsvall | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 5 | 83,3 | 57,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 57,1 |
| Umeå | 0 | 0 | | 31 | 27 | 87,1 | 87,1 | 7 | 3 | 42,9 | 3 | 1 | 33,3 | 90,2 |
| Uppsala | 2 | 1 | 50,0 | 57 | 41 | 71,9 | 71,2 | 26 | 6 | 23,1 | 13 | 9 | 69,2 | 82,7 |
| Västerås | 3 | 3 | 100,0 | 11 | 10 | 90,9 | 92,9 | 5 | 1 | 20,0 | 0 | 1 | | 94,7 |
| Växjö | 2 | 2 | 100,0 | 15 | 12 | 80,0 | 82,4 | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 133,3 | 87,5 |
| Örebro | 0 | 0 | | 16 | 19 | 118,8 | 118,8 | 2 | 1 | 50,0 | 5 | 4 | 80,0 | 113,0 |
| Ö-vik | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7 | 91,7 | 8 | 2 | 25,0 | 12 | 6 | 50,0 | 95,5 |
| Östersund | 2 | 1 | 50,0 | 14 | 5 | 35,7 | 37,5 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0,0 | 44,4 |
| summa: | 103 | 74 | 71,8 | 793 | 597 | 75,3 | 74,9 | 170 | 40 | 23,5 | 182 | 135 | 74,2 | 67,8 |

Registret för Myringo- ossikuloplastik

redovisar antalet utförda ingrepp mellan oktober 2013 och 31:a januari 2015. Från dessa operationer redovisas samtliga registrerade återbesök, läknings- och hörselresultat per klinik. Ingrepp utförda efter januari 2015 redovisas inte till följd av för kort uppföljningstid. Datauttag utfört 6:e augusti 2016.

Vid flera kliniker redovisas få operationer, antingen till följd av låg operationsvolym eller till följd av bristande täckningsgrad till registret. Även antalet registrerade återbesök varierar vid de olika klinikerna. Flera enheter med stor operationsvolym redovisar en låg uppföljning. Referensgruppen rekommenderar därför försiktighet i tolkningen av resultaten och uppmanar till ökad registrering av utförda ingrepp för att nå förbättrad täckningsgrad samt till ökad registrering av återbesöks- och patientrapporter.

Antibiotikaanvändning (pre-, per- och postoperativt) vid de olika enheterna redovisas för samtliga registrerade ingrepp, oavsett typ av operation, utförda mellan oktober 2013 och 17:e augusti 2016. Stora skillnader i antibiotikaanvändning ses mellan de olika klinikerna. I nuläget har ingen analys avseende antibiotikaanvändning och operationsresultat utförts.

Den beräknade täckningsgraden redovisas på kliniknivå. Det registrerade antalet ingrepp i registret jämförs med operationsstatistiken som redovisas till Svensk öronkirurgisk förening (SÖF) 2015. Försök till täckningsgradsanalys mot Socialstyrelsens patientregister försvåras av bristande diagnossättning och svårighet att värdera om de ingreppskoder som används beskriver den utförda operationen korrekt och har därför inte utförts.

Deskriptiv statistik över läkning av trumhinna (operationer utförda 2013/10/01 - 2015/01/31) baserat på patienter med återbesök

| | Är trumhinnan hel? | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------|-----|-------|-----|-------|--------|--------|
| | Missing | | Nej | | Ja | | Totalt | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| MYR (exkl fettplugg) | 2 | 0.38 | 58 | 11.15 | 460 | 88.46 | 520 | 100.00 |
| MYR-OSS (exkl fettplugg) | 1 | 0.82 | 14 | 11.48 | 107 | 87.70 | 122 | 100.00 |
| Fettplugg | . | . | 15 | 19.23 | 63 | 80.77 | 78 | 100.00 |
| Alla | 3 | 0.42 | 87 | 12.08 | 630 | 87.50 | 720 | 100.00 |

Deskriptiv statistik över läkning av trumhinna (operationer utförda 2013/10/01 - 2015/01/31) baserat på patienter med återbesök



Återbesök inom 4 månader från operation exkluderade. Endast kliniker med minst 1 återbesök redovisas.
Läkningsresultat redovisas för grupperna MYR (exkl fettplugg), MYR-OSS (exkl fettplugg) samt fettplugg sammanslaget



| | Är trumhinnan hel? | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|--------|
| | Missing | | Nej | | Ja | | Totalt | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Akademiska sjukhuset | 1 | 1.33 | 6 | 8.00 | 68 | 90.67 | 75 | 100.00 |
| Blekingesjukhuset | . | . | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | 12 | 100.00 |
| Centrallasarettet Växjö | . | . | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | 7 | 100.00 |
| Centralsjukhuset i Karlstad | . | . | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 |
| Centralsjukhuset i Kristianstad | . | . | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 10 | 100.00 |
| Falu lasarett | . | . | 2 | 6.45 | 29 | 93.55 | 31 | 100.00 |
| Gävle sjukhus | . | . | 1 | 4.00 | 24 | 96.00 | 25 | 100.00 |
| Halmstad sjukhus | . | . | 3 | 15.00 | 17 | 85.00 | 20 | 100.00 |
| Helsingborgs Lasarett | . | . | 7 | 25.93 | 20 | 74.07 | 27 | 100.00 |
| Karolinska Universitetssjukhus | . | . | 11 | 8.03 | 126 | 91.97 | 137 | 100.00 |
| Linköpings Universitetssjukhus | . | . | . | . | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 |
| Länssjukhuset Ryhov, Jönköping | . | . | 9 | 28.13 | 23 | 71.88 | 32 | 100.00 |
| Länssjukhuset i Kalmar | . | . | 3 | 8.33 | 33 | 91.67 | 36 | 100.00 |
| Länssjukhuset i Sundsvall | . | . | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 10 | 100.00 |
| NU-sjukvården, Trollhättan | . | . | 7 | 17.50 | 33 | 82.50 | 40 | 100.00 |
| Norrbottn läns Landsting | . | . | . | . | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
| Norrlands Universitetssjukhus | . | . | . | . | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | . | . | 7 | 10.77 | 58 | 89.23 | 65 | 100.00 |
| Skaraborgs sjukhus | . | . | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 10 | 100.00 |
| Skåne Universitetssjukhus, Lund | . | . | . | . | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| Skåne Universitetssjukhus, Malmö | . | . | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 | 17 | 100.00 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | . | . | . | . | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 |
| Sörmland ÖNH | 1 | 20.00 | . | . | 4 | 80.00 | 5 | 100.00 |
| Universitetssjukhuset Örebro | . | . | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 | 17 | 100.00 |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 1 | 2.44 | 8 | 19.51 | 32 | 78.05 | 41 | 100.00 |
| Ängelholms sjukhus | . | . | . | . | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| Örnsköldsviks sjukhus | . | . | 1 | 5.26 | 18 | 94.74 | 19 | 100.00 |
| Östersunds sjukhus | . | . | . | . | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 |

Deskriptiv statistik över antibiotika per enhet

**Hela registret t.o.m. 20160817. Endast enheter med minst 1 komplett registrering av AB redovisas.
Missing redovisas ej**

| | Preoperativ AB | | | | Örat infektionsfritt | | | | Peroperativ AB | | | | Postoperativ AB | | | | Totalt | |
|----------------------------------|----------------|--------|----|-------|----------------------|-------|-----|--------|----------------|--------|----|-------|-----------------|--------|----|-------|--------|--------|
| | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Akademiska sjukhuset | 179 | 94.71 | 10 | 5.29 | 19 | 10.05 | 170 | 89.95 | 163 | 86.24 | 26 | 13.76 | 174 | 92.06 | 15 | 7.94 | 189 | 100.00 |
| Blekingesjukhuset | 44 | 91.67 | 4 | 8.33 | 7 | 14.58 | 41 | 85.42 | 46 | 95.83 | 2 | 4.17 | 47 | 97.92 | 1 | 2.08 | 48 | 100.00 |
| Centrallasarettet Växjö | 47 | 92.16 | 4 | 7.84 | 4 | 7.84 | 47 | 92.16 | 48 | 94.12 | 3 | 5.88 | 47 | 92.16 | 4 | 7.84 | 51 | 100.00 |
| Centralsjukhuset i Karlstad | 62 | 93.94 | 4 | 6.06 | 3 | 4.55 | 63 | 95.45 | 65 | 98.48 | 1 | 1.52 | 65 | 98.48 | 1 | 1.52 | 66 | 100.00 |
| Centralsjukhuset i Kristianstad | 35 | 97.22 | 1 | 2.78 | 5 | 13.89 | 31 | 86.11 | 35 | 97.22 | 1 | 2.78 | 35 | 97.22 | 1 | 2.78 | 36 | 100.00 |
| Falu lasarett | 72 | 83.72 | 14 | 16.28 | 14 | 16.28 | 72 | 83.72 | 64 | 74.42 | 22 | 25.58 | 73 | 84.88 | 13 | 15.12 | 86 | 100.00 |
| Gävle sjukhus | 52 | 94.55 | 3 | 5.45 | 3 | 5.45 | 52 | 94.55 | 48 | 87.27 | 7 | 12.73 | 45 | 81.82 | 10 | 18.18 | 55 | 100.00 |
| Halmstad sjukhus | 75 | 93.75 | 5 | 6.25 | 14 | 17.50 | 66 | 82.50 | 68 | 85.00 | 12 | 15.00 | 64 | 80.00 | 16 | 20.00 | 80 | 100.00 |
| Helsingborgs Lasarett | 51 | 96.23 | 2 | 3.77 | 1 | 1.89 | 52 | 98.11 | 48 | 90.57 | 5 | 9.43 | 50 | 94.34 | 3 | 5.66 | 53 | 100.00 |
| Karolinska Universitetssjukhus | 514 | 96.44 | 19 | 3.56 | 56 | 10.51 | 477 | 89.49 | 501 | 94.00 | 32 | 6.00 | 499 | 93.62 | 34 | 6.38 | 533 | 100.00 |
| Linköpings Universitetssjukhus | 90 | 94.74 | 5 | 5.26 | 11 | 11.58 | 84 | 88.42 | 9 | 9.47 | 86 | 90.53 | 23 | 24.21 | 72 | 75.79 | 95 | 100.00 |
| Länssjukhuset Ryhov, Jönköping | 82 | 88.17 | 11 | 11.83 | 9 | 9.68 | 84 | 90.32 | 40 | 43.01 | 53 | 56.99 | 81 | 87.10 | 12 | 12.90 | 93 | 100.00 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 65 | 98.48 | 1 | 1.52 | 3 | 4.55 | 63 | 95.45 | 65 | 98.48 | 1 | 1.52 | 65 | 98.48 | 1 | 1.52 | 66 | 100.00 |
| Länssjukhuset i Sundsvall | 22 | 95.65 | 1 | 4.35 | . | . | 23 | 100.00 | 21 | 91.30 | 2 | 8.70 | 23 | 100.00 | . | . | 23 | 100.00 |
| NU-sjukvården, Trollhättan | 59 | 86.76 | 9 | 13.24 | 9 | 13.24 | 59 | 86.76 | 67 | 98.53 | 1 | 1.47 | 66 | 97.06 | 2 | 2.94 | 68 | 100.00 |
| Norrbottn läns Landsting | 70 | 95.89 | 3 | 4.11 | 4 | 5.48 | 69 | 94.52 | 68 | 93.15 | 5 | 6.85 | 69 | 94.52 | 4 | 5.48 | 73 | 100.00 |
| Norrlands Universitetssjukhus | 55 | 85.94 | 9 | 14.06 | 12 | 18.75 | 52 | 81.25 | 37 | 57.81 | 27 | 42.19 | 50 | 78.13 | 14 | 21.88 | 64 | 100.00 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | 172 | 95.03 | 9 | 4.97 | 24 | 13.26 | 157 | 86.74 | 161 | 88.95 | 20 | 11.05 | 161 | 88.95 | 20 | 11.05 | 181 | 100.00 |
| Skaraborgs sjukhus | 33 | 89.19 | 4 | 10.81 | 2 | 5.41 | 35 | 94.59 | 9 | 24.32 | 28 | 75.68 | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 | 37 | 100.00 |
| Skåne Universitetssjukhus, Lund | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | 9 | 19.57 | 37 | 80.43 | 36 | 78.26 | 10 | 21.74 | 36 | 78.26 | 10 | 21.74 | 46 | 100.00 |
| Skåne Universitetssjukhus, Malmö | 72 | 87.80 | 10 | 12.20 | 9 | 10.98 | 73 | 89.02 | 74 | 90.24 | 8 | 9.76 | 69 | 84.15 | 13 | 15.85 | 82 | 100.00 |
| Sophiahemmet | 6 | 100.00 | . | . | . | . | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | . | . | 6 | 100.00 | . | . | 6 | 100.00 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 79 | 92.94 | 6 | 7.06 | 2 | 2.35 | 83 | 97.65 | 82 | 96.47 | 3 | 3.53 | 72 | 84.71 | 13 | 15.29 | 85 | 100.00 |
| Sörmland ÖNH | 26 | 96.30 | 1 | 3.70 | 3 | 11.11 | 24 | 88.89 | 27 | 100.00 | . | . | 27 | 100.00 | . | . | 27 | 100.00 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 74 | 92.50 | 6 | 7.50 | 10 | 12.50 | 70 | 87.50 | 62 | 77.50 | 18 | 22.50 | 71 | 88.75 | 9 | 11.25 | 80 | 100.00 |
| Vrinnevisjukhuset i Norrköping | 7 | 100.00 | . | . | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 7 | 100.00 |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 79 | 98.75 | 1 | 1.25 | 3 | 3.75 | 77 | 96.25 | 78 | 97.50 | 2 | 2.50 | 80 | 100.00 | . | . | 80 | 100.00 |
| Ängelholms sjukhus | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 6 | 100.00 | . | . | 6 | 100.00 | . | . | 6 | 100.00 |
| Örnsköldsviks sjukhus | 48 | 88.89 | 6 | 11.11 | 5 | 9.26 | 49 | 90.74 | 5 | 9.26 | 49 | 90.74 | 46 | 85.19 | 8 | 14.81 | 54 | 100.00 |
| Östersunds sjukhus | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 | 2 | 12.50 | 14 | 87.50 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 | 11 | 68.75 | 5 | 31.25 | 16 | 100.00 |






Deskriptiv statistik över TMV4 på opererat öra (operationer utförda 2013/10/01 - 2015/01/31) baserat på patienter med återbesök

Återbesök inom 4 månader från operation exkluderade

MYR (exkl fettplugg)

| | TMV4 före op (dB) | | | | | | TMV4 efter op (dB) | | | | | | TMV4 förbättring (dB) | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 |
| Akademiska sjukhuset | 52 | 28.56 | 14.93 | 19.38 | 26.25 | 36.25 | 50 | 24.15 | 15.11 | 12.50 | 18.75 | 32.50 | 50 | 4.30 | 10.86 | -2.50 | 4.38 | 12.50 |
| Blekingesjukhuset | 7 | 26.61 | 13.97 | 16.25 | 26.25 | 38.75 | 8 | 12.81 | 9.65 | 7.50 | 8.13 | 18.13 | 7 | 13.04 | 12.97 | 3.75 | 7.50 | 30.00 |
| Centrallasarettet Växjö | 3 | 46.67 | 17.87 | 31.25 | 42.50 | 66.25 | 5 | 18.00 | 9.25 | 12.50 | 13.75 | 18.75 | 3 | 25.42 | 11.20 | 12.50 | 31.25 | 32.50 |
| Centralsjukhuset i Karlstad | 17 | 34.12 | 17.63 | 22.50 | 27.50 | 37.50 | 16 | 24.84 | 18.23 | 11.25 | 16.88 | 31.88 | 16 | 10.08 | 9.54 | 2.50 | 9.38 | 15.63 |
| Centralsjukhuset i Kristianstad | 8 | 36.25 | 11.28 | 31.88 | 35.00 | 39.38 | 8 | 27.97 | 17.10 | 20.63 | 24.38 | 30.00 | 8 | 8.28 | 7.38 | 5.63 | 10.00 | 13.75 |
| Falu lasarett | 24 | 37.19 | 31.62 | 15.63 | 30.00 | 40.00 | 24 | 28.54 | 29.52 | 11.88 | 17.50 | 25.63 | 24 | 8.65 | 14.88 | -3.13 | 8.13 | 17.50 |
| Gävle sjukhus | 16 | 34.45 | 17.71 | 21.25 | 30.00 | 47.50 | 15 | 28.75 | 22.48 | 11.25 | 15.00 | 41.25 | 15 | 6.50 | 17.17 | -1.25 | 3.75 | 16.25 |
| Halmstad sjukhus | 16 | 31.88 | 17.11 | 21.25 | 25.63 | 35.63 | 16 | 22.11 | 14.47 | 11.88 | 16.88 | 27.50 | 16 | 9.77 | 12.95 | 4.38 | 10.00 | 16.88 |
| Helsingborgs Lasarett | 20 | 33.44 | 23.47 | 21.25 | 27.50 | 40.00 | 20 | 27.69 | 28.51 | 10.00 | 14.38 | 37.50 | 20 | 5.75 | 13.66 | 0.63 | 9.38 | 15.63 |
| Karolinska Universitetssjukhus | 105 | 35.06 | 18.30 | 21.25 | 32.50 | 43.75 | 105 | 24.12 | 16.85 | 12.50 | 18.75 | 28.75 | 104 | 10.96 | 13.93 | 2.50 | 10.00 | 18.75 |
| Linköpings Universitetssjukhus | 5 | 27.50 | 11.86 | 20.00 | 25.00 | 27.50 | 4 | 17.50 | 11.55 | 7.50 | 17.50 | 27.50 | 4 | 5.00 | 12.42 | -5.00 | 6.25 | 15.00 |
| Länssjukhuset Ryhov, Jönköping | 23 | 28.42 | 16.33 | 16.25 | 26.25 | 33.75 | 23 | 26.58 | 17.90 | 12.50 | 21.25 | 36.25 | 23 | 1.85 | 13.02 | -5.00 | 5.00 | 12.50 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 17 | 32.43 | 17.80 | 17.50 | 22.50 | 50.00 | 17 | 27.28 | 15.88 | 13.75 | 22.50 | 37.50 | 17 | 5.15 | 18.73 | -3.75 | 6.25 | 15.00 |
| Länssjukhuset i Sundsvall | 4 | 20.63 | 11.02 | 13.13 | 23.75 | 28.13 | 5 | 16.75 | 5.63 | 13.75 | 16.25 | 18.75 | 4 | 2.19 | 11.61 | -7.50 | 3.75 | 11.88 |
| NU-sjukvården, Trollhättan | 27 | 35.14 | 20.83 | 18.75 | 33.75 | 43.75 | 26 | 25.38 | 18.66 | 12.50 | 18.75 | 30.00 | 26 | 10.29 | 14.57 | -1.25 | 11.88 | 21.25 |
| Norrbotten läns Landsting | 7 | 41.61 | 24.90 | 17.50 | 43.75 | 56.25 | 7 | 38.93 | 16.84 | 23.75 | 36.25 | 56.25 | 7 | 2.68 | 11.17 | -6.25 | 6.25 | 7.50 |
| Norrlands Universitetssjukhus | 14 | 32.59 | 11.01 | 25.00 | 28.75 | 40.00 | 14 | 23.04 | 17.44 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 14 | 9.55 | 11.10 | 2.50 | 8.75 | 18.75 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | 49 | 31.79 | 16.16 | 20.00 | 30.00 | 37.50 | 46 | 19.43 | 14.48 | 10.00 | 13.75 | 25.00 | 46 | 12.61 | 8.63 | 6.25 | 12.50 | 17.50 |
| Skaraborgs sjukhus | 5 | 34.50 | 10.22 | 32.50 | 32.50 | 40.00 | 5 | 34.25 | 22.09 | 25.00 | 28.75 | 53.75 | 5 | 0.25 | 19.67 | -18.75 | 3.75 | 15.00 |
| Skåne Universitetssjukhus, Lund | 12 | 41.67 | 17.69 | 26.25 | 42.50 | 53.75 | 13 | 24.62 | 17.32 | 12.50 | 17.50 | 40.00 | 12 | 16.35 | 10.51 | 9.38 | 16.25 | 23.75 |
| Skåne Universitetssjukhus, Malmö | 10 | 33.38 | 12.87 | 25.00 | 28.75 | 41.25 | 10 | 20.88 | 8.88 | 13.75 | 18.75 | 23.75 | 10 | 12.50 | 7.31 | 8.75 | 13.13 | 17.50 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 4 | 40.63 | 17.28 | 28.75 | 43.13 | 52.50 | 4 | 40.63 | 15.16 | 30.63 | 38.13 | 50.63 | 4 | 0.00 | 7.36 | -5.00 | -1.25 | 5.00 |
| Sörmland ÖNH | 3 | 24.58 | 14.22 | 8.75 | 28.75 | 36.25 | 3 | 20.83 | 4.02 | 16.25 | 22.50 | 23.75 | 3 | 3.75 | 10.68 | -7.50 | 5.00 | 13.75 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 13 | 33.65 | 22.75 | 16.25 | 32.50 | 37.50 | 14 | 23.84 | 18.72 | 8.75 | 22.50 | 28.75 | 13 | 9.71 | 6.50 | 5.00 | 8.75 | 13.75 |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 30 | 33.83 | 17.08 | 21.25 | 33.75 | 41.25 | 29 | 27.24 | 20.96 | 12.50 | 21.25 | 37.50 | 29 | 6.59 | 12.87 | 0.00 | 5.00 | 17.50 |
| Ömsköldsviks sjukhus | 11 | 26.48 | 17.35 | 8.75 | 26.25 | 40.00 | 10 | 22.63 | 17.43 | 7.50 | 21.88 | 32.50 | 10 | 3.25 | 7.46 | 0.00 | 1.88 | 8.75 |
| Östersunds sjukhus | 8 | 34.53 | 13.95 | 26.25 | 31.88 | 39.38 | 8 | 15.94 | 12.08 | 6.25 | 15.63 | 21.88 | 7 | 19.46 | 11.32 | 5.00 | 20.00 | 30.00 |




Deskriptiv statistik över TMV4 på opererat öra (operationer utförda 2013/10/01 - 2015/01/31) baserat på patienter med återbesök

Återbesök inom 4 månader från operation exkluderade

MYR-OSS (exkl fettplugg) + OSS

| | TMV4 före op (dB) | | | | | | TMV4 efter op (dB) | | | | | | TMV4 förbättring (dB) | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 |
| Akademiska sjukhuset | 24 | 46.67 | 19.27 | 32.50 | 45.00 | 55.63 | 23 | 36.68 | 18.44 | 25.00 | 31.25 | 43.75 | 23 | 9.57 | 15.07 | 1.25 | 8.75 | 22.50 |
| Centralsjukhuset i Karlstad | 9 | 44.03 | 10.09 | 38.75 | 43.75 | 51.25 | 9 | 27.78 | 11.44 | 17.50 | 27.50 | 37.50 | 9 | 16.25 | 15.56 | 6.25 | 12.50 | 22.50 |
| Centralsjukhuset i Kristianstad | 2 | 45.63 | 6.19 | 41.25 | 45.63 | 50.00 | 2 | 41.88 | 15.03 | 31.25 | 41.88 | 52.50 | 2 | 3.75 | 8.84 | -2.50 | 3.75 | 10.00 |
| Falu lasarett | 7 | 50.00 | 19.69 | 42.50 | 52.50 | 57.50 | 7 | 38.39 | 18.04 | 21.25 | 30.00 | 53.75 | 7 | 11.61 | 18.35 | -8.75 | 15.00 | 27.50 |
| Halmstad sjukhus | 3 | 52.50 | 26.10 | 22.50 | 65.00 | 70.00 | 3 | 36.25 | 23.75 | 12.50 | 36.25 | 60.00 | 3 | 16.25 | 10.83 | 10.00 | 10.00 | 28.75 |
| Helsingborgs Lasarett | 3 | 39.58 | 5.91 | 35.00 | 37.50 | 46.25 | 3 | 20.83 | 9.21 | 13.75 | 17.50 | 31.25 | 3 | 18.75 | 11.46 | 6.25 | 21.25 | 28.75 |
| Karolinska Universitetssjukhus | 33 | 53.67 | 18.90 | 46.25 | 51.25 | 58.75 | 33 | 33.33 | 18.78 | 20.00 | 30.00 | 46.25 | 33 | 20.34 | 16.66 | 10.00 | 17.50 | 31.25 |
| Linköpings Universitetssjukhus | 2 | 53.75 | 0.00 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 2 | 65.63 | 22.10 | 50.00 | 65.63 | 81.25 | 2 | -11.88 | 22.10 | -27.50 | -11.88 | 3.75 |
| Länssjukhuset Ryhov, Jönköping | 11 | 46.93 | 12.74 | 36.25 | 45.00 | 61.25 | 11 | 32.73 | 13.21 | 22.50 | 27.50 | 43.75 | 11 | 14.20 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 28.75 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 11 | 45.00 | 10.59 | 40.00 | 41.25 | 55.00 | 11 | 38.07 | 13.20 | 30.00 | 36.25 | 52.50 | 11 | 6.93 | 9.12 | 1.25 | 10.00 | 13.75 |
| Länssjukhuset i Sundsvall | 1 | 72.50 | . | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 1 | 36.25 | . | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 1 | 36.25 | . | 36.25 | 36.25 | 36.25 |
| NU-sjukvården, Trollhättan | 11 | 61.36 | 22.77 | 52.50 | 52.50 | 87.50 | 11 | 39.43 | 20.93 | 21.25 | 31.25 | 55.00 | 11 | 21.93 | 17.31 | 10.00 | 26.25 | 35.00 |
| Norrbottn läns Landsting | 1 | 40.00 | . | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1 | 37.50 | . | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 1 | 2.50 | . | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Norrlands Universitetssjukhus | 5 | 50.50 | 12.55 | 51.25 | 51.25 | 56.25 | 5 | 36.25 | 11.63 | 25.00 | 37.50 | 46.25 | 5 | 14.25 | 18.78 | 5.00 | 7.50 | 26.25 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | 4 | 51.88 | 19.80 | 38.13 | 45.63 | 65.63 | 4 | 38.13 | 24.36 | 17.50 | 38.75 | 58.75 | 4 | 13.75 | 12.03 | 6.88 | 17.50 | 20.63 |
| Skaraborgs sjukhus | 1 | 32.50 | . | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 1 | 15.00 | . | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 17.50 | . | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| Skåne Universitetssjukhus, Lund | 3 | 35.42 | 5.05 | 32.50 | 32.50 | 41.25 | 3 | 39.58 | 19.54 | 18.75 | 42.50 | 57.50 | 3 | -4.17 | 19.54 | -25.00 | -1.25 | 13.75 |
| Skåne Universitetssjukhus, Malmö | 6 | 48.33 | 26.88 | 28.75 | 35.00 | 77.50 | 6 | 27.29 | 27.15 | 15.00 | 17.50 | 18.75 | 6 | 21.04 | 22.23 | 7.50 | 14.38 | 20.00 |
| Sörmland ÖNH | 3 | 62.92 | 23.40 | 36.25 | 72.50 | 80.00 | 3 | 40.42 | 24.28 | 13.75 | 46.25 | 61.25 | 3 | 22.50 | 3.75 | 18.75 | 22.50 | 26.25 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 5 | 53.75 | 24.42 | 32.50 | 56.25 | 62.50 | 4 | 34.69 | 12.68 | 26.88 | 31.88 | 42.50 | 4 | 10.31 | 26.74 | -11.25 | 10.63 | 31.88 |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 12 | 46.67 | 19.44 | 34.38 | 45.00 | 50.63 | 12 | 40.42 | 25.00 | 23.13 | 39.38 | 48.13 | 12 | 6.25 | 11.57 | -2.50 | 4.38 | 11.25 |
| Ömsköldsviks sjukhus | 7 | 47.68 | 10.42 | 35.00 | 48.75 | 52.50 | 7 | 35.18 | 14.60 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 7 | 12.50 | 6.81 | 3.75 | 15.00 | 17.50 |




Deskriptiv statistik över TMV4 på opererat öra (operationer utförda 2013/10/01 - 2015/01/31) baserat på patienter med återbesök

Återbesök inom 4 månader från operation exkluderade

Fettplugg

| | TMV4 före op (dB) | | | | | | TMV4 efter op (dB) | | | | | | TMV4 förbättring (dB) | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------------|------|-------|-------|--------|-------|
| | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 | N | Mean | Std | Q1 | Median | Q3 |
| Akademiska sjukhuset | 3 | 25.83 | 21.00 | 7.50 | 21.25 | 48.75 | 3 | 24.17 | 20.21 | 12.50 | 12.50 | 47.50 | 3 | 1.67 | 6.88 | -5.00 | 1.25 | 8.75 |
| Blekingesjukhuset | 2 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 1 | 7.50 | . | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 | 3.75 | . | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Centrallasarettet Växjö | 2 | 36.25 | 15.91 | 25.00 | 36.25 | 47.50 | 2 | 33.75 | 21.21 | 18.75 | 33.75 | 48.75 | 2 | 2.50 | 5.30 | -1.25 | 2.50 | 6.25 |
| Centralsjukhuset i Kristianstad | 1 | 10.00 | . | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 7.50 | . | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 | 2.50 | . | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Falu lasarett | 2 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 2 | 8.75 | 5.30 | 5.00 | 8.75 | 12.50 | 2 | 8.75 | 5.30 | 5.00 | 8.75 | 12.50 |
| Gävle sjukhus | 9 | 20.56 | 19.73 | 11.25 | 15.00 | 17.50 | 8 | 21.88 | 20.43 | 11.88 | 13.75 | 21.88 | 8 | 0.00 | 6.55 | -0.63 | 1.25 | 3.75 |
| Halmstad sjukhus | 1 | 6.25 | . | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1 | 0.00 | . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6.25 | . | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| Helsingborgs Lasarett | 6 | 43.13 | 43.49 | 16.25 | 29.38 | 38.75 | 6 | 37.50 | 27.39 | 16.25 | 31.88 | 48.75 | 6 | 5.63 | 22.50 | -6.25 | 1.25 | 11.25 |
| Karolinska Universitetssjukhus | 5 | 14.50 | 4.89 | 11.25 | 17.50 | 17.50 | 5 | 8.25 | 3.26 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 5 | 6.25 | 4.42 | 3.75 | 5.00 | 8.75 |
| Länssjukhuset Ryhov, Jönköping | 2 | 36.25 | 22.98 | 20.00 | 36.25 | 52.50 | 2 | 28.13 | 27.40 | 8.75 | 28.13 | 47.50 | 2 | 8.13 | 4.42 | 5.00 | 8.13 | 11.25 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 9 | 24.31 | 25.64 | 8.75 | 13.75 | 37.50 | 9 | 19.31 | 19.29 | 3.75 | 11.25 | 26.25 | 9 | 5.00 | 9.96 | -1.25 | 5.00 | 7.50 |
| Länssjukhuset i Sundsvall | 4 | 40.63 | 20.12 | 28.13 | 47.50 | 53.13 | 4 | 34.69 | 20.32 | 21.88 | 41.88 | 47.50 | 4 | 5.94 | 4.61 | 3.13 | 6.25 | 8.75 |
| NU-sjukvården, Trollhättan | 5 | 19.75 | 10.29 | 12.50 | 18.75 | 23.75 | 5 | 19.50 | 8.87 | 15.00 | 21.25 | 22.50 | 5 | 0.25 | 3.24 | -2.50 | 1.25 | 2.50 |
| Norrlands Universitetssjukhus | 1 | 42.50 | . | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 1 | 41.25 | . | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 1 | 1.25 | . | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | 12 | 30.63 | 26.87 | 15.00 | 17.50 | 44.38 | 12 | 29.38 | 33.90 | 9.38 | 16.25 | 38.75 | 12 | 1.25 | 13.39 | -1.88 | 3.75 | 8.75 |
| Skaraborgs sjukhus | 4 | 16.88 | 3.89 | 14.38 | 15.63 | 19.38 | 4 | 16.88 | 18.78 | 6.88 | 8.13 | 26.88 | 4 | 0.00 | 15.10 | -8.75 | 6.88 | 8.75 |
| Skåne Universitetssjukhus, Malmö | 3 | 31.67 | 14.65 | 15.00 | 37.50 | 42.50 | 3 | 24.17 | 15.53 | 6.25 | 32.50 | 33.75 | 3 | 7.50 | 2.17 | 5.00 | 8.75 | 8.75 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 1 | 1.25 | . | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | -2.50 | . | -2.50 | -2.50 | -2.50 | 1 | 3.75 | . | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 3 | 20.42 | 15.63 | 5.00 | 20.00 | 36.25 | 3 | 15.42 | 22.51 | 0.00 | 5.00 | 41.25 | 3 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 5.00 | 15.00 |
| Ängelholms sjukhus | 2 | 21.88 | 9.72 | 15.00 | 21.88 | 28.75 | 2 | 19.38 | 11.49 | 11.25 | 19.38 | 27.50 | 2 | 2.50 | 1.77 | 1.25 | 2.50 | 3.75 |



Deskriptiv statistik över operationer och återbesök (operationer utförda 2013/10/01 - 2015/01/31)

Återbesök är återbesök genomförda tidigast 4 månader efter operation

| | MYR (exkl fettplugg) | | MYR-OSS (exkl fettplugg) | | | | OSS | | | | Fettplugg | | | | Totalt | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|-------|-----|--------|-----------|--------|-----|--------|-----------|--------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | Återbesök | | Återbesök | | | | Återbesök | | | | Återbesök | | | | Återbesök | | | | | |
| | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | | Nej | | Ja | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Akademiska sjukhuset | 21 | 28.77 | 52 | 71.23 | 8 | 28.57 | 20 | 71.43 | . | . | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 30 | 27.52 | 79 | 72.48 |
| Blekingesjukhuset | 2 | 18.18 | 9 | 81.82 | 1 | 100.00 | . | . | . | . | . | . | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 4 | 25.00 | 12 | 75.00 |
| Centrallasarettet Växjö | 15 | 75.00 | 5 | 25.00 | 1 | 100.00 | . | . | 3 | 100.00 | . | . | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 23 | 76.67 | 7 | 23.33 |
| Centralsjukhuset i Karlstad | 5 | 22.73 | 17 | 77.27 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | . | . | . | . | 7 | 21.21 | 26 | 78.79 |
| Centralsjukhuset i Kristianstad | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | . | . | 1 | 100.00 | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 |
| Falu lasarett | 3 | 11.11 | 24 | 88.89 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | . | . | 2 | 100.00 | . | . | 2 | 100.00 | 5 | 13.16 | 33 | 86.84 |
| Gävle sjukhus | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 5 | 16.67 | 25 | 83.33 |
| Halmstad sjukhus | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | . | . | . | . | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 17 | 45.95 | 20 | 54.05 |
| Helsingborgs Lasarett | 3 | 13.04 | 20 | 86.96 | . | . | 1 | 100.00 | . | . | 2 | 100.00 | . | . | 6 | 100.00 | 3 | 9.38 | 29 | 90.63 |
| Karolinska Universitetssjukhus | 195 | 64.78 | 106 | 35.22 | 21 | 44.68 | 26 | 55.32 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 238 | 62.30 | 144 | 37.70 |
| Linköpings Universitetssjukhus | 16 | 76.19 | 5 | 23.81 | 7 | 100.00 | . | . | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | . | . | . | . | 27 | 79.41 | 7 | 20.59 |
| Länssjukhuset Ryhov, Jönköping | 3 | 11.54 | 23 | 88.46 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | . | . | 4 | 100.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 6 | 14.29 | 36 | 85.71 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 2 | 10.53 | 17 | 89.47 | . | . | 10 | 100.00 | . | . | 1 | 100.00 | . | . | 9 | 100.00 | 2 | 5.13 | 37 | 94.87 |
| Länssjukhuset i Sundsvall | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | . | . | 1 | 100.00 | . | . | . | . | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 5 | 33.33 | 10 | 66.67 |
| NU-sjukvården, Trollhättan | 2 | 6.90 | 27 | 93.10 | . | . | 8 | 100.00 | . | . | 3 | 100.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 3 | 6.52 | 43 | 93.48 |
| Norrbottnens läns Landsting | 15 | 68.18 | 7 | 31.82 | 3 | 100.00 | . | . | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 1 | 100.00 | . | . | 23 | 74.19 | 8 | 25.81 |
| Norrlands Universitetssjukhus | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | . | . | 4 | 100.00 | . | . | 1 | 100.00 | . | . | 1 | 100.00 | 4 | 16.67 | 20 | 83.33 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhus | 25 | 33.78 | 49 | 66.22 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | . | . | . | . | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 34 | 34.34 | 65 | 65.66 |
| Skaraborgs sjukhus | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | . | . | . | . | . | 4 | 100.00 | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 | |
| Skåne Universitetssjukhus, Lund | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | . | . | 3 | 100.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5.88 | 16 | 94.12 |
| Skåne Universitetssjukhus, Malmö | 15 | 60.00 | 10 | 40.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | . | . | 3 | 100.00 | 18 | 48.65 | 19 | 51.35 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 33 | 89.19 | 4 | 10.81 | 6 | 100.00 | . | . | 3 | 100.00 | . | . | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 | 59 | 92.19 | 5 | 7.81 |
| Sörmland ÖNH | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | . | . | . | . | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 11 | 44.00 | 14 | 56.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | . | . | 2 | 100.00 | . | . | . | . | 12 | 38.71 | 19 | 61.29 |
| Vrinnevisjukhuset i Norrköping | 2 | 100.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.00 | . | . |
| Västmanlands sjukhus, Västerås | 2 | 6.25 | 30 | 93.75 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | . | . | 3 | 100.00 | 4 | 8.16 | 45 | 91.84 |
| Ängelholms sjukhus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| Ömsköldsviks sjukhus | 2 | 14.29 | 12 | 85.71 | . | . | 7 | 100.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 9.52 | 19 | 90.48 |
| Östersunds sjukhus | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 |
| Registret | 413 | 44.27 | 520 | 55.73 | 65 | 34.76 | 122 | 65.24 | 29 | 40.85 | 42 | 59.15 | 53 | 40.46 | 78 | 59.54 | 560 | 42.36 | 762 | 57.64 |

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan




Bild 1. Diagrammet visar andelen barn med indikationen sekretorisk otitis media (SOM), som genomgått hörseltest (tonaudiogram, lekaudiogram eller mätning i fritt ljudfält) före röroperation (ja) respektive andelen i denna grupp som inte hörseltestats preoperativt (nej). Enligt de nationella behandlingsrekommendationerna bör hörselmätning föregå beslut om röroperation vid SOM.




Bild 2. Diagrammet visar andelen barn med indikationen SOM där hörseltest gjorts före operationen och där TMV4 (tonmedelvärde vid 500, 1000, 2000 och 4000 Hz) kunnat beräknas (ja) respektive andelen där TMV4 inte kan beräknas (nej).



Bild 3. Diagrammet visar andelen barn med SOM där TMV4 minskat (=bättre hörsel) efter röroperationen, i de fall där TMV4 kunnat fastställas. TMV4 är svårt att fastställa hos de yngsta barnen.




Bild 4. Förändring i TMV4 hos barn med SOM efter röroperation jämfört med det preoperativa värdet. Diagrammet visar hörselbättring uppdelat i intervaller om 10dB. OBS att minusvärdena -10 respektive -20 dB här representerar försämrad hörsel!




Bild 5. Antalet episoder av akut öroninflammation som diagnosticerats av ÖNH-specialist de senaste 6 månaderna före rörbehandling. Data saknas i relativt många fall (missing). Hos barn som remitteras till ÖNH-mottagningen efter minst 3 AOM-episoder under 6 månader, och får ytterligare en säkerställd AOM-episod inom en 1-2 månaders observationsperiod, kan rörbehandling övervägas.




Bild 6. Diagrammet visar det rapporterade antalet episoder med akut öronflytning (som tecken på AOM) de senaste 6 månaderna innan operationsbeslut hos barn som rörbehandlats pga recidiverande akut mediaotit. Data saknas i relativt många fall (missing). Hos barn som remitteras till ÖNH-mottagningen efter minst 3 AOM-episoder under 6 månader, och får ytterligare en säkerställd AOM-episod inom en 1-2 månaders observationsperiod, kan rörbehandling övervägas.




Bild 7. Föräldrarapporterad nöjdhet med informationen man fått i samband med röroperationen.




Bild 8. Diagrammet visar andelen barn som opererats inom 30 dagar efter att man beslutat om rörbehandling.




Bild 9. Diagrammet visar fördelningen år 2015 i registret mellan olika indikatorer till rörbehandling.

Täckningsgradsanalys röroperationer

Antalet registreringar per år har ökat sedan 2013, liksom den totala täckningsgraden. Den senare har ökat från 12-31%. Av de 67 kliniker som finns deltagar 28 stycken i rörregistret.

Täckningsgraden gällande röroperationer för de registrerande klinikerna är 72% (2098/2897 operationer). Flera av de största utförarna saknas i registret. Täckningsgraden varierar också mycket geografiskt. Referensgruppens mål för 2017 är att nå ut till fler kliniker med information om registret. Vi önskar också feedback på vad som i nuläget hindrar att man går med i registret. Vi vill betona att vi är väldigt glada över att många redan nu engagerar sig och sköter registreringen på ett jättebra sätt.

Täckningsgradsjämförelse - RÖR-registret(ÖNH) vs Patientregistret 2015 | Totalt


| | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt |
|---|-------------------|------|------------------|------|---------|------|--------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal |
| RIKET | 2 098 | 31,1 | 6 614 | 97,9 | 1 959 | 29 | 6 753 |
| 01 Stockholm | 513 | 26,9 | 1 866 | 98 | 475 | 24,9 | 1 904 |
| 18107 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| Aleris specialistvård Sabbatsberg | 177 | 66 | 263 | 98,1 | 172 | 64,2 | 268 |
| Capio ÖNH Globen | 6 | 3,4 | 175 | 100 | 6 | 3,4 | 175 |
| Doctorekliniken Älvsjö ÖNH | 86 | 83,5 | 91 | 88,3 | 74 | 71,8 | 103 |
| Forum VC / Nacka | 0 | 0 | 157 | 100 | 0 | 0 | 157 |
| Handens sjukhus | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Jakobsbergs Sjukhus | 44 | 68,8 | 56 | 87,5 | 36 | 58,3 | 64 |
| Karolinska universitetssjukhuset Huddinge | 0 | 0 | 87 | 100 | 0 | 0 | 87 |
| Karolinska universitetssjukhuset Solna | 0 | 0 | 19 | 100 | 0 | 0 | 19 |
| Löwenströmska sjukhuset | 142 | 80,7 | 168 | 95,5 | 134 | 76,1 | 176 |
| Nacka sjukhus | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Norrtälje sjukhus | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Serafens vårdcentral | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 |
| Serafimerlasarettet | 41 | 100 | 36 | 87,8 | 36 | 87,8 | 41 |
| Skärholmens ÖNH-centrum | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 0 | 233 |
| Sollentuna Sjukhus | 6 | 22,2 | 27 | 100 | 6 | 22,2 | 27 |
| Sophiahemmet | 0 | 0 | 366 | 100 | 0 | 0 | 366 |
| Södermalms Läkarhus | 0 | 0 | 77 | 100 | 0 | 0 | 77 |
| Södertälje sjukhus | 0 | 0 | 36 | 100 | 0 | 0 | 36 |
| Täby Närsjukhus | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | 32 |
| Väsby Läkargrupp ÖNH | 11 | 61,1 | 18 | 100 | 11 | 61,1 | 18 |
| 03 Uppsala | 22 | 12,9 | 168 | 98,8 | 20 | 11,8 | 170 |
| Akademiska sjukhuset | 22 | 12,9 | 168 | 98,8 | 20 | 11,8 | 170 |
| 04 Södermanland | 0 | 0 | 172 | 100 | 0 | 0 | 172 |
| Mälarsjukhuset | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 0 | 73 |
| Nyköpings lasarett | 0 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 99 |
| 05 Östergötland | 0 | 0 | 210 | 100 | 0 | 0 | 210 |
| Universitetssjukhuset i Linköping | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 13 |
| Vrinnevisjukhuset | 0 | 0 | 197 | 100 | 0 | 0 | 197 |
| 06 Jönköping | 227 | 78 | 274 | 94,2 | 210 | 72,2 | 291 |
| Höglandssjukhuset | 67 | 100 | 61 | 91 | 61 | 91 | 67 |
| Länssjukhuset Ryhov | 124 | 66 | 182 | 96,8 | 118 | 62,8 | 188 |
| Värnamo sjukhus | 36 | 100 | 31 | 86,1 | 31 | 86,1 | 36 |

| | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt |
|-----------------------------------|-------------------|------|------------------|------|---------|------|--------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal |
| 07 Kronoberg | 0 | 0 | 158 | 100 | 0 | 0 | 158 |
| Centrallasarettet i Växjö | 0 | 0 | 126 | 100 | 0 | 0 | 126 |
| Ljungby lasarett | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | 32 |
| 08 Kalmar | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 0 | 0 | 116 | 100 | 0 | 0 | 116 |
| Västerviks sjukhus | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 34 |
| 09 Gotland | 0 | 0 | 53 | 100 | 0 | 0 | 53 |
| Visby lasarett | 0 | 0 | 53 | 100 | 0 | 0 | 53 |
| 10 Blekinge | 129 | 82,2 | 156 | 99,4 | 128 | 81,5 | 157 |
| Blekingesjukhuset | 129 | 82,2 | 156 | 99,4 | 128 | 81,5 | 157 |
| 12 Skåne | 290 | 20,3 | 1 420 | 9,2 | 278 | 9,4 | 1 432 |
| Helsingborgs lasarett | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | 33 |
| Kristianstads sjukhus | 181 | 81,2 | 218 | 97,8 | 176 | 78,9 | 223 |
| Skånes universitetssjukhus Malmö | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 28 |
| Trelleborgs lasarett | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 |
| Universitetssjukhuset i Lund | 0 | 0 | 46 | 100 | 0 | 0 | 46 |
| Ystad lasarett | 109 | 46,6 | 227 | 97 | 102 | 43,6 | 234 |
| Ängelholms sjukhus | 0 | 0 | 368 | 100 | 0 | 0 | 368 |
| 13 Halland | 161 | 68,5 | 227 | 96,6 | 153 | 65,1 | 235 |
| 42020 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Hallands sjukhus Halmstad | 161 | 81,7 | 189 | 95,9 | 153 | 77,7 | 197 |
| Hallands sjukhus Kungsbacka | 0 | 0 | 37 | 100 | 0 | 0 | 37 |
| 14 Västra Götaland | 399 | 51,5 | 741 | 95,6 | 365 | 47,1 | 775 |
| Alingsås lasarett | 49 | 92,5 | 34 | 64,2 | 30 | 56,6 | 53 |
| NU-sjukvården | 0 | 0 | 125 | 100 | 0 | 0 | 125 |
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | 0 | 0 | 193 | 100 | 0 | 0 | 193 |
| Skaraborgs sjukhus | 101 | 72,1 | 134 | 95,7 | 95 | 67,9 | 140 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 166 | 94,3 | 172 | 97,7 | 162 | 92 | 176 |
| Västra Frölunda sjukhus | 83 | 94,3 | 83 | 94,3 | 78 | 88,6 | 88 |
| 17 Värmland | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 140 |
| Karlstads sjukhus | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 140 |
| 18 Örebro | 98 | 78,4 | 112 | 89,6 | 85 | 68 | 125 |
| Karlskoga lasarett | 33 | 86,8 | 38 | 100 | 33 | 86,8 | 38 |
| Lindesbergs lasarett | 18 | 81,8 | 22 | 100 | 18 | 81,8 | 22 |
| Läkargruppen Örebro | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 15 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 47 | 94 | 37 | 74 | 34 | 68 | 50 |
| 19 Västmanland | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 80 |
| Västerås lasarett | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 80 |
| 20 Dalarna | 85 | 61,6 | 134 | 97,1 | 81 | 58,7 | 138 |
| Falu lasarett | 85 | 62 | 133 | 97,1 | 81 | 59,1 | 137 |
| Mora lasarett | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 21 Gävleborg | 140 | 78,2 | 171 | 95,5 | 132 | 73,7 | 179 |
| Gävle sjukhus | 91 | 81,3 | 108 | 96,4 | 87 | 77,7 | 112 |
| Hudiksvalls sjukhus | 49 | 73,1 | 63 | 94 | 45 | 67,2 | 67 |
| 22 Västernorrland | 0 | 0 | 104 | 100 | 0 | 0 | 104 |
| Sollefteå sjukhus | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 |
| Sundsvalls sjukhus | 0 | 0 | 67 | 100 | 0 | 0 | 67 |
| Örnsköldsviks sjukhus | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 30 |
| 23 Jämtland | 34 | 73,9 | 44 | 95,7 | 32 | 69,6 | 46 |
| Östersunds sjukhus | 34 | 73,9 | 44 | 95,7 | 32 | 69,6 | 46 |
| 24 Västerbotten | 0 | 0 | 145 | 100 | 0 | 0 | 145 |
| Norrlands universitetssjukhus | 0 | 0 | 104 | 100 | 0 | 0 | 104 |
| Skellefteå lasarett | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 41 |
| 25 Norrbotten | 0 | 0 | 89 | 100 | 0 | 0 | 89 |
| Gällivare lasarett | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 15 |
| Sunderbyns sjukhus | 0 | 0 | 74 | 100 | 0 | 0 | 74 |


Källa: RÖR-registret(ÖNH), Patientregistret
REGISTERSERVICE
registerservice@socialstyrelsen.se
2016-12-08

Septumplastikregistret


Nu har det kommit in en del data i septumplastikregistret. Här redovisas 2015 års data. Om du vill ha tillgång till all din egen kliniks rådata kan du ladda ner den från hemsidan. Du behöver behörighet för att kunna göra det. Kontakta koordinators Lisa Hellgård om du har frågor, onh@registercentrum.se




Antalet registrerade operationer i registret under 2015. Typisk avplaning under sommarperioden och jul. Totalt registrerades 1214 patienter under 2015.




Fortfarande under 2015 var det 45 % av de som registrerats som INTE hade gjort någon rhinomanometri.




Fler patienter som opererades med kombinationen septumplastik/conchotomi erhöll peroperativ antibiotika.



Dubbelt så många som opererades med kombinationen septumplastik/conchotomi jämfört med bara septumplastik erhöj postoperativ antibiotika (22% resp 11 %).



24% av de som svarade hade haft ett oplanerat återbesök. Man måste dock observera att bara 48% av de som opererats har svarat på enkäten, vilket gör denna siffra osäker. Man kan anta att fler som haft oplanerade återbesök besvarat enkäten och i såfall borde siffran oplanerade återbesök vara lägre om man titta på alla opererade.



Av de som svarat på enkäten 12 månader postoperativt (46 %) upplevde 54 % att "resultatet av operationen blev det förväntade". Resultatet för kombinationen septumplastik +conchotomi var något bättre än enbart septumplastik.

Täckningsgrad Septumplastikregistret

Täckningsgradsberäkningen för septumplastikregistret har gjorts via socialstyrelsen med uppgifter från socialstyrelsen patientregister (PAR) och septumplastikregistret.

Täckningsgradsjämförelse - ÖNH Kvalitetsregistret för Septumplastik vs Patientregistret (PAR)
2015 | Totalt

| | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt Antal |
|---|-------------------|------|------------------|------|---------|------|-----------------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | |
| RIKET | 1 216 | 52,5 | 2 204 | 95,2 | 1 105 | 47,7 | 2 315 |
| 01 Stockholm | 416 | 41,3 | 978 | 97,1 | 387 | 38,4 | 1 007 |
| Aleris specialistvård Sabbatsberg | 106 | 40,9 | 257 | 99,2 | 104 | 40,2 | 259 |
| Aleris specialistvård Täby | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 13 |
| Capio Öron Näsa Hals Globen | 39 | 78 | 49 | 98 | 38 | 76 | 50 |
| Danderyds öron-, näs- och halsklinik | 30 | 68,2 | 39 | 88,6 | 25 | 56,8 | 44 |
| Handens sjukhus | 1 | 5,6 | 17 | 94,4 | 0 | 0 | 18 |
| Karolinska universitetssjukhuset Huddinge | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Karolinska universitetssjukhuset Solna | 47 | 75,8 | 57 | 91,9 | 42 | 67,7 | 62 |
| Lewis D A - Läkarmottagning o hälsotjänst | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| Nacka sjukhus | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Okända vårdgivare Stockholm | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| Psyk mottagningen för döva, Älvsjö | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Serafens vårdcentral | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 |
| Serafimerlasarettet | 25 | 100 | 21 | 84 | 21 | 84 | 25 |
| Skärholmens ÖNH-centrum | 115 | 54 | 203 | 95,3 | 105 | 49,3 | 213 |
| Sollentuna sjukhus | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 |
| Sollentuna specialistklinik | 22 | 100 | 21 | 95,5 | 21 | 95,5 | 22 |
| Sophiahemmet | 0 | 0 | 207 | 100 | 0 | 0 | 207 |
| Södermalms läkarhus | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 |
| Södertälje sjukhus | 31 | 91,2 | 34 | 100 | 31 | 91,2 | 34 |
| Victoriakliniken | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| 03 Uppsala | 35 | 52,2 | 63 | 94 | 31 | 46,3 | 67 |
| Akademiska sjukhuset | 35 | 52,2 | 63 | 94 | 31 | 46,3 | 67 |
| 04 Södermanland | 46 | 60,5 | 69 | 90,8 | 39 | 51,3 | 76 |
| Mälarsjukhuset | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 |
| Nyköpings lasarett | 46 | 70,8 | 58 | 89,2 | 39 | 60 | 65 |
| 05 Östergötland | 18 | 46,2 | 39 | 100 | 18 | 46,2 | 39 |
| Universitetssjukhuset i Linköping | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Vrinnevisjukhuset | 18 | 47,4 | 38 | 100 | 18 | 47,4 | 38 |
| 06 Jönköping | 55 | 68,8 | 78 | 97,5 | 53 | 66,3 | 80 |
| Höglandssjukhuset | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 |
| Länssjukhuset Ryhov | 38 | 60,3 | 61 | 96,8 | 36 | 57,1 | 63 |
| 07 Kronoberg | 12 | 54,5 | 22 | 100 | 12 | 54,5 | 22 |
| Centrallasarettet i Växjö | 12 | 54,5 | 22 | 100 | 12 | 54,5 | 22 |
| 08 Kalmar | 21 | 75 | 25 | 89,3 | 18 | 64,3 | 28 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 17 | 73,9 | 21 | 91,3 | 15 | 65,2 | 23 |
| Västerviks sjukhus | 4 | 80 | 4 | 80 | 3 | 60 | 5 |
| 09 Gotland | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| Visby lasarett | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| 10 Blekinge | 22 | 91,7 | 24 | 100 | 22 | 91,7 | 24 |
| Blekingesjukhuset | 22 | 91,7 | 24 | 100 | 22 | 91,7 | 24 |
| 12 Skåne | 139 | 62,1 | 207 | 92,4 | 122 | 54,5 | 224 |
| Helsingborgs lasarett | 5 | 41,7 | 11 | 91,7 | 4 | 33,3 | 12 |
| Kristianstads sjukhus | 30 | 88,2 | 32 | 94,1 | 28 | 82,4 | 34 |
| Skånes universitetssjukhus | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 |

| | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt |
|-----------------------------------|-------------------|------|------------------|------|---------|------|--------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal |
| Skånes universitetssjukhus Lund | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 |
| Skånes universitetssjukhus Malmö | 24 | 33,8 | 66 | 93 | 19 | 26,8 | 71 |
| Trelleborgs lasarett | 11 | 73,3 | 14 | 93,3 | 10 | 66,7 | 15 |
| Ystads lasarett | 34 | 94,4 | 33 | 91,7 | 31 | 86,1 | 36 |
| Ängelholms sjukhus | 35 | 89,7 | 34 | 87,2 | 30 | 76,9 | 39 |
| 13 Halland | 41 | 45,1 | 86 | 94,5 | 36 | 39,6 | 91 |
| Hallands sjukhus Halmstad | 41 | 59,4 | 64 | 92,8 | 36 | 52,2 | 69 |
| Hallands sjukhus Kungsbacka | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 0 | 22 |
| 14 Västra Götaland | 179 | 80,6 | 206 | 92,8 | 163 | 73,4 | 222 |
| NU-sjukvården | 39 | 92,9 | 41 | 97,6 | 38 | 90,5 | 42 |
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | 54 | 74 | 67 | 91,8 | 48 | 65,8 | 73 |
| Skaraborgs sjukhus | 37 | 92,5 | 40 | 100 | 37 | 92,5 | 40 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 49 | 81,7 | 51 | 85 | 40 | 66,7 | 60 |
| Västra Frölunda sjukhus | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 |
| 17 Värmland | 6 | 15,8 | 38 | 100 | 6 | 15,8 | 38 |
| Karlstads sjukhus | 6 | 15,8 | 38 | 100 | 6 | 15,8 | 38 |
| 18 Örebro | 66 | 66,7 | 94 | 94,9 | 61 | 61,6 | 99 |
| Capio Läkargruppen | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 | 0 | 26 |
| Karlskoga lasarett | 7 | 87,5 | 7 | 87,5 | 6 | 75 | 8 |
| Lindesbergs lasarett | 36 | 85,7 | 40 | 95,2 | 34 | 81 | 42 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 23 | 100 | 21 | 91,3 | 21 | 91,3 | 23 |
| 19 Västmanland | 52 | 92,9 | 48 | 85,7 | 44 | 78,6 | 56 |
| Plent specialistkliniken | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Västerås lasarett | 50 | 92,6 | 48 | 88,9 | 44 | 81,5 | 54 |
| 20 Dalarna | 39 | 68,4 | 51 | 89,5 | 33 | 57,9 | 57 |
| Falu lasarett | 39 | 68,4 | 51 | 89,5 | 33 | 57,9 | 57 |
| 21 Gävleborg | 21 | 28,4 | 73 | 98,6 | 20 | 27 | 74 |
| Bollnäs sjukhus | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Gävle sjukhus | 17 | 28,8 | 58 | 98,3 | 16 | 27,1 | 59 |
| Hudiksvalls sjukhus | 4 | 28,6 | 14 | 100 | 4 | 28,6 | 14 |
| 22 Västernorrland | 19 | 61,3 | 26 | 83,9 | 14 | 45,2 | 31 |
| Sundsvalls sjukhus | 19 | 61,3 | 26 | 83,9 | 14 | 45,2 | 31 |
| 23 Jämtland | 5 | 31,3 | 13 | 81,3 | 2 | 12,5 | 16 |
| Östersunds sjukhus | 5 | 31,3 | 13 | 81,3 | 2 | 12,5 | 16 |
| 24 Västerbotten | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 29 |
| Norrlands universitetssjukhus | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 0 | 22 |
| Skellefteå lasarett | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 |
| 25 Norrbotten | 24 | 75 | 32 | 100 | 24 | 75 | 32 |
| Gällivare lasarett | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Sunderbyns sjukhus | 24 | 77,4 | 31 | 100 | 24 | 77,4 | 31 |

Källa: ÖNH Septum, Patientregistret
REGISTERSERVICE
registerservice@socialstyrelsen.se
2016-12-12

Urval ur kvalitetsregistret för septumplastiker (septum/ÖNH);

Septumplastikoperationer registrerade under 2015

Urval ur Socialstyrelsens patientregisterregister (PAR);

Septumplastikoperationer registrerade under 2015 med operationskoden DJD20, ensamt eller i kombination med DHB40,DHB45 eller DHB50.

Inkluderande både slutna vård och specialiserad öppenvård.

Exkluderade är alla med samtidig annan operationskod som börjar på D eller E

Matchningskriterium:

Operationsdatum i ÖNH Septum matchades mot operationsdatum i PAR i intervallet +/- 2 dagar

Denna matchning har det gett utrymme för upp till 2 dagars diskrepans mellan matchande datum.

Beräkning av täckningsgrad

Nämnummaren i beräkningen utgörs av samtliga fall registrerade i minst ett av de ingående registren som återstår efter att urval gjorts.

Täljaren består utan de fall som finns registrerade i respektive register.

Täckningsgraden i septumplastikregistret 2015

Täckningsgraden för septumplastikregistret var 2015 52,5 %. Vid beräkning av täckningsgraden på det matchade materialet (samma patient både i PAR och Septumplastikregistret) i landet som helhet nästan 48 %. Det är en stor variation mellan olika kliniker och landstingen, där den bästa kliniken har 91,7 % medan de sämsta ligger på 0 %.Täckningsgraden har ökat sedan 2014, men ligger fortfarande på en för låg nivå. Den klinik som opererar flest septumplastiker i landet registrerar inte alls i kvalitetsregistret, vilket gör att riktade åtgärder mot enskilda kliniker måste göras under kommande år.

Bra täckningsgrad för tonsillregistret

AV: JOACIM STALFORS, ELISABETH ERICSSON, CLAES HEMLIN, LOTTA HESSÉN SÖDERMAN, ERIK ODHAGEN, PIA NERFELDT OCH OLA SUNNERGREN

Täckningsgrad

För 2015 var täckningsgraden för tonsillregistret **84,1 %**. Detta är den högsta nivån någonsin! Det är tredje året som tonsillregistret inkluderar mer än 80 % av de som tonsillopererats i Sverige. Många kliniker har till och med en täckningsgrad över 90 % men det finns även kliniker med betydligt lägre täckningsgrad eller som inte registrerar alls.

Hur täckningsgrad beräknas

Beräkningarna har utförts i samarbete med Registerservice på Socialstyrelsen. Patienter opererade och registrerade med operationsnummer EMB10, EMB15, EMB20 eller EMB99 kombinerat med icke-malign diagnos har identifierats i Patientregistret och matchats, via personnummer, mot uppgifter från tonsillregistret.

Följande utfall av matchningen redovisas här:

- Antal patienter registrerade patienter i tonsillregistret för respektive klinik samt täckningsgraden, för dvs andelen patienter som bara förekommer i tonsillregistret av totalt antal opererade i Sverige den aktuella kliniken.
- Antal patienter i Patientregistret samt andelen patienter som kunde identifieras i Patientregistret av den hela kända populationen som tonsillopererats.
- I kolumnen Matchar visar antal och andel patienter som identifieras i båda tonsillregistret och i Patientregistret.
- Totalt antal opererade i Sverige. I kolumnen visas summan av unika individer i tonsillregistret och Patientregistret

Matchningen utfördes 161208 på uppgifter om operationer från 2015. I redovisningen finns alla enheter som rapporterat till Socialstyrelsen eller tonsillregistret, från både öppen- och slutenvård.

Resultat

Totalt är 13 599 tonsilloperationer registrerade i Patientregistret eller tonsillregistret. Det finns 12 843 patienter i Patientregistret medan det i tonsillregistret finns 11 441. Det förekommer att patienter är registrerade i tonsillregistret men inte i Patientregistret (n=756), och även motsatsen (n=2 158). Matchning av de två registren ger vid handen att det totalt utfördes 13 599 tonsilloperationer år 2015. Täckningsgrad blir då 84,1 %.

Under 2015 fanns det totalt 64 opererande enheter i Sverige och av dessa deltog 53 i registret, vilket ger en deltagandel på 83 %.

Sju kliniker hade 100 % täckningsgrad: Danderyds sjukhus, Serafimerlasarettet, Höglandssjukhuset, Lundby sjukhus, Karlskoga lasarett, Läkargruppen Örebro och Sollefteå sjukhus. Dessutom finns det 27 kliniker som hade över 90 % täckningsgrad!

Några kliniker registrerar inte i tonsillregistret: Forum VC Nacka, Karolinska Solna, Nacka sjukhus, Serafens vårdcentral, Täby Närsjukhus, Nyköpings lasarett, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes Universitetssjukhus Lund, Kungsbacka sjukhus, Köpings lasarett, Skellefteå lasarett och Gällivare lasarett.

Vi hjälper er gärna att komma igång med registreringarna, kontakta koordinatören på onh@registercentrum.se

Täckningsgradsjämförelse - Tonsilloperationsregistret vs. Patientregistret 2015 | Totalt

| År 2015 | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt |
|---|-------------------|------|------------------|------|---------|------|--------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal |
| RIKET | 11 441 | 84,1 | 12 843 | 94,4 | 10 685 | 78,6 | 13 599 |
| 01 Stockholm | 3 572 | 76,6 | 4 535 | 97,3 | 3 445 | 73,9 | 4 662 |
| Aleris specialistvård Sabbatsberg | 460 | 70 | 652 | 99,2 | 455 | 69,3 | 657 |
| Capio Drottningstan | 601 | 99,3 | 597 | 98,7 | 593 | 98 | 605 |
| Danderyds sjukhus | 410 | 100 | 406 | 99 | 406 | 99 | 410 |
| Doctorekliniken Älvsjö ÖNH | 227 | 91,9 | 243 | 98,4 | 223 | 90,3 | 247 |
| Forum VC / Nacka | 0 | 0 | 74 | 100 | 0 | 0 | 74 |
| Handens sjukhus | 11 | 84,6 | 8 | 61,5 | 6 | 46,2 | 13 |
| Jakobsbergs Sjukhus | 138 | 69,3 | 183 | 92 | 122 | 61,3 | 199 |
| Karolinska universitetssjukhuset Huddinge | 311 | 76,6 | 395 | 97,3 | 300 | 73,9 | 406 |
| Karolinska universitetssjukhuset Solna | 0 | 0 | 72 | 100 | 0 | 0 | 72 |
| Nacka sjukhus | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 13 |
| Serafens vårdcentral | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Serafimerlasarettet | 91 | 100 | 88 | 96,7 | 88 | 96,7 | 91 |
| Skärholmens ÖNH-centrum | 484 | 91,7 | 526 | 99,6 | 482 | 91,3 | 528 |
| Sollentuna Sjukhus | 76 | 95 | 80 | 100 | 76 | 95 | 80 |
| Sophiahemmet | 481 | 59,1 | 760 | 93,4 | 427 | 52,5 | 814 |
| Södermalms Läkarhus | 159 | 79,9 | 189 | 95 | 149 | 74,9 | 199 |
| Södertälje sjukhus | 122 | 96,1 | 123 | 96,9 | 118 | 92,9 | 127 |
| Täby Närsjukhus | 0 | 0 | 39 | 100 | 0 | 0 | 39 |
| Övriga privata aktörer i Stockholm | 1 | 0 | 82 | 100 | 0 | 0 | 83 |
| 03 Uppsala | 225 | 75,5 | 285 | 95,6 | 212 | 71,1 | 298 |
| Akademiska sjukhuset | 225 | 75,5 | 285 | 95,6 | 212 | 71,1 | 298 |
| 04 Södermanland | 197 | 84,2 | 227 | 97 | 190 | 81,2 | 234 |
| Mälarsjukhuset | 197 | 89,1 | 214 | 96,8 | 190 | 86 | 221 |
| Nyköpings lasarett | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 13 |
| 05 Östergötland | 273 | 86,7 | 311 | 98,7 | 269 | 85,4 | 315 |
| Universitetssjukhuset i Linköping | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 20 |
| Vrinnevisjukhuset | 273 | 92,5 | 291 | 98,6 | 269 | 91,2 | 295 |
| 06 Jönköping | 574 | 94,3 | 596 | 97,9 | 561 | 92,1 | 609 |
| Höglandssjukhuset | 106 | 100 | 100 | 94,3 | 100 | 94,3 | 106 |
| Länssjukhuset Ryhov | 468 | 93 | 496 | 98,6 | 461 | 91,7 | 503 |
| 07 Kronoberg | 171 | 76,7 | 220 | 98,7 | 168 | 75,3 | 223 |
| Centrallasarettet i Växjö | 133 | 74,3 | 178 | 99,4 | 132 | 73,7 | 179 |
| Ljungby lasarett | 38 | 86,4 | 42 | 95,5 | 36 | 81,8 | 44 |
| 08 Kalmar | 279 | 94,9 | 294 | 100 | 279 | 94,9 | 294 |
| Länssjukhuset i Kalmar | 186 | 93 | 200 | 100 | 186 | 93 | 200 |
| Västerviks sjukhus | 93 | 98,9 | 94 | 100 | 93 | 98,9 | 94 |
| 09 Gotland | 47 | 87 | 51 | 94,4 | 44 | 81,5 | 54 |
| Visby lasarett | 47 | 87 | 51 | 94,4 | 44 | 81,5 | 54 |
| 10 Blekinge | 185 | 92,5 | 196 | 98 | 181 | 90,5 | 200 |
| Blekingesjukhuset | 185 | 92,5 | 196 | 98 | 181 | 90,5 | 200 |
| 12 Skåne | 1 677 | 88,6 | 1 837 | 97,1 | 1 622 | 85,7 | 1 892 |
| Helsingborgs lasarett | 127 | 81,9 | 146 | 94,2 | 118 | 76,1 | 155 |
| Kristianstads sjukhus | 442 | 92,7 | 462 | 96,9 | 427 | 89,5 | 477 |

| År 2015 | Kvalitetsregister | | Patientregistret | | Matchar | | Totalt |
|-----------------------------------|-------------------|------|------------------|------|---------|------|--------|
| | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal |
| Skånes universitetssjukhus Malmö | 4 | 21,1 | 19 | 100 | 4 | 21,1 | 19 |
| Trelleborgs lasarett | 358 | 86,7 | 406 | 98,3 | 351 | 85 | 413 |
| Universitetssjukhuset i Lund | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 |
| Ystads lasarett | 353 | 95,7 | 352 | 95,4 | 336 | 91,1 | 369 |
| Ängelholms sjukhus | 393 | 96,1 | 402 | 98,3 | 386 | 94,4 | 409 |
| 13 Halland | 369 | 79,2 | 458 | 98,3 | 361 | 77,5 | 466 |
| Hallands sjukhus Halmstad | 369 | 92 | 393 | 98 | 361 | 90 | 401 |
| Hallands sjukhus Kungsbacka | 0 | 0 | 65 | 100 | 0 | 0 | 65 |
| 14 Västra Götaland | 1 479 | 92,9 | 1 350 | 84,8 | 1 237 | 77,7 | 1 592 |
| Lundby sjukhus | 199 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| NU-sjukvården | 263 | 96 | 270 | 98,5 | 259 | 94,5 | 274 |
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | 341 | 82,2 | 394 | 94,9 | 320 | 77,1 | 415 |
| Skaraborgs sjukhus | 265 | 95,7 | 272 | 98,2 | 260 | 93,9 | 277 |
| Södra Älvsborgs sjukhus | 288 | 97,3 | 284 | 95,9 | 276 | 93,2 | 296 |
| Västra Frölunda sjukhus | 123 | 93,9 | 130 | 99,2 | 122 | 93,1 | 131 |
| 17 Värmland | 300 | 93,5 | 312 | 97,2 | 291 | 90,7 | 321 |
| Karlstads sjukhus | 300 | 93,5 | 312 | 97,2 | 291 | 90,7 | 321 |
| 18 Örebro | 343 | 96,1 | 203 | 56,9 | 189 | 52,9 | 357 |
| Karlskoga lasarett | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 |
| Lindesbergs lasarett | 72 | 90 | 80 | 100 | 72 | 90 | 80 |
| Läkargruppen Örebro | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Universitetssjukhuset Örebro | 63 | 91,3 | 68 | 98,6 | 62 | 89,9 | 69 |
| 19 Västmanland | 109 | 91,6 | 119 | 100 | 109 | 91,6 | 119 |
| Köpings lasarett | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Västerås lasarett | 109 | 92,4 | 118 | 100 | 109 | 92,4 | 118 |
| 20 Dalarna | 353 | 80,6 | 433 | 98,9 | 348 | 79,5 | 438 |
| Falu lasarett | 353 | 80,6 | 433 | 98,9 | 348 | 79,5 | 438 |
| 21 Gävleborg | 434 | 92,9 | 452 | 96,8 | 419 | 89,7 | 467 |
| Gävle sjukhus | 267 | 91,4 | 280 | 95,9 | 255 | 87,3 | 292 |
| Hudiksvalls sjukhus | 167 | 95,4 | 172 | 98,3 | 164 | 93,7 | 175 |
| 22 Västernorrland | 187 | 79,9 | 209 | 89,3 | 162 | 69,2 | 234 |
| Sollefteå sjukhus | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 |
| Sundsvalls sjukhus | 130 | 74,7 | 150 | 86,2 | 106 | 60,9 | 174 |
| Örnsköldsviks sjukhus | 44 | 93,6 | 46 | 97,9 | 43 | 91,5 | 47 |
| 23 Jämtland | 96 | 66,2 | 119 | 82,1 | 70 | 48,3 | 145 |
| Östersunds sjukhus | 96 | 66,2 | 119 | 82,1 | 70 | 48,3 | 145 |
| 24 Västerbotten | 271 | 80,4 | 310 | 92 | 244 | 72,4 | 337 |
| Norrlands universitetssjukhus | 271 | 81,4 | 306 | 91,9 | 244 | 73,3 | 333 |
| Skellefteå lasarett | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| 25 Norrbotten | 300 | 87,7 | 326 | 95,3 | 284 | 83 | 342 |
| Gällivare lasarett | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| Sunderbyns sjukhus | 300 | 90,4 | 316 | 95,2 | 284 | 85,5 | 332 |

Källa: Tonsilloperationsregistret, Patientregistret
REGISTERSERVICE
registerservice@socialstyrelsen.se
2016-12-08

Kliniktabel – data från tonsilloperationsregistret

I årets kliniks specifika återrapportering från tonsilloperationsregistret visas resultaten för tonsillektomi, tonsillektomi+abrasio, tonsillotomi samt tonsillotomi+abrasio separat. Detta möjliggör en noggrann uppföljning av klinikens resultat. I sammanställningarna redovisas data både för 2015 och för perioden 2011-2014. Historiska data för 2011-2014 redovisas för jämförelser över tid. För resultat i realtid hänvisas till hemsidan.

JOACIM STALFORS OCH OLA SUNNERGREN

Sammanställningen av data omfattar ett urval av de uppgifter som insamlas via de tre enkäterna som finns i tonsilloperationsregistret:



Varje kliniks resultat redovisas på fyra sidor, en sida för varje typ av tonsilloperation. Operationstyp och klinikens namn finns överst på sidan. I kolumnen "Kliniken 2015" finns de data som registrerats för 2015 och i kolumnen "Nationen 2015" finns motsvarande data för hela riket (2015). I kolumnen "Kliniken 2011-2014" redovisas medelvärde för de fyra tidigare åren för jämförelse. I kolumnen längst till höger finns trendlinjer för att åskådliggöra utveckling och skillnader över tiden. Data som presenteras är inmatat i registret tom 22 aug 2016.

BEGREPPSFÖRKLARING

Täckningsgrad:

Den andel av klinikens/ nationens tonsilloperationer som registrerats i tonsilloperationsregistret av det totala antalet kända operationer baserat på uppgifter från både Patientregistret och tonsilloperationsregistret.

Indikation:

"Obstruktion/snarkning" inkluderar indikationen luftvägsobstruktion/snarkning/hypertrofa tonsiller.

"Infektion" inkluderar indikationerna frekventa tonsilliter, kronisk tonsillit samt peritonsillit.

Operationsteknik:

Kall teknik inkluderar kallt stål.

Varm teknik inkluderar: radiofrekvens, diatermisax, ultracission, samt bipolär diatermi.

Annan teknik används om ”annan teknik” är vald på enkäten eller om mer än en teknik är registrerad.

Blodstillningsmetod:

Kall teknik inkluderar: ingen registrerad kompressionsmetod dvs. kompression, infiltrationsanestesi med adrenalin, ligatur samt suturligatur. Varm teknik inkluderar: alla former av diatermi och radiofrekvens. Annan teknik används om ”annan teknik” är vald på enkäten eller om mer än en teknik är registrerad.

Blödning under vårdtiden:

anger hur många registreringar som finns för ”postoperativ blödning som krävt åtgärd” från första enkäten.

Komplikationer

Indikatorerna kommer från 30-dagars enkäten. För att kunna värdera representativiteten av data redovisas även svarsfrekvensen på 30-dagars enkäten.

- **Kontaktat sjukvården pga. blödning:** Patienter/närstående som angett att de (eller den som opererats) kontaktat sjukvården pga. blödning.
- **Inlagd pga. blödning:** Patienter/närstående som angett att de (eller den som opererats) blivit återinlagda pga. en postoperativ blödning.

- **Reopererats pga. blödning:** Patienter/närstående som angett att de (eller den som opererats) reopererats pga. blödning.

- **Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta:** Patienter/närstående som angett att de (eller den som opererats) behövt kontakta sjukvården pga. smärta.

- **Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion:** Patienter/närstående som angett att de (eller den som opererats) behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion.

- **Tagit del av informationen på tonsilloperation.se:** Patienter/närstående som angett att de tagit del av informationen på tonsilloperation.se.

Patientnytta

Indikatorn kommer från 6 månaders enkäten. För att kunna värdera representativiteten av data redovisas även svarsfrekvensen.

Patienten graderar nyttan med den tonsilloperation de genomgått genom att välja något av följande påståenden: ”Besvären är borta”, ”Jag har blivit *ganska* bra från mina besvär”, ”Jag har kvar mina besvär”, ”Mina besvär har förvärrats”.

Innehållsförteckning Tonsilloperationsregistret

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| Hela riket..... | sid. 43 | 10032 Skaraborgs sjukhus..... | sid. 151 |
| 10001 Akademiska sjukhuset | sid. 47 | 10033 Länssjukhuset i Sundsvall | sid. 155 |
| 10002 Karolinska Universitetssjukhuset..... | sid. 51 | 10034 Lasarettet Trelleborg..... | sid. 159 |
| 10003 Danderyds öron-, näs- och halsklinik,..... | sid. 55 | 10035 Höglandssjukhuset Eksjö..... | sid. 163 |
| 10006 Hudiksvalls sjukhus..... | sid. 59 | 10036 NU-sjukvården, Trollhättan | sid. 167 |
| 10007 Capio Läkargruppen, Örebro..... | sid. 63 | 10037 Norrlands Universitetssjukhus..... | sid. 171 |
| 10010 Norrbotten läns landsting..... | sid. 67 | 10038 Visby lasarett | sid. 175 |
| 10011 Södertälje sjukhus..... | sid. 71 | 10040 Västerviks sjukhus | sid. 179 |
| 10012 Skärholmens ÖNH-centrum..... | sid. 75 | 10041 Västmanlands sjukhus, Västerås..... | sid. 183 |
| 10014 Sabbatsbergs sjukhus, Aleris..... | sid. 79 | 10042 Centrallasarettet Växjö..... | sid. 187 |
| 10015 Södra Älvsborgs Sjukhus | sid. 83 | 10043 Lasarettet i Ystad..... | sid. 191 |
| 10016 Falu lasarett | sid. 87 | 10044 Ängelholms sjukhus..... | sid. 195 |
| 10017 Gävle sjukhus | sid. 91 | 10045 Universitetssjukhuset Örebro..... | sid. 199 |
| 10018 Sahlgrenska universitetssjukhuset..... | sid. 95 | 10046 Örnsköldsviks sjukhus..... | sid. 203 |
| 10019 Hallands sjukhus, Halmstad..... | sid. 99 | 10047 Östersunds sjukhus..... | sid. 207 |
| 10020 Helsingborgs lasarett | sid. 103 | 10048 Sophiahemmet | sid. 211 |
| 10021 Länssjukhuset Ryhov, Jönköping..... | sid. 107 | 10049 Frölunda Specialistsjukhus | sid. 215 |
| 10022 Länssjukhuset i Kalmar | sid. 111 | 10050 Södermalm ÖNH | sid. 219 |
| 10023 Karlskoga lasarett..... | sid. 115 | 10051 Sollefteå sjukhus | sid. 223 |
| 10024 Blekingesjukhuset | sid. 119 | 10052 Capio ÖNH Globen | sid. 227 |
| 10025 Centralsjukhuset i Karlstad | sid. 123 | 10054 Serafimerlasarettet | sid. 231 |
| 10026 Centralsjukhuset Kristianstad..... | sid. 127 | 10055 Sörmland ÖNH..... | sid. 235 |
| 10027 Lindesbergs lasarett | sid. 131 | 10056 Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg | sid. 239 |
| 10028 Ljungby lasarett..... | sid. 135 | 10058 Aleris Specialistvård Handen..... | sid. 243 |
| 10029 Lundby Sjukhus, Capio | sid. 139 | 10059 Doctorekliniken Älvsjö ÖNH..... | sid. 247 |
| 10030 Skåne Universitetssjukhus, Malmö | sid. 143 | 10060 Sollentuna Specialistklinik | sid. 251 |
| 10031 Vrinnevisjukhuset i Norrköping | sid. 147 | 10061 Plentkliniken, Västerås | sid. 255 |

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 84% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 4497 | 4497 | 4495.0 | |
| Kön | Kvinnor | 2660 (59.2%) | 2660 (59.2%) | 2635.8 (58.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.4 | 23.4 | 22.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 901 (20.0%) | 901 (20.0%) | 972.0 (21.6%) | |
| | Infektion | 3399 (75.6%) | 3399 (75.6%) | 3358.5 (74.7%) | |
| | Annan | 197 (4.4%) | 197 (4.4%) | 164.5 (3.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3000 (67.3%) | 3000 (67.3%) | 2341.0 (52.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 3216 (72.1%) | 3216 (72.1%) | 3134.8 (69.9%) | |
| | Varm teknik | 1159 (26.0%) | 1159 (26.0%) | 1256.5 (28.0%) | |
| | Annan teknik | 87 (1.9%) | 87 (1.9%) | 95.8 (2.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 904 (20.1%) | 904 (20.1%) | 670.5 (14.9%) | |
| | Varm teknik | 3472 (77.2%) | 3472 (77.2%) | 3630.5 (80.8%) | |
| | Annan teknik | 121 (2.7%) | 121 (2.7%) | 194.0 (4.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 129 (3.0%) | 129 (3.0%) | 138.0 (3.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2298 (51.1%) | 2298 (51.1%) | 2571.3 (57.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 323 (14.4%) | 323 (14.4%) | 338.0 (14.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 211 (9.5%) | 211 (9.5%) | 234.0 (10.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 64 (2.9%) | 64 (2.9%) | 74.8 (3.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 614 (27.5%) | 614 (27.5%) | 669.0 (28.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 184 (8.3%) | 184 (8.3%) | 274.3 (11.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1207 (54.3%) | 1207 (54.3%) | 657.3 (42.9%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2078 (46.2%) | 2078 (46.2%) | 1908.0 (42.4%) | |
| | Besvären är borta | 1502 (72.8%) | 1502 (72.8%) | 1312.0 (74.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 478 (23.2%) | 478 (23.2%) | 390.0 (22.0%) | |
| | Besvären är kvar | 72 (3.5%) | 72 (3.5%) | 59.3 (3.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 10 (0.5%) | 10 (0.5%) | 9.8 (0.6%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Hela Riket

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 84% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 1804 | 1804 | 1609.5 | |
| Kön | Kvinnor | 803 (44.5%) | 803 (44.5%) | 731.0 (45.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.4 | 7.4 | 7.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1362 (75.5%) | 1362 (75.5%) | 1189.5 (73.9%) | |
| | Infektion | 421 (23.3%) | 421 (23.3%) | 403.5 (25.1%) | |
| | Annan | 21 (1.2%) | 21 (1.2%) | 16.5 (1.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1262 (71.4%) | 1262 (71.4%) | 821.8 (51.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1317 (73.7%) | 1317 (73.7%) | 1216.3 (75.8%) | |
| | Varm teknik | 456 (25.5%) | 456 (25.5%) | 366.0 (22.8%) | |
| | Annan teknik | 13 (0.7%) | 13 (0.7%) | 23.3 (1.4%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 672 (37.3%) | 672 (37.3%) | 389.3 (24.2%) | |
| | Varm teknik | 1066 (59.1%) | 1066 (59.1%) | 1170.0 (72.7%) | |
| | Annan teknik | 66 (3.7%) | 66 (3.7%) | 50.3 (3.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 23 (1.4%) | 23 (1.4%) | 32.8 (2.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 804 (44.6%) | 804 (44.6%) | 914.3 (56.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 46 (5.9%) | 46 (5.9%) | 58.8 (7.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 31 (4.0%) | 31 (4.0%) | 42.5 (5.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 9 (1.2%) | 9 (1.2%) | 13.8 (1.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 124 (16.1%) | 124 (16.1%) | 161.0 (19.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 64 (8.3%) | 64 (8.3%) | 77.0 (9.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 403 (51.7%) | 403 (51.7%) | 219.8 (42.2%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 705 (39.1%) | 705 (39.1%) | 625.3 (38.8%) | |
| | Besvären är borta | 469 (67.1%) | 469 (67.1%) | 452.5 (76.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 197 (28.2%) | 197 (28.2%) | 121.5 (20.6%) | |
| | Besvären är kvar | 30 (4.3%) | 30 (4.3%) | 15.5 (2.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 3 (0.4%) | 3 (0.4%) | 1.0 (0.2%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 84% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 593 | 593 | 719.0 | |
| Kön | Kvinnor | 296 (49.9%) | 296 (49.9%) | 352.8 (49.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 10.4 | 10.4 | 10.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 555 (93.6%) | 555 (93.6%) | 646.0 (89.8%) | |
| | Infektion | 22 (3.7%) | 22 (3.7%) | 53.8 (7.5%) | |
| | Annan | 16 (2.7%) | 16 (2.7%) | 19.3 (2.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 489 (84.0%) | 489 (84.0%) | 542.3 (75.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 14 (2.4%) | 14 (2.4%) | 18.8 (2.6%) | |
| | Varm teknik | 543 (92.0%) | 543 (92.0%) | 694.3 (96.6%) | |
| | Annan teknik | 33 (5.6%) | 33 (5.6%) | 5.5 (0.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 218 (36.8%) | 218 (36.8%) | 202.8 (28.2%) | |
| | Varm teknik | 339 (57.2%) | 339 (57.2%) | 418.3 (58.2%) | |
| | Annan teknik | 36 (6.1%) | 36 (6.1%) | 98.0 (13.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (0.5%) | 3 (0.5%) | 6.3 (0.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 317 (53.5%) | 317 (53.5%) | 456.0 (63.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 8 (2.6%) | 8 (2.6%) | 14.8 (3.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (1.3%) | 4 (1.3%) | 8.0 (1.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 3 (1.0%) | 3 (1.0%) | 2.5 (0.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 23 (7.5%) | 23 (7.5%) | 37.8 (8.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 8 (2.6%) | 8 (2.6%) | 24.0 (5.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 165 (53.4%) | 165 (53.4%) | 113.3 (39.2%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 281 (47.4%) | 281 (47.4%) | 335.0 (46.6%) |
| Besvären är borta | | 162 (58.1%) | 162 (58.1%) | 212.3 (68.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 89 (31.9%) | 89 (31.9%) | 79.0 (25.3%) | |
| Besvären är kvar | | 24 (8.6%) | 24 (8.6%) | 20.3 (6.5%) | |
| Besvären har förvärrats | | 4 (1.4%) | 4 (1.4%) | 0.8 (0.2%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Nationen 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 84% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 4618 | 4618 | 3667.0 | |
| Kön | Kvinnor | 1982 (42.9%) | 1982 (42.9%) | 1559.3 (42.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.1 | 5.1 | 5.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4568 (98.9%) | 4568 (98.9%) | 3618.5 (98.7%) | |
| | Infektion | 31 (0.7%) | 31 (0.7%) | 30.8 (0.8%) | |
| | Annan | 19 (0.4%) | 19 (0.4%) | 17.8 (0.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3905 (85.9%) | 3905 (85.9%) | 2685.8 (73.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 281 (6.1%) | 281 (6.1%) | 73.0 (2.0%) | |
| | Varm teknik | 4153 (90.6%) | 4153 (90.6%) | 3557.3 (97.3%) | |
| | Annan teknik | 150 (3.3%) | 150 (3.3%) | 26.0 (0.7%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1850 (40.1%) | 1850 (40.1%) | 1363.5 (37.2%) | |
| | Varm teknik | 2566 (55.6%) | 2566 (55.6%) | 1879.5 (51.3%) | |
| | Annan teknik | 202 (4.4%) | 202 (4.4%) | 424.0 (11.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 47 (1.1%) | 47 (1.1%) | 35.8 (1.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2457 (53.2%) | 2457 (53.2%) | 2261.8 (61.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 61 (2.5%) | 61 (2.5%) | 35.3 (1.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 31 (1.3%) | 31 (1.3%) | 19.3 (0.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 5.5 (0.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 165 (6.9%) | 165 (6.9%) | 134.0 (6.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 119 (5.0%) | 119 (5.0%) | 117.3 (5.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1234 (52.0%) | 1234 (52.0%) | 618.3 (41.3%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2157 (46.7%) | 2157 (46.7%) | 1699.8 (46.4%) |
| Besvären är borta | | 1425 (66.3%) | 1425 (66.3%) | 1135.8 (71.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 604 (28.1%) | 604 (28.1%) | 382.0 (24.0%) | |
| Besvären är kvar | | 113 (5.3%) | 113 (5.3%) | 70.3 (4.4%) | |
| Besvären har förvärrats | | 6 (0.3%) | 6 (0.3%) | 5.8 (0.4%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 76% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 104 | 4497 | 160.8 | |
| Kön | Kvinnor | 52 (50.0%) | 2660 (59.2%) | 88.3 (54.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.4 | 23.4 | 24.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 18 (17.3%) | 901 (20.0%) | 32.0 (19.9%) | |
| | Infektion | 79 (76.0%) | 3399 (75.6%) | 115.3 (71.7%) | |
| | Annan | 7 (6.7%) | 197 (4.4%) | 13.5 (8.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 69 (66.3%) | 3000 (67.3%) | 61.3 (38.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 97 (94.2%) | 3216 (72.1%) | 38.8 (24.1%) | |
| | Varm teknik | 2 (1.9%) | 1159 (26.0%) | 121.8 (75.7%) | |
| | Annan teknik | 4 (3.9%) | 87 (1.9%) | 0.3 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 12 (11.5%) | 904 (20.1%) | 10.3 (6.4%) | |
| | Varm teknik | 84 (80.8%) | 3472 (77.2%) | 149.0 (92.7%) | |
| | Annan teknik | 8 (7.7%) | 121 (2.7%) | 1.5 (0.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (3.8%) | 129 (3.0%) | 7.0 (4.4%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 57 (54.8%) | 2298 (51.1%) | 81.0 (50.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 11 (20.4%) | 323 (14.4%) | 14.0 (17.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 9 (16.4%) | 211 (9.5%) | 10.8 (13.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (3.7%) | 64 (2.9%) | 2.0 (2.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 17 (30.9%) | 614 (27.5%) | 29.0 (36.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 6 (11.5%) | 184 (8.3%) | 8.8 (11.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 26 (49.1%) | 1207 (54.3%) | 19.8 (42.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 45 (43.3%) | 2078 (46.2%) | 51.5 (32.0%) | |
| | Besvären är borta | 32 (71.1%) | 1502 (72.8%) | 38.8 (75.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 12 (26.7%) | 478 (23.2%) | 10.8 (21.0%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.2%) | 72 (3.5%) | 1.3 (2.4%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.5 (1.0%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Akademiska sjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 76% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 7 | 1804 | 21.3 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (57.1%) | 803 (44.5%) | 9.8 (45.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.6 | 7.4 | 10.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (85.7%) | 1362 (75.5%) | 12.0 (56.5%) | |
| | Infektion | 1 (14.3%) | 421 (23.3%) | 8.5 (40.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.8 (3.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3 (42.9%) | 1262 (71.4%) | 5.5 (25.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 5 (71.4%) | 1317 (73.7%) | 6.0 (28.2%) | |
| | Varm teknik | 2 (28.6%) | 456 (25.5%) | 15.3 (71.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (14.3%) | 672 (37.3%) | 1.8 (8.2%) | |
| | Varm teknik | 6 (85.7%) | 1066 (59.1%) | 19.3 (90.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.3 (1.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.8 (3.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 (28.6%) | 804 (44.6%) | 12.3 (57.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 1.0 (8.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 1.0 (8.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (50.0%) | 124 (16.1%) | 3.5 (29.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (50.0%) | 64 (8.3%) | 1.5 (12.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (50.0%) | 403 (51.7%) | 2.5 (38.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 (14.3%) | 705 (39.1%) | 9.3 (43.5%) | |
| | Besvären är borta | 0 | 469 (67.1%) | 7.0 (77.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (100%) | 197 (28.2%) | 1.8 (19.4%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (2.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 76% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 14 | 593 | 24.0 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (50.0%) | 296 (49.9%) | 10.8 (44.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.3 | 10.4 | 11.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 11 (78.6%) | 555 (93.6%) | 19.8 (82.3%) | |
| | Infektion | 2 (14.3%) | 22 (3.7%) | 1.8 (7.3%) | |
| | Annan | 1 (7.1%) | 16 (2.7%) | 2.5 (10.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 12 (85.7%) | 489 (84.0%) | 21.5 (89.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 (15.4%) | 14 (2.4%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Varm teknik | 11 (84.6%) | 543 (92.0%) | 23.8 (99.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (14.3%) | 218 (36.8%) | 2.0 (8.3%) | |
| | Varm teknik | 10 (71.4%) | 339 (57.2%) | 21.8 (90.6%) | |
| | Annan teknik | 2 (14.3%) | 36 (6.1%) | 0.3 (1.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 6 (42.9%) | 317 (53.5%) | 13.5 (56.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (16.7%) | 8 (2.6%) | 0.5 (3.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (16.7%) | 4 (1.3%) | 0.3 (1.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (16.7%) | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (33.3%) | 23 (7.5%) | 1.8 (13.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (16.7%) | 8 (2.6%) | 0.3 (1.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (33.3%) | 165 (53.4%) | 1.5 (24.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 6 (42.9%) | 281 (47.4%) | 7.8 (32.3%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 4 (66.7%) | 162 (58.1%) | 4.0 (55.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (16.7%) | 89 (31.9%) | 2.8 (37.9%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (16.7%) | 24 (8.6%) | 0.5 (6.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Akademiska sjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 76% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 102 | 4618 | 103.0 | |
| Kön | Kvinnor | 45 (44.1%) | 1982 (42.9%) | 38.8 (37.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.3 | 5.1 | 5.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 97 (95.1%) | 4568 (98.9%) | 100.3 (97.3%) | |
| | Infektion | 1 (1.0%) | 31 (0.7%) | 1.0 (1.0%) | |
| | Annan | 4 (3.9%) | 19 (0.4%) | 1.8 (1.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 93 (91.2%) | 3905 (85.9%) | 92.5 (89.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 4 (3.9%) | 281 (6.1%) | 1.5 (1.5%) | |
| | Varm teknik | 98 (96.1%) | 4153 (90.6%) | 101.3 (98.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 22 (21.6%) | 1850 (40.1%) | 15.3 (14.8%) | |
| | Varm teknik | 64 (62.7%) | 2566 (55.6%) | 85.3 (82.8%) | |
| | Annan teknik | 16 (15.7%) | 202 (4.4%) | 2.5 (2.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 1.5 (1.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 41 (40.2%) | 2457 (53.2%) | 54.0 (52.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 2.3 (4.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 1.0 (1.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (12.2%) | 165 (6.9%) | 8.3 (15.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (7.5%) | 119 (5.0%) | 5.8 (10.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 21 (52.5%) | 1234 (52.0%) | 11.8 (34.8%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 43 (42.2%) | 2157 (46.7%) | 32.5 (31.6%) | |
| | Besvären är borta | 32 (74.4%) | 1425 (66.3%) | 21.5 (66.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 10 (23.3%) | 604 (28.1%) | 8.5 (26.4%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.3%) | 113 (5.3%) | 2.0 (6.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.8%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Karolinska Solna är registrerad i kvalitetsregistret | | 77% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 71 | 4497 | 240.3 | |
| Kön | Kvinnor | 37 (52.1%) | 2660 (59.2%) | 134.5 (56.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.9 | 23.4 | 20.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 30 (42.3%) | 901 (20.0%) | 55.0 (22.9%) | |
| | Infektion | 27 (38.0%) | 3399 (75.6%) | 178.3 (74.2%) | |
| | Annan | 14 (19.7%) | 197 (4.4%) | 7.0 (2.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (7.8%) | 3000 (67.3%) | 151.8 (63.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 69 (97.2%) | 3216 (72.1%) | 110.5 (46.0%) | |
| | Varm teknik | 1 (1.4%) | 1159 (26.0%) | 129.0 (53.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (1.4%) | 87 (1.9%) | 0.8 (0.3%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 15 (21.1%) | 904 (20.1%) | 48.0 (20.0%) | |
| | Varm teknik | 56 (78.9%) | 3472 (77.2%) | 187.0 (77.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 5.3 (2.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 11 (15.7%) | 129 (3.0%) | 8.3 (3.4%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 33 (46.5%) | 2298 (51.1%) | 163.0 (67.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (16.1%) | 323 (14.4%) | 18.5 (12.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (12.1%) | 211 (9.5%) | 14.0 (9.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (3.0%) | 64 (2.9%) | 3.5 (2.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (15.6%) | 614 (27.5%) | 43.3 (29.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (12.9%) | 184 (8.3%) | 21.5 (14.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 16 (50.0%) | 1207 (54.3%) | 22.8 (36.3%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 27 (38.0%) | 2078 (46.2%) | 89.5 (37.3%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 18 (69.2%) | 1502 (72.8%) | 61.3 (70.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (15.4%) | 478 (23.2%) | 19.8 (22.6%) | |
| | Besvären är kvar | 4 (15.4%) | 72 (3.5%) | 5.5 (6.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 1.0 (1.1%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Karolinska Universitetssjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Karolinska Solna är registrerad i kvalitetsregistret | | 77% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 175 | 1804 | 233.8 | |
| Kön | Kvinnor | 66 (37.7%) | 803 (44.5%) | 95.8 (41.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.1 | 7.4 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 164 (93.7%) | 1362 (75.5%) | 203.3 (87.0%) | |
| | Infektion | 8 (4.6%) | 421 (23.3%) | 29.0 (12.4%) | |
| | Annan | 3 (1.7%) | 21 (1.2%) | 1.5 (0.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (3.2%) | 1262 (71.4%) | 59.3 (25.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 165 (94.8%) | 1317 (73.7%) | 184.3 (78.8%) | |
| | Varm teknik | 9 (5.2%) | 456 (25.5%) | 48.5 (20.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 1.0 (0.4%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 64 (36.6%) | 672 (37.3%) | 44.0 (18.8%) | |
| | Varm teknik | 111 (63.4%) | 1066 (59.1%) | 183.8 (78.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 6.0 (2.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 9 (5.2%) | 23 (1.4%) | 7.3 (3.1%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 82 (46.9%) | 804 (44.6%) | 151.3 (64.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (4.9%) | 46 (5.9%) | 7.3 (5.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.2%) | 31 (4.0%) | 4.5 (3.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.2%) | 9 (1.2%) | 1.3 (0.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 10 (12.8%) | 124 (16.1%) | 28.0 (21.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 7 (9.1%) | 64 (8.3%) | 14.8 (11.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 35 (43.8%) | 403 (51.7%) | 30.3 (38.3%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 74 (42.3%) | 705 (39.1%) | 73.5 (31.4%) | |
| | Besvären är borta | 46 (63.9%) | 469 (67.1%) | 52.5 (72.9%) | |
| | Blivit ganska bra | 22 (30.6%) | 197 (28.2%) | 16.5 (22.9%) | |
| | Besvären är kvar | 3 (4.2%) | 30 (4.3%) | 3.0 (4.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (1.4%) | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Karolinska Solna är registrerad i kvalitetsregistret | | 77% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 4 | 593 | 28.8 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 296 (49.9%) | 11.8 (40.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.7 | 10.4 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 (50.0%) | 555 (93.6%) | 25.3 (87.8%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.5 (1.7%) | |
| | Annan | 2 (50.0%) | 16 (2.7%) | 3.0 (10.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 489 (84.0%) | 16.8 (58.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Varm teknik | 4 (100%) | 543 (92.0%) | 28.5 (99.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (50.0%) | 218 (36.8%) | 14.8 (51.3%) | |
| | Varm teknik | 1 (25.0%) | 339 (57.2%) | 11.0 (38.3%) | |
| | Annan teknik | 1 (25.0%) | 36 (6.1%) | 3.0 (10.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (25.0%) | 3 (0.5%) | 0.3 (0.9%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 2 (50.0%) | 317 (53.5%) | 22.0 (76.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (2.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (1.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.0 (5.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 1.0 (5.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 165 (53.4%) | 2.3 (32.1%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 1 (25.0%) | 281 (47.4%) | 10.8 (37.4%) | |
| | Besvären är borta | 0 | 162 (58.1%) | 6.3 (59.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (100%) | 89 (31.9%) | 3.3 (31.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 1.0 (9.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Karolinska Universitetssjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Karolinska Solna är registrerad i kvalitetsregistret | | 77% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 66 | 4618 | 291.8 | |
| Kön | Kvinnor | 19 (28.8%) | 1982 (42.9%) | 114.0 (39.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 3.3 | 5.1 | 4.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 65 (98.5%) | 4568 (98.9%) | 288.3 (98.8%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 1 (1.5%) | 19 (0.4%) | 3.5 (1.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (10.5%) | 3905 (85.9%) | 129.8 (44.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 2.0 (0.7%) | |
| | Varm teknik | 62 (93.9%) | 4153 (90.6%) | 289.3 (99.1%) | |
| | Annan teknik | 4 (6.1%) | 150 (3.3%) | 0.5 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 33 (50.0%) | 1850 (40.1%) | 148.3 (50.8%) | |
| | Varm teknik | 31 (47.0%) | 2566 (55.6%) | 108.8 (37.3%) | |
| | Annan teknik | 2 (3.0%) | 202 (4.4%) | 34.8 (11.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.5%) | 47 (1.1%) | 1.5 (0.5%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 31 (47.0%) | 2457 (53.2%) | 209.8 (71.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (3.2%) | 61 (2.5%) | 2.8 (1.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 1.5 (0.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (6.5%) | 165 (6.9%) | 8.5 (4.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (6.7%) | 119 (5.0%) | 11.3 (6.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 15 (48.4%) | 1234 (52.0%) | 33.3 (39.1%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 31 (47.0%) | 2157 (46.7%) | 119.5 (41.0%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 16 (51.6%) | 1425 (66.3%) | 77.0 (66.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 11 (35.5%) | 604 (28.1%) | 32.0 (27.6%) | |
| | Besvären är kvar | 4 (12.9%) | 113 (5.3%) | 6.5 (5.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.5 (0.4%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 159 | 4497 | 105.0 | |
| Kön | Kvinnor | 81 (50.9%) | 2660 (59.2%) | 52.0 (49.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 17.8 | 23.4 | 17.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 57 (35.8%) | 901 (20.0%) | 32.0 (30.5%) | |
| | Infektion | 101 (63.5%) | 3399 (75.6%) | 72.0 (68.6%) | |
| | Annan | 1 (0.6%) | 197 (4.4%) | 1.0 (1.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 159 (100%) | 3000 (67.3%) | 105.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 3216 (72.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 158 (100%) | 1159 (26.0%) | 102.0 (99.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 1.0 (1.0%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 1.0 (1.0%) | |
| | Varm teknik | 159 (100%) | 3472 (77.2%) | 104.0 (99.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (2.5%) | 129 (3.0%) | 3.0 (2.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 71 (44.7%) | 2298 (51.1%) | 22.0 (21.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 11 (16.2%) | 323 (14.4%) | 3.0 (14.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 7 (10.3%) | 211 (9.5%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (3.0%) | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 15 (22.7%) | 614 (27.5%) | 2.0 (10.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (6.2%) | 184 (8.3%) | 1.0 (4.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 41 (61.2%) | 1207 (54.3%) | 12.0 (54.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 61 (38.4%) | 2078 (46.2%) | 33.0 (31.4%) | |
| | Besvären är borta | 46 (75.4%) | 1502 (72.8%) | 24.0 (72.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 14 (23.0%) | 478 (23.2%) | 5.0 (15.2%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (1.6%) | 72 (3.5%) | 4.0 (12.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 135 | 1804 | 110.0 | |
| Kön | Kvinnor | 57 (42.2%) | 803 (44.5%) | 41.0 (37.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.9 | 7.4 | 6.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 115 (85.2%) | 1362 (75.5%) | 92.0 (83.6%) | |
| | Infektion | 19 (14.1%) | 421 (23.3%) | 18.0 (16.4%) | |
| | Annan | 1 (0.7%) | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 135 (100%) | 1262 (71.4%) | 109.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 1317 (73.7%) | 0 | |
| | Varm teknik | 135 (100%) | 456 (25.5%) | 109.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (0.7%) | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 134 (99.3%) | 1066 (59.1%) | 110.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.7%) | 23 (1.4%) | 4.0 (3.6%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 53 (39.3%) | 804 (44.6%) | 33.0 (30.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (3.9%) | 46 (5.9%) | 1.0 (3.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (3.9%) | 31 (4.0%) | 1.0 (3.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (2.0%) | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 13 (26.0%) | 124 (16.1%) | 11.0 (33.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 2.0 (6.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 29 (56.9%) | 403 (51.7%) | 19.0 (57.6%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 47 (34.8%) | 705 (39.1%) | 25.0 (22.7%) | |
| | Besvären är borta | 31 (66.0%) | 469 (67.1%) | 17.0 (68.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 15 (31.9%) | 197 (28.2%) | 8.0 (32.0%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.1%) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 10 | 593 | 13.0 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (70.0%) | 296 (49.9%) | 3.0 (23.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 3.7 | 10.4 | 4.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 10 (100%) | 555 (93.6%) | 13.0 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 (100%) | 489 (84.0%) | 13.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 10 (100%) | 543 (92.0%) | 13.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0 | |
| | Varm teknik | 10 (100%) | 339 (57.2%) | 13.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 1.0 (7.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 5 (50.0%) | 317 (53.5%) | 4.0 (30.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (20.0%) | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (80.0%) | 165 (53.4%) | 2.0 (50.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (50.0%) | 281 (47.4%) | 7.0 (53.8%) |
| Besvären är borta | | 4 (80.0%) | 162 (58.1%) | 5.0 (71.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (20.0%) | 89 (31.9%) | 2.0 (28.6%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 111 | 4618 | 81.0 | |
| Kön | Kvinnor | 38 (34.2%) | 1982 (42.9%) | 25.0 (30.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.8 | 5.1 | 4.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 111 (100%) | 4568 (98.9%) | 81.0 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 111 (100%) | 3905 (85.9%) | 81.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 110 (100%) | 4153 (90.6%) | 81.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 1850 (40.1%) | 1.0 (1.2%) | |
| | Varm teknik | 111 (100%) | 2566 (55.6%) | 80.0 (98.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.9%) | 47 (1.1%) | 2.0 (2.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 50 (45.0%) | 2457 (53.2%) | 24.0 (29.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (2.0%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (12.2%) | 165 (6.9%) | 3.0 (13.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 1.0 (4.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 24 (51.1%) | 1234 (52.0%) | 11.0 (45.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 32 (28.8%) | 2157 (46.7%) | 17.0 (21.0%) |
| Besvären är borta | | 22 (68.8%) | 1425 (66.3%) | 11.0 (64.7%) | |
| Blivit ganska bra | | 10 (31.3%) | 604 (28.1%) | 4.0 (23.5%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 2.0 (11.8%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 48 | 4497 | 63.0 | |
| Kön | Kvinnor | 34 (70.8%) | 2660 (59.2%) | 38.0 (60.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 25.4 | 23.4 | 23.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 (4.2%) | 901 (20.0%) | 6.8 (10.7%) | |
| | Infektion | 42 (87.5%) | 3399 (75.6%) | 52.0 (82.5%) | |
| | Annan | 4 (8.3%) | 197 (4.4%) | 4.3 (6.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 46 (95.8%) | 3000 (67.3%) | 26.0 (41.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 34 (72.3%) | 3216 (72.1%) | 38.8 (61.8%) | |
| | Varm teknik | 13 (27.7%) | 1159 (26.0%) | 20.8 (33.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 3.3 (5.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (6.3%) | 904 (20.1%) | 0.8 (1.2%) | |
| | Varm teknik | 41 (85.4%) | 3472 (77.2%) | 53.0 (84.1%) | |
| | Annan teknik | 4 (8.3%) | 121 (2.7%) | 9.3 (14.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (4.4%) | 129 (3.0%) | 2.3 (3.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 21 (43.8%) | 2298 (51.1%) | 47.0 (74.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 6 (28.6%) | 323 (14.4%) | 6.5 (17.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (10.0%) | 211 (9.5%) | 4.3 (11.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (5.0%) | 64 (2.9%) | 1.3 (3.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 11 (52.4%) | 614 (27.5%) | 14.5 (40.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (15.0%) | 184 (8.3%) | 6.0 (16.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 16 (76.2%) | 1207 (54.3%) | 9.0 (43.4%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 22 (45.8%) | 2078 (46.2%) | 47.5 (75.4%) |
| Besvären är borta | | 16 (72.7%) | 1502 (72.8%) | 26.5 (75.7%) | |
| Blivit ganska bra | | 4 (18.2%) | 478 (23.2%) | 6.8 (19.3%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (9.1%) | 72 (3.5%) | 1.0 (2.9%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0.8 (2.1%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Hudiksvalls sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 1804 | 10.0 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (37.5%) | 803 (44.5%) | 4.5 (45.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.8 | 7.4 | 10.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (50.0%) | 1362 (75.5%) | 2.3 (22.5%) | |
| | Infektion | 4 (50.0%) | 421 (23.3%) | 7.5 (75.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (2.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (75.0%) | 1262 (71.4%) | 3.3 (32.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 (25.0%) | 1317 (73.7%) | 4.5 (45.0%) | |
| | Varm teknik | 6 (75.0%) | 456 (25.5%) | 5.3 (52.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0.3 (2.5%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (25.0%) | 672 (37.3%) | 0.3 (2.5%) | |
| | Varm teknik | 6 (75.0%) | 1066 (59.1%) | 7.3 (72.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 2.5 (25.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 2 (25.0%) | 804 (44.6%) | 8.0 (80.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 1.5 (20.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 1.0 (13.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (50.0%) | 124 (16.1%) | 1.5 (20.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 1.5 (20.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (100%) | 403 (51.7%) | 3.0 (57.1%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 0 | 705 (39.1%) | 7.8 (77.5%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | . (.) | 469 (67.1%) | 5.3 (95.5%) | |
| | Blivit ganska bra | . (.) | 197 (28.2%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Besvären är kvar | . (.) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | . (.) | 3 (0.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 22 | 593 | 18.0 | |
| Kön | Kvinnor | 10 (45.5%) | 296 (49.9%) | 9.3 (51.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.5 | 10.4 | 14.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 20 (90.9%) | 555 (93.6%) | 15.8 (87.5%) | |
| | Infektion | 2 (9.1%) | 22 (3.7%) | 1.5 (8.3%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.8 (4.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 18 (81.8%) | 489 (84.0%) | 12.5 (69.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (1.4%) | |
| | Varm teknik | 12 (54.5%) | 543 (92.0%) | 17.0 (94.4%) | |
| | Annan teknik | 10 (45.5%) | 33 (5.6%) | 0.8 (4.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0.5 (2.8%) | |
| | Varm teknik | 12 (54.5%) | 339 (57.2%) | 3.0 (16.7%) | |
| | Annan teknik | 10 (45.5%) | 36 (6.1%) | 14.5 (80.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 8 (36.4%) | 317 (53.5%) | 13.0 (72.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (4.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (25.0%) | 23 (7.5%) | 1.5 (12.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 (6.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (12.5%) | 165 (53.4%) | 2.8 (32.4%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (22.7%) | 281 (47.4%) | 12.5 (69.4%) |
| Besvären är borta | | 3 (60.0%) | 162 (58.1%) | 7.3 (67.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (40.0%) | 89 (31.9%) | 3.3 (30.2%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0.3 (2.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Hudiksvalls sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 89 | 4618 | 73.3 | |
| Kön | Kvinnor | 41 (46.1%) | 1982 (42.9%) | 34.5 (47.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.4 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 86 (96.6%) | 4568 (98.9%) | 71.0 (96.9%) | |
| | Infektion | 3 (3.4%) | 31 (0.7%) | 1.5 (2.0%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.8 (1.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 86 (96.6%) | 3905 (85.9%) | 52.0 (71.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 1.0 (1.4%) | |
| | Varm teknik | 57 (64.8%) | 4153 (90.6%) | 71.8 (98.0%) | |
| | Annan teknik | 31 (35.2%) | 150 (3.3%) | 0.5 (0.7%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (2.2%) | 1850 (40.1%) | 2.0 (2.7%) | |
| | Varm teknik | 53 (59.6%) | 2566 (55.6%) | 16.0 (21.8%) | |
| | Annan teknik | 34 (38.2%) | 202 (4.4%) | 55.3 (75.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.5 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 38 (42.7%) | 2457 (53.2%) | 51.0 (69.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0.3 (0.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.3 (0.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 3.0 (7.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 2.5 (5.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 15 (44.1%) | 1234 (52.0%) | 12.0 (40.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 30 (33.7%) | 2157 (46.7%) | 49.3 (67.2%) |
| Besvären är borta | | 21 (72.4%) | 1425 (66.3%) | 28.5 (74.5%) | |
| Blivit ganska bra | | 7 (24.1%) | 604 (28.1%) | 8.8 (22.9%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (3.4%) | 113 (5.3%) | 0.8 (2.0%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.7%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 98% | |
| Antal registrerade operationer | | 60 | 4497 | 67.3 | |
| Kön | Kvinnor | 31 (51.7%) | 2660 (59.2%) | 35.3 (52.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 27.9 | 23.4 | 25.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 25 (41.7%) | 901 (20.0%) | 27.8 (41.3%) | |
| | Infektion | 29 (48.3%) | 3399 (75.6%) | 33.5 (49.8%) | |
| | Annan | 6 (10.0%) | 197 (4.4%) | 6.0 (8.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 48 (80.0%) | 3000 (67.3%) | 61.5 (91.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 60 (100%) | 3216 (72.1%) | 67.3 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 24 (40.0%) | 904 (20.1%) | 16.0 (23.8%) | |
| | Varm teknik | 11 (18.3%) | 3472 (77.2%) | 50.3 (74.7%) | |
| | Annan teknik | 25 (41.7%) | 121 (2.7%) | 1.0 (1.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.7%) | 129 (3.0%) | 2.3 (3.4%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 30 (50.0%) | 2298 (51.1%) | 40.0 (59.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 323 (14.4%) | 3.3 (8.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 2.0 (5.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.0 (2.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 12 (41.4%) | 614 (27.5%) | 7.8 (21.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (7.7%) | 184 (8.3%) | 2.0 (5.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 18 (64.3%) | 1207 (54.3%) | 12.5 (43.1%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 27 (45.0%) | 2078 (46.2%) | 22.3 (33.1%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 14 (51.9%) | 1502 (72.8%) | 13.5 (61.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 9 (33.3%) | 478 (23.2%) | 6.5 (29.5%) | |
| | Besvären är kvar | 4 (14.8%) | 72 (3.5%) | 1.5 (6.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.5 (2.3%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Capio Läkargruppen, Örebro

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 98% | |
| Antal registrerade operationer | | 93 | 1804 | 75.8 | |
| Kön | Kvinnor | 33 (35.5%) | 803 (44.5%) | 38.5 (50.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.2 | 7.4 | 6.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 90 (96.8%) | 1362 (75.5%) | 70.0 (92.4%) | |
| | Infektion | 3 (3.2%) | 421 (23.3%) | 4.8 (6.3%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 1.0 (1.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 82 (88.2%) | 1262 (71.4%) | 63.8 (84.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 93 (100%) | 1317 (73.7%) | 75.8 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 40 (43.0%) | 672 (37.3%) | 26.5 (35.0%) | |
| | Varm teknik | 17 (18.3%) | 1066 (59.1%) | 48.8 (64.4%) | |
| | Annan teknik | 36 (38.7%) | 66 (3.7%) | 0.5 (0.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.1%) | 23 (1.4%) | 0.5 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 52 (55.9%) | 804 (44.6%) | 48.8 (64.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (2.0%) | 46 (5.9%) | 1.3 (2.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.5 (1.2%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (0.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (7.7%) | 124 (16.1%) | 4.0 (9.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (3.9%) | 64 (8.3%) | 1.8 (4.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 28 (56.0%) | 403 (51.7%) | 17.0 (57.1%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 42 (45.2%) | 705 (39.1%) | 29.3 (38.6%) |
| | Besvären är borta | 27 (65.9%) | 469 (67.1%) | 19.3 (66.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 9 (22.0%) | 197 (28.2%) | 7.8 (26.7%) | |
| | Besvären är kvar | 5 (12.2%) | 30 (4.3%) | 2.0 (6.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Gällivare lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 133 | 4497 | 141.3 | |
| Kön | Kvinnor | 85 (63.9%) | 2660 (59.2%) | 80.0 (56.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.7 | 23.4 | 24.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 31 (23.3%) | 901 (20.0%) | 21.0 (14.9%) | |
| | Infektion | 92 (69.2%) | 3399 (75.6%) | 114.8 (81.2%) | |
| | Annan | 10 (7.5%) | 197 (4.4%) | 5.5 (3.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 101 (75.9%) | 3000 (67.3%) | 72.8 (51.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 21 (15.8%) | 3216 (72.1%) | 29.5 (20.9%) | |
| | Varm teknik | 56 (42.1%) | 1159 (26.0%) | 82.3 (58.2%) | |
| | Annan teknik | 56 (42.1%) | 87 (1.9%) | 29.5 (20.9%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (3.8%) | 904 (20.1%) | 2.8 (1.9%) | |
| | Varm teknik | 128 (96.2%) | 3472 (77.2%) | 134.3 (95.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 4.3 (3.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 5 (3.8%) | 129 (3.0%) | 7.5 (5.3%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 59 (44.4%) | 2298 (51.1%) | 69.5 (49.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 10 (16.9%) | 323 (14.4%) | 13.8 (20.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 8 (14.0%) | 211 (9.5%) | 10.3 (15.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 3 (5.3%) | 64 (2.9%) | 4.3 (6.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 15 (26.3%) | 614 (27.5%) | 19.5 (28.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (1.7%) | 184 (8.3%) | 13.5 (19.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 39 (67.2%) | 1207 (54.3%) | 21.3 (48.0%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 56 (42.1%) | 2078 (46.2%) | 50.5 (35.8%) | |
| | Besvären är borta | 37 (66.1%) | 1502 (72.8%) | 38.5 (77.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 15 (26.8%) | 478 (23.2%) | 10.5 (21.1%) | |
| | Besvären är kvar | 4 (7.1%) | 72 (3.5%) | 0.8 (1.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Norrbotten läns landsting

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Gällivare lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 17 | 1804 | 31.8 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (41.2%) | 803 (44.5%) | 14.0 (44.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.8 | 7.4 | 10.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 11 (64.7%) | 1362 (75.5%) | 12.0 (37.8%) | |
| | Infektion | 6 (35.3%) | 421 (23.3%) | 19.0 (59.8%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.8 (2.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (29.4%) | 1262 (71.4%) | 22.3 (70.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (5.9%) | 1317 (73.7%) | 1.3 (3.9%) | |
| | Varm teknik | 14 (82.4%) | 456 (25.5%) | 25.8 (81.1%) | |
| | Annan teknik | 2 (11.8%) | 13 (0.7%) | 4.8 (15.0%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (5.9%) | 672 (37.3%) | 0.8 (2.4%) | |
| | Varm teknik | 16 (94.1%) | 1066 (59.1%) | 30.5 (96.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.5 (1.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (5.9%) | 23 (1.4%) | 1.0 (3.1%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 8 (47.1%) | 804 (44.6%) | 16.0 (50.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (12.5%) | 46 (5.9%) | 2.5 (15.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (12.5%) | 31 (4.0%) | 1.3 (7.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (12.5%) | 9 (1.2%) | 0.5 (3.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (28.6%) | 124 (16.1%) | 3.8 (23.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 5 (62.5%) | 64 (8.3%) | 2.3 (14.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 6 (75.0%) | 403 (51.7%) | 6.5 (55.3%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 6 (35.3%) | 705 (39.1%) | 11.5 (36.2%) | |
| | Besvären är borta | 3 (50.0%) | 469 (67.1%) | 9.0 (80.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (50.0%) | 197 (28.2%) | 2.0 (17.8%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Gällivare lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 13 | 593 | 15.3 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (53.8%) | 296 (49.9%) | 8.5 (55.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.9 | 10.4 | 13.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 11 (84.6%) | 555 (93.6%) | 12.5 (82.0%) | |
| | Infektion | 1 (7.7%) | 22 (3.7%) | 1.5 (9.8%) | |
| | Annan | 1 (7.7%) | 16 (2.7%) | 1.3 (8.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 12 (92.3%) | 489 (84.0%) | 14.3 (93.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 11 (84.6%) | 543 (92.0%) | 14.5 (95.1%) | |
| | Annan teknik | 2 (15.4%) | 33 (5.6%) | 0.8 (4.9%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (15.4%) | 218 (36.8%) | 2.8 (18.0%) | |
| | Varm teknik | 8 (61.5%) | 339 (57.2%) | 8.8 (57.4%) | |
| | Annan teknik | 3 (23.1%) | 36 (6.1%) | 3.8 (24.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 5 (38.5%) | 317 (53.5%) | 8.3 (54.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (3.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (3.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.3 (3.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.0 (12.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (6.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (80.0%) | 165 (53.4%) | 3.0 (70.6%) | |
| | Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 4 (30.8%) | 281 (47.4%) | 5.5 (36.1%) |
| Besvären är borta | | 2 (50.0%) | 162 (58.1%) | 3.3 (59.1%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (50.0%) | 89 (31.9%) | 2.0 (36.4%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0.3 (4.5%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Norrbotten läns landsting

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Gällivare lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 139 | 4618 | 126.8 | |
| Kön | Kvinnor | 58 (41.7%) | 1982 (42.9%) | 54.0 (42.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.3 | 5.1 | 6.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 137 (98.6%) | 4568 (98.9%) | 124.3 (98.0%) | |
| | Infektion | 2 (1.4%) | 31 (0.7%) | 1.5 (1.2%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 1.0 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 115 (82.7%) | 3905 (85.9%) | 106.0 (83.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (0.7%) | 281 (6.1%) | 0.5 (0.4%) | |
| | Varm teknik | 113 (81.3%) | 4153 (90.6%) | 119.8 (94.5%) | |
| | Annan teknik | 25 (18.0%) | 150 (3.3%) | 6.5 (5.1%) | |
| Blodstillnings- metod | Kall teknik | 15 (10.8%) | 1850 (40.1%) | 14.5 (11.4%) | |
| | Varm teknik | 113 (81.3%) | 2566 (55.6%) | 83.8 (66.1%) | |
| | Annan teknik | 11 (7.9%) | 202 (4.4%) | 28.5 (22.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.7%) | 47 (1.1%) | 1.8 (1.4%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 68 (48.9%) | 2457 (53.2%) | 65.8 (51.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (1.5%) | 61 (2.5%) | 0.5 (0.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.5%) | 31 (1.3%) | 0.5 (0.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (9.1%) | 165 (6.9%) | 3.8 (5.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 13 (19.1%) | 119 (5.0%) | 3.5 (5.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 47 (71.2%) | 1234 (52.0%) | 24.5 (55.4%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 62 (44.6%) | 2157 (46.7%) | 44.3 (34.9%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 40 (64.5%) | 1425 (66.3%) | 27.8 (63.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 18 (29.0%) | 604 (28.1%) | 12.0 (27.4%) | |
| | Besvären är kvar | 4 (6.5%) | 113 (5.3%) | 4.0 (9.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 38 | 4497 | 36.0 | |
| Kön | Kvinnor | 25 (65.8%) | 2660 (59.2%) | 19.5 (54.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 20.2 | 23.4 | 20.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 8 (21.1%) | 901 (20.0%) | 4.0 (11.1%) | |
| | Infektion | 30 (78.9%) | 3399 (75.6%) | 32.0 (88.9%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 38 (100%) | 3000 (67.3%) | 36.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 24 (63.2%) | 3216 (72.1%) | 1.3 (3.5%) | |
| | Varm teknik | 14 (36.8%) | 1159 (26.0%) | 34.8 (96.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (10.5%) | 904 (20.1%) | 12.0 (33.3%) | |
| | Varm teknik | 34 (89.5%) | 3472 (77.2%) | 23.8 (66.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 (0.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 0.8 (2.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 21 (55.3%) | 2298 (51.1%) | 20.0 (55.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (23.8%) | 323 (14.4%) | 3.0 (16.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (19.0%) | 211 (9.5%) | 2.0 (11.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (4.8%) | 64 (2.9%) | 0.5 (2.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 10 (47.6%) | 614 (27.5%) | 6.0 (33.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 6 (28.6%) | 184 (8.3%) | 1.5 (8.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 12 (57.1%) | 1207 (54.3%) | 7.8 (53.4%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 18 (47.4%) | 2078 (46.2%) | 13.8 (38.2%) |
| Besvären är borta | | 12 (66.7%) | 1502 (72.8%) | 9.8 (72.2%) | |
| Blivit ganska bra | | 4 (22.2%) | 478 (23.2%) | 3.3 (24.1%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (11.1%) | 72 (3.5%) | 0.5 (3.7%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Södertälje sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 10 | 1804 | 6.3 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (20.0%) | 803 (44.5%) | 1.3 (20.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.4 | 7.4 | 6.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (60.0%) | 1362 (75.5%) | 3.5 (56.0%) | |
| | Infektion | 4 (40.0%) | 421 (23.3%) | 2.8 (44.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 (100%) | 1262 (71.4%) | 6.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 6 (60.0%) | 1317 (73.7%) | 0.3 (4.0%) | |
| | Varm teknik | 4 (40.0%) | 456 (25.5%) | 6.0 (96.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (30.0%) | 672 (37.3%) | 2.8 (44.0%) | |
| | Varm teknik | 7 (70.0%) | 1066 (59.1%) | 3.5 (56.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 4 (40.0%) | 804 (44.6%) | 3.8 (60.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (25.0%) | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (25.0%) | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (25.0%) | 124 (16.1%) | 1.0 (28.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (25.0%) | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (100%) | 403 (51.7%) | 1.3 (45.5%) | |
| | | | | | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (30.0%) | 705 (39.1%) | 3.0 (48.0%) | |
| | Besvären är borta | 3 (100%) | 469 (67.1%) | 2.3 (75.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 197 (28.2%) | 0.8 (25.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 11 | 593 | 7.0 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (36.4%) | 296 (49.9%) | 4.0 (57.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 14.6 | 10.4 | 7.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 10 (90.9%) | 555 (93.6%) | 7.0 (100%) | |
| | Infektion | 1 (9.1%) | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 11 (100%) | 489 (84.0%) | 7.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 10 (90.9%) | 543 (92.0%) | 7.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 1 (9.1%) | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (36.4%) | 218 (36.8%) | 6.3 (89.3%) | |
| | Varm teknik | 6 (54.5%) | 339 (57.2%) | 0.8 (10.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (9.1%) | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (3.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 5 (45.5%) | 317 (53.5%) | 4.5 (64.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (25.0%) | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (20.0%) | 8 (2.6%) | 0.3 (6.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (60.0%) | 165 (53.4%) | 1.5 (46.2%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (36.4%) | 281 (47.4%) | 3.8 (53.6%) |
| Besvären är borta | | 3 (75.0%) | 162 (58.1%) | 2.3 (60.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (25.0%) | 89 (31.9%) | 1.3 (33.3%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0.3 (6.7%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Södertälje sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 63 | 4618 | 38.0 | |
| Kön | Kvinnor | 29 (46.0%) | 1982 (42.9%) | 15.8 (41.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.3 | 5.1 | 5.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 63 (100%) | 4568 (98.9%) | 37.3 (98.0%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.5 (1.3%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 63 (100%) | 3905 (85.9%) | 37.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Varm teknik | 59 (93.7%) | 4153 (90.6%) | 37.8 (99.3%) | |
| | Annan teknik | 4 (6.3%) | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 26 (41.3%) | 1850 (40.1%) | 34.5 (90.8%) | |
| | Varm teknik | 34 (54.0%) | 2566 (55.6%) | 3.5 (9.2%) | |
| | Annan teknik | 3 (4.8%) | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 29 (46.0%) | 2457 (53.2%) | 22.0 (57.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (10.3%) | 165 (6.9%) | 1.3 (6.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (6.9%) | 119 (5.0%) | 1.3 (6.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 14 (53.8%) | 1234 (52.0%) | 6.8 (39.1%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 28 (44.4%) | 2157 (46.7%) | 17.3 (45.4%) | |
| | Besvären är borta | 15 (53.6%) | 1425 (66.3%) | 11.0 (64.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 8 (28.6%) | 604 (28.1%) | 5.8 (33.8%) | |
| | Besvären är kvar | 5 (17.9%) | 113 (5.3%) | 0.3 (1.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 73% | |
| Antal registrerade operationer | | 176 | 4497 | 173.0 | |
| Kön | Kvinnor | 94 (53.4%) | 2660 (59.2%) | 94.3 (54.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 20.7 | 23.4 | 20.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 49 (27.8%) | 901 (20.0%) | 42.0 (24.3%) | |
| | Infektion | 127 (72.2%) | 3399 (75.6%) | 130.3 (75.3%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0.7 (0.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 176 (100%) | 3000 (67.3%) | 173.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 175 (99.4%) | 3216 (72.1%) | 171.3 (99.8%) | |
| | Varm teknik | 1 (0.6%) | 1159 (26.0%) | 0.3 (0.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 146 (83.0%) | 904 (20.1%) | 145.7 (84.2%) | |
| | Varm teknik | 29 (16.5%) | 3472 (77.2%) | 16.0 (9.2%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.6%) | 121 (2.7%) | 11.3 (6.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 6 (3.4%) | 129 (3.0%) | 5.0 (2.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 78 (44.3%) | 2298 (51.1%) | 27.0 (15.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (5.3%) | 323 (14.4%) | 0.7 (2.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (2.7%) | 211 (9.5%) | 0.3 (1.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 20 (26.7%) | 614 (27.5%) | 3.7 (13.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (2.7%) | 184 (8.3%) | 0.3 (1.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 37 (49.3%) | 1207 (54.3%) | 11.3 (45.3%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 63 (35.8%) | 2078 (46.2%) | 25.7 (14.8%) |
| Besvären är borta | | 40 (63.5%) | 1502 (72.8%) | 18.3 (71.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 20 (31.7%) | 478 (23.2%) | 6.7 (26.0%) | |
| Besvären är kvar | | 3 (4.8%) | 72 (3.5%) | 0.7 (2.6%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Skärholmens ÖNH-centrum

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 73% | |
| Antal registrerade operationer | | 309 | 1804 | 203.7 | |
| Kön | Kvinnor | 127 (41.1%) | 803 (44.5%) | 84.7 (41.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.1 | 7.4 | 6.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 290 (93.9%) | 1362 (75.5%) | 180.7 (88.7%) | |
| | Infektion | 19 (6.1%) | 421 (23.3%) | 23.0 (11.3%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 309 (100%) | 1262 (71.4%) | 202.7 (99.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 307 (100%) | 1317 (73.7%) | 203.3 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 255 (82.5%) | 672 (37.3%) | 176.7 (86.7%) | |
| | Varm teknik | 54 (17.5%) | 1066 (59.1%) | 19.3 (9.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 7.7 (3.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.3%) | 23 (1.4%) | 0.3 (0.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 122 (39.5%) | 804 (44.6%) | 19.7 (9.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (4.2%) | 46 (5.9%) | 0.3 (1.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (3.4%) | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (0.9%) | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 14 (12.3%) | 124 (16.1%) | 3.0 (15.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 6 (5.3%) | 64 (8.3%) | 0.7 (3.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 57 (48.3%) | 403 (51.7%) | 9.3 (50.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 98 (31.7%) | 705 (39.1%) | 23.7 (11.6%) |
| Besvären är borta | | 56 (57.1%) | 469 (67.1%) | 16.0 (67.6%) | |
| Blivit ganska bra | | 39 (39.8%) | 197 (28.2%) | 7.0 (29.6%) | |
| Besvären är kvar | | 3 (3.1%) | 30 (4.3%) | 0.7 (2.8%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi, Aleris specialistvård Sabbatsbergs

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 70% | 84% | 76% | |
| Antal registrerade operationer | | 144 | 4497 | 145.3 | |
| Kön | Kvinnor | 80 (55.6%) | 2660 (59.2%) | 88.5 (60.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.7 | 23.4 | 23.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 13 (9.0%) | 901 (20.0%) | 16.8 (11.5%) | |
| | Infektion | 128 (88.9%) | 3399 (75.6%) | 126.8 (87.3%) | |
| | Annan | 3 (2.1%) | 197 (4.4%) | 1.8 (1.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 143 (100%) | 3000 (67.3%) | 144.3 (99.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 134 (93.1%) | 3216 (72.1%) | 16.3 (11.2%) | |
| | Varm teknik | 10 (6.9%) | 1159 (26.0%) | 129.0 (88.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 37 (25.7%) | 904 (20.1%) | 7.5 (5.2%) | |
| | Varm teknik | 104 (72.2%) | 3472 (77.2%) | 63.5 (43.7%) | |
| | Annan teknik | 3 (2.1%) | 121 (2.7%) | 74.3 (51.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 5 (3.5%) | 129 (3.0%) | 2.8 (1.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 70 (48.6%) | 2298 (51.1%) | 56.5 (38.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 6 (8.7%) | 323 (14.4%) | 7.8 (13.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 5 (7.5%) | 211 (9.5%) | 5.3 (9.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.5%) | 64 (2.9%) | 1.8 (3.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 19 (27.9%) | 614 (27.5%) | 16.3 (29.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 5 (7.6%) | 184 (8.3%) | 6.0 (10.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 50 (72.5%) | 1207 (54.3%) | 21.3 (57.4%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 61 (42.4%) | 2078 (46.2%) | 49.3 (33.9%) |
| Besvären är borta | | 45 (75.0%) | 1502 (72.8%) | 35.5 (74.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 12 (20.0%) | 478 (23.2%) | 10.8 (22.4%) | |
| Besvären är kvar | | 3 (5.0%) | 72 (3.5%) | 1.8 (3.6%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Aleris specialistvård Sabbatsbergs

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 70% | 84% | 76% | |
| Antal registrerade operationer | | 60 | 1804 | 24.5 | |
| Kön | Kvinnor | 26 (43.3%) | 803 (44.5%) | 12.8 (52.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.3 | 7.4 | 7.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 31 (51.7%) | 1362 (75.5%) | 11.0 (44.9%) | |
| | Infektion | 28 (46.7%) | 421 (23.3%) | 13.5 (55.1%) | |
| | Annan | 1 (1.7%) | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 59 (100%) | 1262 (71.4%) | 24.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 34 (56.7%) | 1317 (73.7%) | 2.0 (8.2%) | |
| | Varm teknik | 26 (43.3%) | 456 (25.5%) | 22.5 (91.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 14 (23.3%) | 672 (37.3%) | 3.5 (14.3%) | |
| | Varm teknik | 46 (76.7%) | 1066 (59.1%) | 14.0 (57.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 7.0 (28.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 22 (36.7%) | 804 (44.6%) | 5.8 (23.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (4.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (26.3%) | 124 (16.1%) | 1.5 (27.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 1.3 (21.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 12 (57.1%) | 403 (51.7%) | 2.8 (55.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 24 (40.0%) | 705 (39.1%) | 6.5 (26.5%) |
| | Besvären är borta | 15 (62.5%) | 469 (67.1%) | 5.5 (84.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 6 (25.0%) | 197 (28.2%) | 0.8 (11.5%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (8.3%) | 30 (4.3%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (4.2%) | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 70% | 84% | 76% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 593 | 10.5 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (40.0%) | 296 (49.9%) | 5.8 (54.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.4 | 10.4 | 7.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 5 (100%) | 555 (93.6%) | 10.0 (95.2%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (2.4%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.3 (2.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (100%) | 489 (84.0%) | 10.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 5 (100%) | 543 (92.0%) | 10.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (80.0%) | 218 (36.8%) | 2.5 (23.8%) | |
| | Varm teknik | 1 (20.0%) | 339 (57.2%) | 0.5 (4.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 7.5 (71.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 3 (60.0%) | 317 (53.5%) | 5.0 (47.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (100%) | 165 (53.4%) | 1.5 (85.7%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 (40.0%) | 281 (47.4%) | 4.3 (40.5%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 1 (50.0%) | 162 (58.1%) | 2.8 (64.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (50.0%) | 89 (31.9%) | 1.5 (35.3%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Aleris specialistvård Sabbatsbergs

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 70% | 84% | 76% | |
| Antal registrerade operationer | | 252 | 4618 | 123.8 | |
| Kön | Kvinnor | 116 (46.0%) | 1982 (42.9%) | 50.3 (40.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.8 | 5.1 | 5.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 252 (100%) | 4568 (98.9%) | 122.3 (98.8%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.5 (0.4%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 1.0 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 249 (100%) | 3905 (85.9%) | 123.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (0.4%) | 281 (6.1%) | 4.3 (3.4%) | |
| | Varm teknik | 251 (99.6%) | 4153 (90.6%) | 119.3 (96.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0.3 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 152 (60.3%) | 1850 (40.1%) | 68.0 (54.9%) | |
| | Varm teknik | 99 (39.3%) | 2566 (55.6%) | 30.8 (24.8%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.4%) | 202 (4.4%) | 25.0 (20.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 1.0 (0.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 111 (44.0%) | 2457 (53.2%) | 40.0 (32.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (3.7%) | 61 (2.5%) | 0.3 (0.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (1.9%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 12 (11.1%) | 165 (6.9%) | 2.5 (6.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 14 (13.2%) | 119 (5.0%) | 1.8 (4.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 70 (64.8%) | 1234 (52.0%) | 17.5 (49.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 84 (33.3%) | 2157 (46.7%) | 39.5 (31.9%) |
| Besvären är borta | | 51 (60.7%) | 1425 (66.3%) | 25.8 (65.6%) | |
| Blivit ganska bra | | 27 (32.1%) | 604 (28.1%) | 10.8 (27.4%) | |
| Besvären är kvar | | 5 (6.0%) | 113 (5.3%) | 2.8 (7.0%) | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (1.2%) | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 97% | 84% | 98% | |
| Antal registrerade operationer | | 134 | 4497 | 151.0 | |
| Kön | Kvinnor | 79 (59.0%) | 2660 (59.2%) | 87.8 (58.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.3 | 23.4 | 23.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 28 (20.9%) | 901 (20.0%) | 28.5 (18.9%) | |
| | Infektion | 95 (70.9%) | 3399 (75.6%) | 111.5 (73.8%) | |
| | Annan | 11 (8.2%) | 197 (4.4%) | 11.0 (7.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 2 (1.5%) | 3000 (67.3%) | 0.5 (0.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 100 (74.6%) | 3216 (72.1%) | 104.5 (69.2%) | |
| | Varm teknik | 27 (20.1%) | 1159 (26.0%) | 16.5 (10.9%) | |
| | Annan teknik | 7 (5.2%) | 87 (1.9%) | 30.0 (19.9%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 26 (19.4%) | 904 (20.1%) | 18.0 (11.9%) | |
| | Varm teknik | 108 (80.6%) | 3472 (77.2%) | 130.8 (86.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 2.3 (1.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (3.5%) | 129 (3.0%) | 1.3 (0.8%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 75 (56.0%) | 2298 (51.1%) | 90.0 (59.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 12 (16.0%) | 323 (14.4%) | 15.5 (17.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 11 (14.9%) | 211 (9.5%) | 13.3 (14.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 4 (5.4%) | 64 (2.9%) | 6.8 (7.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 18 (24.0%) | 614 (27.5%) | 26.5 (29.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 7 (9.5%) | 184 (8.3%) | 11.5 (13.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 35 (46.7%) | 1207 (54.3%) | 22.5 (38.3%) | |
| | Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 57 (42.5%) | 2078 (46.2%) | 71.3 (47.2%) |
| Besvären är borta | | 46 (83.6%) | 1502 (72.8%) | 53.5 (76.2%) | |
| Blivit ganska bra | | 8 (14.5%) | 478 (23.2%) | 14.3 (20.3%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (1.8%) | 72 (3.5%) | 1.5 (2.1%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 1.0 (1.4%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Södra Älvsborgs Sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 97% | 84% | 98% | |
| Antal registrerade operationer | | 23 | 1804 | 37.0 | |
| Kön | Kvinnor | 14 (60.9%) | 803 (44.5%) | 19.3 (52.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.7 | 7.4 | 7.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 15 (65.2%) | 1362 (75.5%) | 27.8 (75.0%) | |
| | Infektion | 8 (34.8%) | 421 (23.3%) | 9.0 (24.3%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (0.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 4 (17.4%) | 1262 (71.4%) | 1.0 (2.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 11 (47.8%) | 1317 (73.7%) | 26.5 (71.6%) | |
| | Varm teknik | 10 (43.5%) | 456 (25.5%) | 4.5 (12.2%) | |
| | Annan teknik | 2 (8.7%) | 13 (0.7%) | 6.0 (16.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 6 (26.1%) | 672 (37.3%) | 5.8 (15.5%) | |
| | Varm teknik | 17 (73.9%) | 1066 (59.1%) | 31.3 (84.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 8 (34.8%) | 804 (44.6%) | 23.0 (62.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (12.5%) | 46 (5.9%) | 2.0 (8.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (12.5%) | 31 (4.0%) | 1.5 (6.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.8 (3.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (37.5%) | 124 (16.1%) | 7.0 (31.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (12.5%) | 64 (8.3%) | 3.3 (14.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (50.0%) | 403 (51.7%) | 6.5 (40.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 8 (34.8%) | 705 (39.1%) | 15.5 (41.9%) |
| Besvären är borta | | 7 (87.5%) | 469 (67.1%) | 12.3 (81.7%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (12.5%) | 197 (28.2%) | 2.3 (15.0%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0.5 (3.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 97% | 84% | 98% | |
| Antal registrerade operationer | | 35 | 593 | 44.0 | |
| Kön | Kvinnor | 23 (65.7%) | 296 (49.9%) | 18.0 (40.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.4 | 10.4 | 5.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 31 (88.6%) | 555 (93.6%) | 43.3 (98.3%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.8 (1.7%) | |
| | Annan | 4 (11.4%) | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 24 (68.6%) | 489 (84.0%) | 29.3 (66.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (2.9%) | 14 (2.4%) | 0.3 (0.6%) | |
| | Varm teknik | 33 (97.1%) | 543 (92.0%) | 43.3 (98.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.5 (1.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 12 (34.3%) | 218 (36.8%) | 9.3 (21.0%) | |
| | Varm teknik | 23 (65.7%) | 339 (57.2%) | 30.3 (68.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 4.5 (10.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 24 (68.6%) | 317 (53.5%) | 27.8 (63.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 (2.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (4.3%) | 23 (7.5%) | 1.0 (3.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (4.2%) | 8 (2.6%) | 1.5 (5.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 14 (60.9%) | 165 (53.4%) | 7.8 (50.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 17 (48.6%) | 281 (47.4%) | 21.5 (48.9%) |
| Besvären är borta | | 11 (64.7%) | 162 (58.1%) | 15.8 (73.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 4 (23.5%) | 89 (31.9%) | 3.3 (15.1%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (5.9%) | 24 (8.6%) | 2.5 (11.6%) | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (5.9%) | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Södra Älvsborgs Sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 97% | 84% | 98% | |
| Antal registrerade operationer | | 106 | 4618 | 92.0 | |
| Kön | Kvinnor | 42 (39.6%) | 1982 (42.9%) | 35.0 (38.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.4 | 5.1 | 4.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 106 (100%) | 4568 (98.9%) | 91.5 (99.5%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 81 (77.1%) | 3905 (85.9%) | 61.8 (67.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 5 (4.8%) | 281 (6.1%) | 0.8 (0.8%) | |
| | Varm teknik | 99 (94.3%) | 4153 (90.6%) | 90.0 (98.1%) | |
| | Annan teknik | 1 (1.0%) | 150 (3.3%) | 1.0 (1.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 43 (40.6%) | 1850 (40.1%) | 24.0 (26.1%) | |
| | Varm teknik | 62 (58.5%) | 2566 (55.6%) | 55.8 (60.6%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.9%) | 202 (4.4%) | 12.3 (13.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (3.0%) | 47 (1.1%) | 1.3 (1.4%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 66 (62.3%) | 2457 (53.2%) | 63.0 (68.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (3.1%) | 61 (2.5%) | 2.8 (4.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.6%) | 31 (1.3%) | 1.8 (2.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (3.1%) | 165 (6.9%) | 2.5 (4.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (4.6%) | 119 (5.0%) | 2.8 (4.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 32 (48.5%) | 1234 (52.0%) | 17.0 (39.1%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 55 (51.9%) | 2157 (46.7%) | 48.0 (52.2%) |
| Besvären är borta | | 38 (69.1%) | 1425 (66.3%) | 32.0 (67.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 13 (23.6%) | 604 (28.1%) | 13.0 (27.4%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (7.3%) | 113 (5.3%) | 2.5 (5.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 81% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 149 | 4497 | 159.3 | |
| Kön | Kvinnor | 85 (57.0%) | 2660 (59.2%) | 97.0 (60.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.7 | 23.4 | 22.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 32 (21.5%) | 901 (20.0%) | 34.5 (21.7%) | |
| | Infektion | 112 (75.2%) | 3399 (75.6%) | 118.3 (74.3%) | |
| | Annan | 5 (3.4%) | 197 (4.4%) | 6.5 (4.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 110 (73.8%) | 3000 (67.3%) | 98.8 (62.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 148 (99.3%) | 3216 (72.1%) | 152.5 (95.8%) | |
| | Varm teknik | 1 (0.7%) | 1159 (26.0%) | 6.3 (3.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.5 (0.3%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 3.3 (2.0%) | |
| | Varm teknik | 149 (100%) | 3472 (77.2%) | 155.5 (97.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.5 (0.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (1.3%) | 129 (3.0%) | 8.3 (5.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 120 (80.5%) | 2298 (51.1%) | 106.8 (67.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 18 (15.1%) | 323 (14.4%) | 20.0 (18.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 12 (10.2%) | 211 (9.5%) | 16.5 (15.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (0.9%) | 64 (2.9%) | 7.5 (7.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 35 (29.2%) | 614 (27.5%) | 38.5 (36.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 8 (7.0%) | 184 (8.3%) | 16.8 (15.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 55 (48.2%) | 1207 (54.3%) | 28.8 (44.2%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 104 (69.8%) | 2078 (46.2%) | 64.5 (40.5%) | |
| | Besvären är borta | 78 (75.0%) | 1502 (72.8%) | 44.3 (69.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 25 (24.0%) | 478 (23.2%) | 17.3 (27.1%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (1.0%) | 72 (3.5%) | 2.0 (3.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.4%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Falu lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 81% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 45 | 1804 | 86.8 | |
| Kön | Kvinnor | 16 (35.6%) | 803 (44.5%) | 41.5 (47.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.0 | 7.4 | 8.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 26 (57.8%) | 1362 (75.5%) | 67.8 (78.1%) | |
| | Infektion | 18 (40.0%) | 421 (23.3%) | 18.5 (21.3%) | |
| | Annan | 1 (2.2%) | 21 (1.2%) | 0.5 (0.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 39 (86.7%) | 1262 (71.4%) | 57.8 (66.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 45 (100%) | 1317 (73.7%) | 81.8 (94.2%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 4.5 (5.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0.5 (0.6%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (2.2%) | 672 (37.3%) | 1.3 (1.4%) | |
| | Varm teknik | 44 (97.8%) | 1066 (59.1%) | 85.0 (98.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.5 (0.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (2.2%) | 23 (1.4%) | 2.8 (3.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 32 (71.1%) | 804 (44.6%) | 60.5 (69.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (9.4%) | 46 (5.9%) | 6.8 (11.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (3.2%) | 31 (4.0%) | 5.8 (9.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (3.2%) | 9 (1.2%) | 1.8 (2.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 8 (25.8%) | 124 (16.1%) | 16.8 (27.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (12.5%) | 64 (8.3%) | 9.3 (15.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 17 (54.8%) | 403 (51.7%) | 9.8 (36.1%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 30 (66.7%) | 705 (39.1%) | 30.0 (34.6%) | |
| | Besvären är borta | 22 (75.9%) | 469 (67.1%) | 23.5 (79.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 6 (20.7%) | 197 (28.2%) | 6.0 (20.2%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (3.4%) | 30 (4.3%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 81% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 17 | 593 | 12.3 | |
| Kön | Kvinnor | 9 (52.9%) | 296 (49.9%) | 6.5 (53.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.3 | 10.4 | 8.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 17 (100%) | 555 (93.6%) | 12.0 (98.0%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.3 (2.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 16 (94.1%) | 489 (84.0%) | 11.0 (89.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (2.0%) | |
| | Varm teknik | 17 (100%) | 543 (92.0%) | 11.5 (93.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.5 (4.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 9 (52.9%) | 218 (36.8%) | 2.5 (20.4%) | |
| | Varm teknik | 8 (47.1%) | 339 (57.2%) | 7.8 (63.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 2.0 (16.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (2.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 12 (70.6%) | 317 (53.5%) | 7.5 (61.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.3 (3.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (3.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (41.7%) | 165 (53.4%) | 1.3 (20.8%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 11 (64.7%) | 281 (47.4%) | 4.3 (34.7%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 6 (60.0%) | 162 (58.1%) | 2.5 (62.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (30.0%) | 89 (31.9%) | 1.3 (31.3%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (10.0%) | 24 (8.6%) | 0.3 (6.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Falu lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 81% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 143 | 4618 | 91.3 | |
| Kön | Kvinnor | 67 (46.9%) | 1982 (42.9%) | 38.0 (41.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.8 | 5.1 | 5.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 141 (98.6%) | 4568 (98.9%) | 90.0 (98.6%) | |
| | Infektion | 1 (0.7%) | 31 (0.7%) | 0.8 (0.8%) | |
| | Annan | 1 (0.7%) | 19 (0.4%) | 0.5 (0.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 137 (95.8%) | 3905 (85.9%) | 79.3 (86.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 6.0 (6.6%) | |
| | Varm teknik | 142 (100%) | 4153 (90.6%) | 84.5 (92.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0.8 (0.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 73 (51.0%) | 1850 (40.1%) | 35.3 (38.6%) | |
| | Varm teknik | 70 (49.0%) | 2566 (55.6%) | 44.0 (48.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 12.0 (13.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 101 (70.6%) | 2457 (53.2%) | 58.8 (64.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (1.0%) | 61 (2.5%) | 0.8 (1.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.8 (1.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (4.0%) | 165 (6.9%) | 4.8 (8.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (4.0%) | 119 (5.0%) | 3.3 (5.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 41 (42.3%) | 1234 (52.0%) | 16.3 (32.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 105 (73.4%) | 2157 (46.7%) | 35.5 (38.9%) |
| Besvären är borta | | 73 (70.2%) | 1425 (66.3%) | 25.8 (72.5%) | |
| Blivit ganska bra | | 27 (26.0%) | 604 (28.1%) | 8.5 (23.9%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (3.8%) | 113 (5.3%) | 1.0 (2.8%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.7%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 114 | 4497 | 97.3 | |
| Kön | Kvinnor | 67 (58.8%) | 2660 (59.2%) | 59.3 (60.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 27.7 | 23.4 | 23.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 15 (13.2%) | 901 (20.0%) | 20.0 (20.6%) | |
| | Infektion | 83 (72.8%) | 3399 (75.6%) | 70.5 (72.5%) | |
| | Annan | 16 (14.0%) | 197 (4.4%) | 6.8 (6.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 64 (64.0%) | 3000 (67.3%) | 24.8 (26.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 107 (93.9%) | 3216 (72.1%) | 88.3 (90.7%) | |
| | Varm teknik | 7 (6.1%) | 1159 (26.0%) | 9.0 (9.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 26 (22.8%) | 904 (20.1%) | 26.0 (26.7%) | |
| | Varm teknik | 88 (77.2%) | 3472 (77.2%) | 70.0 (72.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 1.3 (1.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 3.5 (3.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 77 (67.5%) | 2298 (51.1%) | 54.8 (56.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 10 (13.2%) | 323 (14.4%) | 6.3 (11.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 7 (9.2%) | 211 (9.5%) | 2.3 (4.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.3%) | 64 (2.9%) | 0.8 (1.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 13 (17.3%) | 614 (27.5%) | 11.5 (22.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 7 (9.3%) | 184 (8.3%) | 6.0 (11.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 35 (46.7%) | 1207 (54.3%) | 14.8 (37.1%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 69 (60.5%) | 2078 (46.2%) | 28.5 (29.3%) |
| Besvären är borta | | 52 (75.4%) | 1502 (72.8%) | 19.3 (68.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 12 (17.4%) | 478 (23.2%) | 8.5 (30.4%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (5.8%) | 72 (3.5%) | 0.3 (0.9%) | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (1.4%) | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Gävle sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 16 | 1804 | 18.0 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (50.0%) | 803 (44.5%) | 7.3 (40.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 12.6 | 7.4 | 7.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (25.0%) | 1362 (75.5%) | 10.3 (56.9%) | |
| | Infektion | 12 (75.0%) | 421 (23.3%) | 7.5 (41.7%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (1.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 9 (64.3%) | 1262 (71.4%) | 1.0 (5.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 14 (87.5%) | 1317 (73.7%) | 14.5 (80.6%) | |
| | Varm teknik | 2 (12.5%) | 456 (25.5%) | 3.5 (19.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 7 (43.8%) | 672 (37.3%) | 4.5 (25.0%) | |
| | Varm teknik | 9 (56.3%) | 1066 (59.1%) | 13.5 (75.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (12.5%) | 23 (1.4%) | 0.5 (2.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 10 (62.5%) | 804 (44.6%) | 9.5 (52.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 1.0 (10.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.8 (8.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.5 (5.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (20.0%) | 124 (16.1%) | 1.8 (19.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.8 (8.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (70.0%) | 403 (51.7%) | 2.0 (32.0%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 11 (68.8%) | 705 (39.1%) | 6.5 (36.1%) | |
| | Besvären är borta | 4 (36.4%) | 469 (67.1%) | 4.0 (64.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 5 (45.5%) | 197 (28.2%) | 1.8 (28.0%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (9.1%) | 30 (4.3%) | 0.5 (8.0%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (9.1%) | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 18 | 593 | 14.5 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (44.4%) | 296 (49.9%) | 6.3 (43.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 14.1 | 10.4 | 12.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 17 (94.4%) | 555 (93.6%) | 12.8 (87.9%) | |
| | Infektion | 1 (5.6%) | 22 (3.7%) | 1.3 (8.6%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.5 (3.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 15 (100%) | 489 (84.0%) | 9.0 (64.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 18 (100%) | 543 (92.0%) | 14.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (27.8%) | 218 (36.8%) | 9.3 (63.8%) | |
| | Varm teknik | 13 (72.2%) | 339 (57.2%) | 2.8 (19.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 2.5 (17.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.5 (3.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 9 (50.0%) | 317 (53.5%) | 8.3 (56.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (3.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.0 (12.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (33.3%) | 165 (53.4%) | 1.8 (28.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 10 (55.6%) | 281 (47.4%) | 4.3 (29.3%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 5 (50.0%) | 162 (58.1%) | 2.5 (58.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (40.0%) | 89 (31.9%) | 1.3 (29.4%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (10.0%) | 24 (8.6%) | 0.3 (5.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0.3 (5.9%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Gävle sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 125 | 4618 | 72.3 | |
| Kön | Kvinnor | 65 (52.0%) | 1982 (42.9%) | 32.8 (45.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.2 | 5.1 | 5.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 124 (99.2%) | 4568 (98.9%) | 70.5 (97.6%) | |
| | Infektion | 1 (0.8%) | 31 (0.7%) | 1.3 (1.7%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.5 (0.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 107 (94.7%) | 3905 (85.9%) | 45.0 (64.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (0.8%) | 281 (6.1%) | 1.0 (1.4%) | |
| | Varm teknik | 119 (96.0%) | 4153 (90.6%) | 71.0 (98.6%) | |
| | Annan teknik | 4 (3.2%) | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 36 (28.8%) | 1850 (40.1%) | 45.3 (62.6%) | |
| | Varm teknik | 73 (58.4%) | 2566 (55.6%) | 12.8 (17.6%) | |
| | Annan teknik | 16 (12.8%) | 202 (4.4%) | 14.3 (19.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (1.6%) | 47 (1.1%) | 1.5 (2.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 73 (58.4%) | 2457 (53.2%) | 40.5 (56.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (2.7%) | 61 (2.5%) | 0.8 (2.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.4%) | 31 (1.3%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (4.1%) | 165 (6.9%) | 3.5 (9.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (5.5%) | 119 (5.0%) | 1.5 (4.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 25 (35.2%) | 1234 (52.0%) | 9.8 (30.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 60 (48.0%) | 2157 (46.7%) | 25.5 (35.3%) |
| Besvären är borta | | 39 (65.0%) | 1425 (66.3%) | 16.3 (65.7%) | |
| Blivit ganska bra | | 18 (30.0%) | 604 (28.1%) | 6.5 (26.3%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (3.3%) | 113 (5.3%) | 2.0 (8.1%) | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (1.7%) | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 112 | 4497 | 207.0 | |
| Kön | Kvinnor | 71 (63.4%) | 2660 (59.2%) | 120.8 (58.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 19.4 | 23.4 | 22.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 22 (19.6%) | 901 (20.0%) | 37.8 (18.2%) | |
| | Infektion | 89 (79.5%) | 3399 (75.6%) | 160.0 (77.3%) | |
| | Annan | 1 (0.9%) | 197 (4.4%) | 9.3 (4.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 39 (34.8%) | 3000 (67.3%) | 37.3 (18.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 106 (94.6%) | 3216 (72.1%) | 181.8 (87.8%) | |
| | Varm teknik | 3 (2.7%) | 1159 (26.0%) | 16.3 (7.9%) | |
| | Annan teknik | 3 (2.7%) | 87 (1.9%) | 9.0 (4.3%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 21 (18.8%) | 904 (20.1%) | 12.5 (6.0%) | |
| | Varm teknik | 90 (80.4%) | 3472 (77.2%) | 194.3 (93.8%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.9%) | 121 (2.7%) | 0.3 (0.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 6 (5.6%) | 129 (3.0%) | 4.0 (1.9%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 63 (56.3%) | 2298 (51.1%) | 132.8 (64.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 7 (11.3%) | 323 (14.4%) | 18.8 (16.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 3 (4.8%) | 211 (9.5%) | 13.3 (12.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.6%) | 64 (2.9%) | 3.0 (2.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 11 (18.0%) | 614 (27.5%) | 31.8 (29.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 6 (9.7%) | 184 (8.3%) | 12.0 (10.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 40 (64.5%) | 1207 (54.3%) | 36.3 (48.3%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 63 (56.3%) | 2078 (46.2%) | 78.5 (37.9%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 46 (73.0%) | 1502 (72.8%) | 53.8 (71.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 14 (22.2%) | 478 (23.2%) | 19.0 (25.2%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (3.2%) | 72 (3.5%) | 2.5 (3.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (1.6%) | 10 (0.5%) | 0.3 (0.3%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 63 (56.3%) | 2078 (46.2%) | 78.5 (37.9%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 23 | 1804 | 62.8 | |
| Kön | Kvinnor | 9 (39.1%) | 803 (44.5%) | 25.3 (40.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.0 | 7.4 | 5.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 18 (78.3%) | 1362 (75.5%) | 48.3 (76.9%) | |
| | Infektion | 4 (17.4%) | 421 (23.3%) | 13.8 (21.9%) | |
| | Annan | 1 (4.3%) | 21 (1.2%) | 0.8 (1.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 15 (65.2%) | 1262 (71.4%) | 28.5 (45.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 20 (87.0%) | 1317 (73.7%) | 54.8 (87.3%) | |
| | Varm teknik | 2 (8.7%) | 456 (25.5%) | 2.5 (4.0%) | |
| | Annan teknik | 1 (4.3%) | 13 (0.7%) | 5.5 (8.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 11 (47.8%) | 672 (37.3%) | 7.0 (11.2%) | |
| | Varm teknik | 12 (52.2%) | 1066 (59.1%) | 54.3 (86.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 1.5 (2.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (9.5%) | 23 (1.4%) | 1.8 (2.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 12 (52.2%) | 804 (44.6%) | 47.0 (74.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 4.5 (11.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 3.0 (7.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 1.0 (2.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (25.0%) | 124 (16.1%) | 5.5 (14.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (25.0%) | 64 (8.3%) | 3.0 (7.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (41.7%) | 403 (51.7%) | 8.8 (39.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (21.7%) | 705 (39.1%) | 34.8 (55.4%) |
| | Besvären är borta | 4 (80.0%) | 469 (67.1%) | 22.3 (75.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (20.0%) | 197 (28.2%) | 6.5 (22.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.8 (2.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 13 | 593 | 31.0 | |
| Kön | Kvinnor | 6 (46.2%) | 296 (49.9%) | 14.0 (45.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.7 | 10.4 | 10.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 13 (100%) | 555 (93.6%) | 28.5 (91.9%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 2.3 (7.3%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.3 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 (76.9%) | 489 (84.0%) | 26.3 (84.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.5 (1.6%) | |
| | Varm teknik | 13 (100%) | 543 (92.0%) | 30.3 (97.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.3 (0.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 6 (46.2%) | 218 (36.8%) | 3.0 (9.7%) | |
| | Varm teknik | 7 (53.8%) | 339 (57.2%) | 27.8 (89.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0.3 (0.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 9 (69.2%) | 317 (53.5%) | 24.3 (78.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 (3.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.5 (2.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.3 (5.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 1.5 (6.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (33.3%) | 165 (53.4%) | 7.5 (45.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (38.5%) | 281 (47.4%) | 17.5 (56.5%) |
| Besvären är borta | | 3 (60.0%) | 162 (58.1%) | 10.0 (65.6%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (40.0%) | 89 (31.9%) | 4.3 (27.9%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 1.0 (6.6%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 193 | 4618 | 162.0 | |
| Kön | Kvinnor | 75 (38.9%) | 1982 (42.9%) | 67.5 (41.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.5 | 5.1 | 4.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 190 (98.4%) | 4568 (98.9%) | 159.8 (98.6%) | |
| | Infektion | 2 (1.0%) | 31 (0.7%) | 1.5 (0.9%) | |
| | Annan | 1 (0.5%) | 19 (0.4%) | 0.8 (0.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 166 (88.3%) | 3905 (85.9%) | 140.8 (87.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 5 (2.6%) | 281 (6.1%) | 2.3 (1.4%) | |
| | Varm teknik | 186 (96.9%) | 4153 (90.6%) | 159.5 (98.5%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.5%) | 150 (3.3%) | 0.3 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 89 (46.1%) | 1850 (40.1%) | 27.0 (16.7%) | |
| | Varm teknik | 101 (52.3%) | 2566 (55.6%) | 134.0 (82.7%) | |
| | Annan teknik | 3 (1.6%) | 202 (4.4%) | 1.0 (0.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (1.6%) | 47 (1.1%) | 2.8 (1.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 110 (57.0%) | 2457 (53.2%) | 110.8 (68.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 6 (5.6%) | 61 (2.5%) | 3.0 (3.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 3 (2.9%) | 31 (1.3%) | 2.5 (2.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.0%) | 2 (0.1%) | 0.8 (0.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 14 (13.5%) | 165 (6.9%) | 5.8 (5.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 8 (7.5%) | 119 (5.0%) | 4.8 (4.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 68 (63.0%) | 1234 (52.0%) | 36.3 (50.3%) | |
| | Patientnytta | | | | |
| Svarande på 6 månadersenkäten * | | 95 (49.2%) | 2157 (46.7%) | 80.8 (49.8%) | |
| | Besvären är borta | 58 (61.7%) | 1425 (66.3%) | 49.0 (67.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 27 (28.7%) | 604 (28.1%) | 18.5 (25.6%) | |
| | Besvären är kvar | 8 (8.5%) | 113 (5.3%) | 4.3 (5.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (1.1%) | 6 (0.3%) | 0.5 (0.7%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi, Hallands sjukhus, Halmstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Kungsbacka sjukhus eller Varbergs sjukhus är registrerad i kvalitetsregistret | | 92% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 155 | 4497 | 152.0 | |
| Kön | Kvinnor | 96 (61.9%) | 2660 (59.2%) | 91.8 (60.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 21.5 | 23.4 | 22.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 42 (27.1%) | 901 (20.0%) | 37.5 (24.7%) | |
| | Infektion | 106 (68.4%) | 3399 (75.6%) | 108.3 (71.2%) | |
| | Annan | 7 (4.5%) | 197 (4.4%) | 6.3 (4.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 3000 (67.3%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 155 (100%) | 3216 (72.1%) | 151.0 (99.5%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0.8 (0.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 21 (13.5%) | 904 (20.1%) | 34.3 (22.5%) | |
| | Varm teknik | 134 (86.5%) | 3472 (77.2%) | 117.8 (77.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (2.6%) | 129 (3.0%) | 2.0 (1.4%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 94 (60.6%) | 2298 (51.1%) | 76.0 (50.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 14 (15.1%) | 323 (14.4%) | 9.5 (12.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 8 (8.8%) | 211 (9.5%) | 5.0 (6.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 6 (6.6%) | 64 (2.9%) | 1.5 (2.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 21 (22.8%) | 614 (27.5%) | 19.3 (26.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 6 (6.5%) | 184 (8.3%) | 4.5 (6.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 62 (66.0%) | 1207 (54.3%) | 19.3 (41.8%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 73 (47.1%) | 2078 (46.2%) | 52.5 (34.5%) | |
| | Besvären är borta | 54 (75.0%) | 1502 (72.8%) | 37.5 (71.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 15 (20.8%) | 478 (23.2%) | 11.8 (22.5%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (2.8%) | 72 (3.5%) | 2.5 (4.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (1.4%) | 10 (0.5%) | 0.5 (1.0%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Hallands sjukhus, Halmstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Kungsbacka sjukhus eller Varbergs sjukhus är registrerad i kvalitetsregistret | | 92% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 30 | 1804 | 33.3 | |
| Kön | Kvinnor | 17 (56.7%) | 803 (44.5%) | 15.8 (47.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.4 | 7.4 | 9.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 21 (70.0%) | 1362 (75.5%) | 23.3 (69.9%) | |
| | Infektion | 9 (30.0%) | 421 (23.3%) | 9.8 (29.3%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0.5 (1.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 29 (96.7%) | 1317 (73.7%) | 33.0 (99.2%) | |
| | Varm teknik | 1 (3.3%) | 456 (25.5%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (13.3%) | 672 (37.3%) | 7.3 (21.8%) | |
| | Varm teknik | 26 (86.7%) | 1066 (59.1%) | 26.0 (78.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (3.3%) | 23 (1.4%) | 0.5 (1.6%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 16 (53.3%) | 804 (44.6%) | 17.3 (51.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (20.0%) | 46 (5.9%) | 1.8 (10.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (6.3%) | 31 (4.0%) | 1.0 (5.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (1.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (18.8%) | 124 (16.1%) | 2.5 (14.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (7.1%) | 64 (8.3%) | 1.3 (7.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (68.8%) | 403 (51.7%) | 6.0 (47.1%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 12 (40.0%) | 705 (39.1%) | 12.0 (36.1%) | |
| | Besvären är borta | 8 (66.7%) | 469 (67.1%) | 9.5 (79.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (25.0%) | 197 (28.2%) | 2.3 (18.8%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (8.3%) | 30 (4.3%) | 0.3 (2.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Kungsbacka sjukhus eller Varbergs sjukhus är registrerad i kvalitetsregistret | | 92% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 43 | 593 | 21.5 | |
| Kön | Kvinnor | 19 (44.2%) | 296 (49.9%) | 9.5 (44.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.6 | 10.4 | 8.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 43 (100%) | 555 (93.6%) | 21.0 (97.7%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.3 (1.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 39 (90.7%) | 489 (84.0%) | 16.0 (74.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Varm teknik | 43 (100%) | 543 (92.0%) | 21.3 (98.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 16 (37.2%) | 218 (36.8%) | 13.8 (64.0%) | |
| | Varm teknik | 27 (62.8%) | 339 (57.2%) | 7.8 (36.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (1.3%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 24 (55.8%) | 317 (53.5%) | 11.8 (54.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (21.7%) | 23 (7.5%) | 0.8 (6.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (9.5%) | 8 (2.6%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 16 (72.7%) | 165 (53.4%) | 2.8 (28.9%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 26 (60.5%) | 281 (47.4%) | 9.5 (44.2%) | |
| | Besvären är borta | 15 (57.7%) | 162 (58.1%) | 7.3 (78.4%) | |
| Blivit ganska bra | 8 (30.8%) | 89 (31.9%) | 2.0 (21.6%) | | |
| Besvären är kvar | 1 (3.8%) | 24 (8.6%) | 0 | | |
| Besvären har förvärrats | 2 (7.7%) | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Hallands sjukhus, Halmstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Kungsbacka sjukhus eller Varbergs sjukhus är registrerad i kvalitetsregistret | | 92% | 84% | 86% | |
| Antal registrerade operationer | | 144 | 4618 | 142.5 | |
| Kön | Kvinnor | 67 (46.5%) | 1982 (42.9%) | 64.3 (45.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.8 | 5.1 | 4.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 143 (99.3%) | 4568 (98.9%) | 141.5 (99.3%) | |
| | Infektion | 1 (0.7%) | 31 (0.7%) | 1.0 (0.7%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 128 (88.9%) | 3905 (85.9%) | 108.5 (76.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 2.3 (1.6%) | |
| | Varm teknik | 143 (100%) | 4153 (90.6%) | 140.3 (98.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 69 (47.9%) | 1850 (40.1%) | 93.8 (65.8%) | |
| | Varm teknik | 73 (50.7%) | 2566 (55.6%) | 47.0 (33.0%) | |
| | Annan teknik | 2 (1.4%) | 202 (4.4%) | 1.8 (1.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (2.1%) | 47 (1.1%) | 2.3 (1.7%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 82 (56.9%) | 2457 (53.2%) | 83.3 (58.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (3.7%) | 61 (2.5%) | 2.5 (3.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (2.6%) | 31 (1.3%) | 0.8 (0.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 10 (12.8%) | 165 (6.9%) | 5.3 (6.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (3.8%) | 119 (5.0%) | 5.3 (6.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 53 (67.9%) | 1234 (52.0%) | 18.8 (30.5%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 60 (41.7%) | 2157 (46.7%) | 61.8 (43.3%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 37 (61.7%) | 1425 (66.3%) | 49.5 (80.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 21 (35.0%) | 604 (28.1%) | 10.0 (16.2%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (3.3%) | 113 (5.3%) | 2.0 (3.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.4%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 32 | 4497 | 80.5 | |
| Kön | Kvinnor | 17 (53.1%) | 2660 (59.2%) | 43.3 (53.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 25.0 | 23.4 | 24.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 7 (21.9%) | 901 (20.0%) | 13.8 (17.1%) | |
| | Infektion | 24 (75.0%) | 3399 (75.6%) | 63.5 (78.9%) | |
| | Annan | 1 (3.1%) | 197 (4.4%) | 3.3 (4.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 9 (29.0%) | 3000 (67.3%) | 13.3 (16.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 30 (93.8%) | 3216 (72.1%) | 76.0 (94.4%) | |
| | Varm teknik | 1 (3.1%) | 1159 (26.0%) | 0.5 (0.6%) | |
| | Annan teknik | 1 (3.1%) | 87 (1.9%) | 4.0 (5.0%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 12 (37.5%) | 904 (20.1%) | 10.3 (12.7%) | |
| | Varm teknik | 16 (50.0%) | 3472 (77.2%) | 69.3 (86.0%) | |
| | Annan teknik | 4 (12.5%) | 121 (2.7%) | 1.0 (1.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (3.1%) | 129 (3.0%) | 4.0 (5.0%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 15 (46.9%) | 2298 (51.1%) | 63.5 (78.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 323 (14.4%) | 5.0 (10.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 4.0 (8.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0.8 (1.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 9 (60.0%) | 614 (27.5%) | 12.0 (26.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (13.3%) | 184 (8.3%) | 4.0 (8.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (71.4%) | 1207 (54.3%) | 9.5 (40.4%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 14 (43.8%) | 2078 (46.2%) | 59.3 (73.6%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 7 (50.0%) | 1502 (72.8%) | 32.0 (73.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 6 (42.9%) | 478 (23.2%) | 9.5 (21.8%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (7.1%) | 72 (3.5%) | 1.8 (4.0%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.6%) | |
| | | | | | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Helsingborgs lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 21 | 1804 | 35.8 | |
| Kön | Kvinnor | 12 (57.1%) | 803 (44.5%) | 14.8 (41.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.2 | 7.4 | 6.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 16 (76.2%) | 1362 (75.5%) | 19.3 (53.8%) | |
| | Infektion | 5 (23.8%) | 421 (23.3%) | 15.3 (42.7%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 1.3 (3.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 2 (9.5%) | 1262 (71.4%) | 8.8 (24.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 17 (81.0%) | 1317 (73.7%) | 34.5 (96.5%) | |
| | Varm teknik | 4 (19.0%) | 456 (25.5%) | 0.5 (1.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0.8 (2.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 10 (47.6%) | 672 (37.3%) | 6.3 (17.5%) | |
| | Varm teknik | 7 (33.3%) | 1066 (59.1%) | 29.5 (82.5%) | |
| | Annan teknik | 4 (19.0%) | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.3 (3.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 10 (47.6%) | 804 (44.6%) | 29.3 (81.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (20.0%) | 46 (5.9%) | 1.0 (4.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (20.0%) | 31 (4.0%) | 0.8 (3.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (20.0%) | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (20.0%) | 124 (16.1%) | 4.8 (21.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (20.0%) | 64 (8.3%) | 1.8 (7.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (50.0%) | 403 (51.7%) | 7.0 (47.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 7 (33.3%) | 705 (39.1%) | 24.8 (69.2%) | |
| | Besvären är borta | 4 (57.1%) | 469 (67.1%) | 14.5 (71.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (28.6%) | 197 (28.2%) | 5.0 (24.7%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (14.3%) | 30 (4.3%) | 0.8 (3.7%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 91% | | |
| Antal registrerade operationer | | 6 | 593 | 14.5 | | |
| Kön | Kvinnor | 5 (83.3%) | 296 (49.9%) | 6.8 (46.6%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 21.4 | 10.4 | 11.2 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (100%) | 555 (93.6%) | 12.8 (87.9%) | | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.3 (8.6%) | | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.5 (3.4%) | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 489 (84.0%) | 3.8 (25.9%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.5 (3.4%) | | |
| | Varm teknik | 6 (100%) | 543 (92.0%) | 14.0 (96.6%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (16.7%) | 218 (36.8%) | 2.0 (13.8%) | | |
| | Varm teknik | 4 (66.7%) | 339 (57.2%) | 12.0 (82.8%) | | |
| | Annan teknik | 1 (16.7%) | 36 (6.1%) | 0.5 (3.4%) | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.8 (5.2%) | | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 (16.7%) | 317 (53.5%) | 10.5 (72.4%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (100%) | 23 (7.5%) | 0.8 (10.0%) | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (3.3%) | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (100%) | 165 (53.4%) | 1.3 (29.4%) | | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (66.7%) | 281 (47.4%) | 8.3 (56.9%) | |
| | | Besvären är borta | 2 (50.0%) | 162 (58.1%) | 3.5 (70.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 0 | 89 (31.9%) | 1.0 (20.0%) | | |
| Besvären är kvar | | 2 (50.0%) | 24 (8.6%) | 0.5 (10.0%) | | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Helsingborgs lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 82% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 65 | 4618 | 116.3 | |
| Kön | Kvinnor | 33 (50.8%) | 1982 (42.9%) | 48.5 (41.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 3.5 | 5.1 | 5.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 63 (96.9%) | 4568 (98.9%) | 113.3 (97.4%) | |
| | Infektion | 1 (1.5%) | 31 (0.7%) | 2.5 (2.2%) | |
| | Annan | 1 (1.5%) | 19 (0.4%) | 0.5 (0.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3 (4.7%) | 3905 (85.9%) | 28.8 (24.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 1.3 (1.1%) | |
| | Varm teknik | 65 (100%) | 4153 (90.6%) | 114.5 (98.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0.5 (0.4%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 39 (60.0%) | 1850 (40.1%) | 37.0 (31.8%) | |
| | Varm teknik | 21 (32.3%) | 2566 (55.6%) | 75.0 (64.5%) | |
| | Annan teknik | 5 (7.7%) | 202 (4.4%) | 4.3 (3.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.5%) | 47 (1.1%) | 3.3 (2.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 30 (46.2%) | 2457 (53.2%) | 93.3 (80.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 1.5 (2.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.5 (0.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (3.6%) | 165 (6.9%) | 3.8 (5.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 4.5 (6.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 13 (43.3%) | 1234 (52.0%) | 18.3 (39.9%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 26 (40.0%) | 2157 (46.7%) | 84.0 (72.3%) |
| Besvären är borta | | 18 (69.2%) | 1425 (66.3%) | 43.3 (68.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 5 (19.2%) | 604 (28.1%) | 15.8 (24.9%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (7.7%) | 113 (5.3%) | 3.5 (5.5%) | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (3.8%) | 6 (0.3%) | 0.8 (1.2%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 162 | 4497 | 127.8 | |
| Kön | Kvinnor | 90 (55.6%) | 2660 (59.2%) | 67.0 (52.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.9 | 23.4 | 22.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 50 (30.9%) | 901 (20.0%) | 48.8 (38.2%) | |
| | Infektion | 107 (66.0%) | 3399 (75.6%) | 74.8 (58.5%) | |
| | Annan | 5 (3.1%) | 197 (4.4%) | 4.3 (3.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 119 (73.5%) | 3000 (67.3%) | 21.3 (16.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 160 (99.4%) | 3216 (72.1%) | 127.5 (99.8%) | |
| | Varm teknik | 1 (0.6%) | 1159 (26.0%) | 0.3 (0.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 39 (24.1%) | 904 (20.1%) | 9.3 (7.2%) | |
| | Varm teknik | 122 (75.3%) | 3472 (77.2%) | 118.3 (92.6%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.6%) | 121 (2.7%) | 0.3 (0.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (1.9%) | 129 (3.0%) | 3.5 (2.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 90 (55.6%) | 2298 (51.1%) | 73.5 (57.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 9 (10.1%) | 323 (14.4%) | 7.3 (10.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 5 (5.8%) | 211 (9.5%) | 5.3 (7.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.2%) | 64 (2.9%) | 0.5 (0.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 22 (25.6%) | 614 (27.5%) | 14.5 (21.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (4.5%) | 184 (8.3%) | 3.5 (5.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 44 (50.0%) | 1207 (54.3%) | 19.3 (42.3%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 81 (50.0%) | 2078 (46.2%) | 57.8 (45.2%) |
| Besvären är borta | | 60 (74.1%) | 1502 (72.8%) | 43.8 (76.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 20 (24.7%) | 478 (23.2%) | 10.3 (18.0%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (1.2%) | 72 (3.5%) | 2.8 (4.8%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.4%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 33 | 1804 | 29.8 | |
| Kön | Kvinnor | 11 (33.3%) | 803 (44.5%) | 14.3 (47.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.6 | 7.4 | 7.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 25 (75.8%) | 1362 (75.5%) | 20.3 (68.1%) | |
| | Infektion | 7 (21.2%) | 421 (23.3%) | 9.0 (30.3%) | |
| | Annan | 1 (3.0%) | 21 (1.2%) | 0.5 (1.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 28 (84.8%) | 1262 (71.4%) | 5.5 (18.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 33 (100%) | 1317 (73.7%) | 28.8 (96.6%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 1.0 (3.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 13 (39.4%) | 672 (37.3%) | 3.8 (12.6%) | |
| | Varm teknik | 20 (60.6%) | 1066 (59.1%) | 25.8 (86.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.3 (0.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.5 (1.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 18 (54.5%) | 804 (44.6%) | 17.0 (57.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (5.9%) | 46 (5.9%) | 2.3 (15.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (6.3%) | 31 (4.0%) | 2.0 (13.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (16.7%) | 124 (16.1%) | 3.3 (22.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (5.6%) | 64 (8.3%) | 1.5 (10.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 12 (70.6%) | 403 (51.7%) | 4.5 (39.1%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 12 (36.4%) | 705 (39.1%) | 12.3 (41.2%) | |
| | Besvären är borta | 10 (83.3%) | 469 (67.1%) | 10.0 (81.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (16.7%) | 197 (28.2%) | 2.3 (18.4%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 18 | 593 | 33.3 | |
| Kön | Kvinnor | 9 (50.0%) | 296 (49.9%) | 14.3 (42.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.1 | 10.4 | 6.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 17 (94.4%) | 555 (93.6%) | 32.3 (97.0%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.5 (1.5%) | |
| | Annan | 1 (5.6%) | 16 (2.7%) | 0.5 (1.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 18 (100%) | 489 (84.0%) | 31.8 (95.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 4 (22.2%) | 14 (2.4%) | 3.0 (9.0%) | |
| | Varm teknik | 14 (77.8%) | 543 (92.0%) | 30.3 (91.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (44.4%) | 218 (36.8%) | 11.0 (33.1%) | |
| | Varm teknik | 10 (55.6%) | 339 (57.2%) | 22.3 (66.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 11 (61.1%) | 317 (53.5%) | 21.3 (63.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (2.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.5 (7.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 1.3 (6.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 6 (60.0%) | 165 (53.4%) | 7.0 (56.0%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 9 (50.0%) | 281 (47.4%) | 14.0 (42.1%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 5 (55.6%) | 162 (58.1%) | 8.0 (58.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (44.4%) | 89 (31.9%) | 4.8 (34.5%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 0.8 (5.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0.3 (1.8%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 257 | 4618 | 194.5 | |
| Kön | Kvinnor | 111 (43.2%) | 1982 (42.9%) | 77.3 (39.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.7 | 5.1 | 4.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 254 (98.8%) | 4568 (98.9%) | 191.5 (98.5%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 1.0 (0.5%) | |
| | Annan | 3 (1.2%) | 19 (0.4%) | 2.0 (1.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 246 (96.1%) | 3905 (85.9%) | 177.3 (91.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 149 (58.0%) | 281 (6.1%) | 24.0 (12.3%) | |
| | Varm teknik | 108 (42.0%) | 4153 (90.6%) | 170.5 (87.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 108 (42.0%) | 1850 (40.1%) | 80.5 (41.4%) | |
| | Varm teknik | 149 (58.0%) | 2566 (55.6%) | 113.3 (58.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0.8 (0.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (0.8%) | 47 (1.1%) | 1.3 (0.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 135 (52.5%) | 2457 (53.2%) | 124.8 (64.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (2.3%) | 61 (2.5%) | 1.0 (0.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 3 (2.3%) | 31 (1.3%) | 0.5 (0.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (4.6%) | 165 (6.9%) | 5.5 (4.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (0.8%) | 119 (5.0%) | 4.3 (3.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 68 (51.9%) | 1234 (52.0%) | 40.3 (51.9%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 125 (48.6%) | 2157 (46.7%) | 91.0 (46.8%) |
| | Besvären är borta | 80 (64.0%) | 1425 (66.3%) | 66.8 (73.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 37 (29.6%) | 604 (28.1%) | 20.3 (22.3%) | |
| | Besvären är kvar | 8 (6.4%) | 113 (5.3%) | 3.8 (4.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.3%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 67 | 4497 | 78.0 | |
| Kön | Kvinnor | 39 (58.2%) | 2660 (59.2%) | 48.3 (61.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.5 | 23.4 | 24.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 19 (28.4%) | 901 (20.0%) | 21.5 (27.6%) | |
| | Infektion | 44 (65.7%) | 3399 (75.6%) | 53.5 (68.6%) | |
| | Annan | 4 (6.0%) | 197 (4.4%) | 3.0 (3.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 3000 (67.3%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 67 (100%) | 3216 (72.1%) | 77.8 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 7 (10.4%) | 904 (20.1%) | 6.8 (8.7%) | |
| | Varm teknik | 60 (89.6%) | 3472 (77.2%) | 70.5 (90.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.8 (1.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (6.0%) | 129 (3.0%) | 6.3 (8.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 54 (80.6%) | 2298 (51.1%) | 58.0 (74.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (3.8%) | 323 (14.4%) | 6.0 (10.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (2.0%) | 211 (9.5%) | 4.5 (7.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (2.0%) | 64 (2.9%) | 1.5 (2.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 17 (33.3%) | 614 (27.5%) | 14.0 (24.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 7 (13.7%) | 184 (8.3%) | 6.5 (11.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 21 (39.6%) | 1207 (54.3%) | 14.3 (41.6%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 48 (71.6%) | 2078 (46.2%) | 41.3 (52.9%) | |
| | Besvären är borta | 39 (81.3%) | 1502 (72.8%) | 30.3 (74.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 8 (16.7%) | 478 (23.2%) | 8.8 (21.5%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.1%) | 72 (3.5%) | 1.5 (3.7%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.6%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Länssjukhuset i Kalmar

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 9 | 1804 | 14.5 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (44.4%) | 803 (44.5%) | 7.5 (51.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.7 | 7.4 | 11.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 (33.3%) | 1362 (75.5%) | 9.5 (65.5%) | |
| | Infektion | 6 (66.7%) | 421 (23.3%) | 4.8 (32.8%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (1.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0.5 (3.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 9 (100%) | 1317 (73.7%) | 14.5 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (44.4%) | 672 (37.3%) | 2.5 (17.2%) | |
| | Varm teknik | 5 (55.6%) | 1066 (59.1%) | 12.0 (82.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (1.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (77.8%) | 804 (44.6%) | 10.8 (74.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (2.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.3 (2.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (14.3%) | 124 (16.1%) | 1.5 (14.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 1.0 (9.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (28.6%) | 403 (51.7%) | 2.3 (31.0%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 6 (66.7%) | 705 (39.1%) | 9.3 (63.8%) | |
| | Besvären är borta | 1 (16.7%) | 469 (67.1%) | 7.8 (83.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 5 (83.3%) | 197 (28.2%) | 1.0 (10.8%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.5 (5.4%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 593 | 13.0 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (37.5%) | 296 (49.9%) | 5.8 (44.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.2 | 10.4 | 7.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 8 (100%) | 555 (93.6%) | 12.8 (98.1%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (1.9%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (100%) | 489 (84.0%) | 9.0 (69.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 8 (100%) | 543 (92.0%) | 13.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (62.5%) | 218 (36.8%) | 7.0 (53.8%) | |
| | Varm teknik | 3 (37.5%) | 339 (57.2%) | 6.0 (46.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 7 (87.5%) | 317 (53.5%) | 10.5 (80.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (5.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (2.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.3 (2.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.3 (12.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 1.0 (10.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (28.6%) | 165 (53.4%) | 0.8 (10.3%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 6 (75.0%) | 281 (47.4%) | 8.8 (67.3%) | |
| | Besvären är borta | 4 (66.7%) | 162 (58.1%) | 5.8 (65.7%) | |
| Blivit ganska bra | 2 (33.3%) | 89 (31.9%) | 2.0 (22.9%) | | |
| Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 1.0 (11.4%) | | |
| Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Länssjukhuset i Kalmar

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 91% | |
| Antal registrerade operationer | | 103 | 4618 | 79.5 | |
| Kön | Kvinnor | 49 (47.6%) | 1982 (42.9%) | 34.3 (43.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.6 | 5.1 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 101 (98.1%) | 4568 (98.9%) | 78.3 (98.4%) | |
| | Infektion | 1 (1.0%) | 31 (0.7%) | 1.0 (1.3%) | |
| | Annan | 1 (1.0%) | 19 (0.4%) | 0.3 (0.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 79 (76.7%) | 3905 (85.9%) | 48.8 (61.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (1.0%) | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 101 (99.0%) | 4153 (90.6%) | 79.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 69 (67.0%) | 1850 (40.1%) | 50.0 (62.9%) | |
| | Varm teknik | 34 (33.0%) | 2566 (55.6%) | 28.0 (35.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 1.5 (1.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.8 (0.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 87 (84.5%) | 2457 (53.2%) | 66.0 (83.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (3.6%) | 61 (2.5%) | 2.0 (3.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.8 (1.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (2.4%) | 165 (6.9%) | 5.5 (8.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (1.2%) | 119 (5.0%) | 5.0 (7.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 30 (35.3%) | 1234 (52.0%) | 14.0 (29.9%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 84 (81.6%) | 2157 (46.7%) | 54.8 (68.9%) | |
| | Besvären är borta | 54 (64.3%) | 1425 (66.3%) | 35.0 (64.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 24 (28.6%) | 604 (28.1%) | 16.3 (30.1%) | |
| | Besvären är kvar | 6 (7.1%) | 113 (5.3%) | 2.5 (4.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.5%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 89% | |
| Antal registrerade operationer | | 22 | 4497 | 10.8 | |
| Kön | Kvinnor | 13 (59.1%) | 2660 (59.2%) | 6.3 (58.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 25.5 | 23.4 | 22.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (18.2%) | 901 (20.0%) | 1.5 (14.0%) | |
| | Infektion | 17 (77.3%) | 3399 (75.6%) | 8.5 (79.1%) | |
| | Annan | 1 (4.5%) | 197 (4.4%) | 0.8 (7.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 22 (100%) | 3000 (67.3%) | 10.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 21 (95.5%) | 3216 (72.1%) | 10.0 (93.0%) | |
| | Varm teknik | 1 (4.5%) | 1159 (26.0%) | 0.8 (7.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (4.5%) | 904 (20.1%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Varm teknik | 21 (95.5%) | 3472 (77.2%) | 10.5 (97.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 8 (36.4%) | 2298 (51.1%) | 5.3 (48.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (12.5%) | 323 (14.4%) | 1.0 (19.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 0.8 (14.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0.5 (9.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (50.0%) | 614 (27.5%) | 2.5 (47.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (16.7%) | 184 (8.3%) | 1.0 (19.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (62.5%) | 1207 (54.3%) | 2.0 (40.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (13.6%) | 2078 (46.2%) | 3.5 (32.6%) |
| Besvären är borta | | 2 (66.7%) | 1502 (72.8%) | 2.8 (84.6%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (33.3%) | 478 (23.2%) | 0.5 (15.4%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 72 (3.5%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Karlskoga lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 89% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 1804 | 2.5 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (50.0%) | 803 (44.5%) | 1.3 (50.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.2 | 7.4 | 7.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (50.0%) | 1362 (75.5%) | 1.8 (70.0%) | |
| | Infektion | 3 (37.5%) | 421 (23.3%) | 0.5 (20.0%) | |
| | Annan | 1 (12.5%) | 21 (1.2%) | 0.3 (10.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (100%) | 1262 (71.4%) | 2.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 8 (100%) | 1317 (73.7%) | 1.8 (70.0%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0.8 (30.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 8 (100%) | 1066 (59.1%) | 2.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 4 (50.0%) | 804 (44.6%) | 0.3 (10.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (25.0%) | 124 (16.1%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (25.0%) | 64 (8.3%) | 0.3 (100%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (50.0%) | 403 (51.7%) | . (.) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (37.5%) | 705 (39.1%) | 0.3 (10.0%) |
| Besvären är borta | | 3 (100%) | 469 (67.1%) | 0.3 (100%) | |
| Blivit ganska bra | | 0 | 197 (28.2%) | 0 | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 89% | |
| Antal registrerade operationer | | 4 | 593 | 4.3 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (50.0%) | 296 (49.9%) | 1.3 (29.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.5 | 10.4 | 13.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 (75.0%) | 555 (93.6%) | 3.5 (82.4%) | |
| | Infektion | 1 (25.0%) | 22 (3.7%) | 0.8 (17.6%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 4 (100%) | 489 (84.0%) | 4.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (5.9%) | |
| | Varm teknik | 3 (75.0%) | 543 (92.0%) | 4.0 (94.1%) | |
| | Annan teknik | 1 (25.0%) | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (50.0%) | 218 (36.8%) | 0 | |
| | Varm teknik | 2 (50.0%) | 339 (57.2%) | 4.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (5.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 (50.0%) | 317 (53.5%) | 2.3 (52.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (11.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.5 (22.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (50.0%) | 165 (53.4%) | 1.0 (50.0%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 0 | 281 (47.4%) | 2.3 (52.9%) | |
| | Besvären är borta | . (.) | 162 (58.1%) | 1.3 (55.6%) | |
| | Blivit ganska bra | . (.) | 89 (31.9%) | 1.0 (44.4%) | |
| | Besvären är kvar | . (.) | 24 (8.6%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | . (.) | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 89% | |
| Antal registrerade operationer | | 21 | 4618 | 10.0 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (38.1%) | 1982 (42.9%) | 4.3 (42.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.6 | 5.1 | 6.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 21 (100%) | 4568 (98.9%) | 10.0 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 21 (100%) | 3905 (85.9%) | 9.0 (90.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.3 (2.5%) | |
| | Varm teknik | 21 (100%) | 4153 (90.6%) | 9.8 (97.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (9.5%) | 1850 (40.1%) | 0.5 (5.0%) | |
| | Varm teknik | 19 (90.5%) | 2566 (55.6%) | 9.5 (95.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (9.5%) | 47 (1.1%) | 0.3 (2.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 8 (38.1%) | 2457 (53.2%) | 4.5 (45.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (12.5%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (12.5%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (25.0%) | 119 (5.0%) | 0.3 (5.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (37.5%) | 1234 (52.0%) | 1.3 (41.7%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 9 (42.9%) | 2157 (46.7%) | 4.0 (40.0%) | |
| | Besvären är borta | 5 (55.6%) | 1425 (66.3%) | 2.5 (66.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (44.4%) | 604 (28.1%) | 1.3 (33.3%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 48 | 4497 | 57.3 | |
| Kön | Kvinnor | 31 (64.6%) | 2660 (59.2%) | 32.5 (56.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.0 | 23.4 | 23.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 12 (25.0%) | 901 (20.0%) | 12.5 (21.8%) | |
| | Infektion | 34 (70.8%) | 3399 (75.6%) | 41.5 (72.5%) | |
| | Annan | 2 (4.2%) | 197 (4.4%) | 3.3 (5.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 29 (60.4%) | 3000 (67.3%) | 37.5 (65.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 48 (100%) | 3216 (72.1%) | 57.3 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 47 (97.9%) | 3472 (77.2%) | 57.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 1 (2.1%) | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (8.3%) | 129 (3.0%) | 4.3 (7.4%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 28 (58.3%) | 2298 (51.1%) | 32.5 (56.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (14.8%) | 323 (14.4%) | 4.5 (14.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (16.0%) | 211 (9.5%) | 3.5 (11.2%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (4.0%) | 64 (2.9%) | 2.0 (6.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 9 (32.1%) | 614 (27.5%) | 13.0 (42.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (14.8%) | 184 (8.3%) | 4.3 (13.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 12 (46.2%) | 1207 (54.3%) | 6.8 (38.0%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 25 (52.1%) | 2078 (46.2%) | 20.3 (35.4%) | |
| | Besvären är borta | 20 (80.0%) | 1502 (72.8%) | 14.0 (69.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (16.0%) | 478 (23.2%) | 5.3 (25.9%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (4.0%) | 72 (3.5%) | 0.5 (2.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.5 (2.5%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Blekingesjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 21 | 1804 | 29.5 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (33.3%) | 803 (44.5%) | 14.3 (48.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.2 | 7.4 | 7.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 13 (61.9%) | 1362 (75.5%) | 20.3 (68.6%) | |
| | Infektion | 6 (28.6%) | 421 (23.3%) | 8.8 (29.7%) | |
| | Annan | 2 (9.5%) | 21 (1.2%) | 0.5 (1.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 18 (85.7%) | 1262 (71.4%) | 22.3 (75.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 21 (100%) | 1317 (73.7%) | 29.0 (98.3%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0.5 (1.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 21 (100%) | 1066 (59.1%) | 29.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.5 (5.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 10 (47.6%) | 804 (44.6%) | 20.3 (68.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 2.3 (11.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 2.0 (10.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 1.3 (6.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (30.0%) | 124 (16.1%) | 3.0 (15.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (20.0%) | 64 (8.3%) | 1.0 (5.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 6 (60.0%) | 403 (51.7%) | 3.0 (34.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 8 (38.1%) | 705 (39.1%) | 12.3 (41.5%) | |
| | Besvären är borta | 6 (75.0%) | 469 (67.1%) | 11.3 (91.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (25.0%) | 197 (28.2%) | 1.0 (8.2%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 13 | 593 | 11.5 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (53.8%) | 296 (49.9%) | 6.3 (54.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 15.4 | 10.4 | 12.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 13 (100%) | 555 (93.6%) | 10.3 (89.1%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 1.0 (8.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 11 (84.6%) | 489 (84.0%) | 9.3 (80.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Varm teknik | 12 (92.3%) | 543 (92.0%) | 11.3 (97.8%) | |
| | Annan teknik | 1 (7.7%) | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0.5 (4.3%) | |
| | Varm teknik | 12 (92.3%) | 339 (57.2%) | 7.5 (65.2%) | |
| | Annan teknik | 1 (7.7%) | 36 (6.1%) | 3.5 (30.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (53.8%) | 317 (53.5%) | 6.5 (56.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (14.3%) | 8 (2.6%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (14.3%) | 23 (7.5%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (14.3%) | 8 (2.6%) | 0.8 (11.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (71.4%) | 165 (53.4%) | 1.0 (22.2%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 6 (46.2%) | 281 (47.4%) | 2.5 (21.7%) |
| Besvären är borta | | 4 (66.7%) | 162 (58.1%) | 2.3 (90.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 0 | 89 (31.9%) | 0.3 (10.0%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (16.7%) | 24 (8.6%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (16.7%) | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Blekingesjukhuset

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 104 | 4618 | 42.0 | |
| Kön | Kvinnor | 48 (46.2%) | 1982 (42.9%) | 16.3 (38.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.2 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 104 (100%) | 4568 (98.9%) | 41.8 (99.4%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 91 (87.5%) | 3905 (85.9%) | 33.5 (80.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 (1.9%) | 281 (6.1%) | 0.5 (1.2%) | |
| | Varm teknik | 101 (98.1%) | 4153 (90.6%) | 41.5 (98.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (1.9%) | 1850 (40.1%) | 1.0 (2.4%) | |
| | Varm teknik | 102 (98.1%) | 2566 (55.6%) | 31.0 (73.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 10.0 (23.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (2.9%) | 47 (1.1%) | 0.8 (1.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 58 (55.8%) | 2457 (53.2%) | 21.3 (50.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (1.8%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.8%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (10.9%) | 165 (6.9%) | 1.3 (6.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (7.0%) | 119 (5.0%) | 0.8 (3.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 33 (57.9%) | 1234 (52.0%) | 6.0 (31.6%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 37 (35.6%) | 2157 (46.7%) | 13.0 (31.0%) |
| Besvären är borta | | 30 (81.1%) | 1425 (66.3%) | 9.0 (72.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 3 (8.1%) | 604 (28.1%) | 2.8 (22.0%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (10.8%) | 113 (5.3%) | 0.8 (6.0%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 149 | 4497 | 165.8 | |
| Kön | Kvinnor | 95 (63.8%) | 2660 (59.2%) | 98.5 (59.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.6 | 23.4 | 22.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 33 (22.1%) | 901 (20.0%) | 36.8 (22.2%) | |
| | Infektion | 113 (75.8%) | 3399 (75.6%) | 123.0 (74.2%) | |
| | Annan | 3 (2.0%) | 197 (4.4%) | 6.0 (3.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 98 (65.8%) | 3000 (67.3%) | 103.5 (62.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 145 (100%) | 3216 (72.1%) | 159.5 (96.2%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 6.3 (3.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 20 (13.4%) | 904 (20.1%) | 7.0 (4.2%) | |
| | Varm teknik | 129 (86.6%) | 3472 (77.2%) | 158.8 (95.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 6 (4.0%) | 129 (3.0%) | 4.5 (2.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (4.7%) | 2298 (51.1%) | 59.3 (35.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (14.3%) | 323 (14.4%) | 11.0 (18.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 9.3 (15.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.3 (2.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (14.3%) | 614 (27.5%) | 19.3 (32.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (14.3%) | 184 (8.3%) | 10.0 (16.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (71.4%) | 1207 (54.3%) | 17.3 (51.1%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 27 (18.1%) | 2078 (46.2%) | 45.8 (27.6%) | |
| | Besvären är borta | 15 (55.6%) | 1502 (72.8%) | 33.3 (73.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 12 (44.4%) | 478 (23.2%) | 10.8 (23.8%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 1.3 (2.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Centralsjukhuset i Karlstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 30 | 1804 | 30.8 | |
| Kön | Kvinnor | 16 (53.3%) | 803 (44.5%) | 13.5 (43.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.9 | 7.4 | 9.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 22 (73.3%) | 1362 (75.5%) | 20.8 (67.5%) | |
| | Infektion | 7 (23.3%) | 421 (23.3%) | 8.5 (27.6%) | |
| | Annan | 1 (3.3%) | 21 (1.2%) | 1.5 (4.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 22 (73.3%) | 1262 (71.4%) | 21.5 (69.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 28 (96.6%) | 1317 (73.7%) | 29.8 (96.7%) | |
| | Varm teknik | 1 (3.4%) | 456 (25.5%) | 1.0 (3.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (13.3%) | 672 (37.3%) | 1.3 (4.1%) | |
| | Varm teknik | 26 (86.7%) | 1066 (59.1%) | 29.3 (95.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.3 (0.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.5 (4.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 (6.7%) | 804 (44.6%) | 14.0 (45.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 1.5 (10.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 1.3 (8.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 1.8 (12.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (50.0%) | 64 (8.3%) | 1.5 (10.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (100%) | 403 (51.7%) | 3.5 (46.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (10.0%) | 705 (39.1%) | 10.8 (35.0%) |
| Besvären är borta | | 2 (66.7%) | 469 (67.1%) | 9.3 (86.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (33.3%) | 197 (28.2%) | 1.5 (14.0%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 16 | 593 | 23.5 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (50.0%) | 296 (49.9%) | 10.8 (45.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.6 | 10.4 | 8.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 15 (93.8%) | 555 (93.6%) | 22.3 (94.7%) | |
| | Infektion | 1 (6.3%) | 22 (3.7%) | 0.5 (2.1%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.8 (3.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 14 (87.5%) | 489 (84.0%) | 21.5 (91.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (1.1%) | |
| | Varm teknik | 16 (100%) | 543 (92.0%) | 23.3 (98.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 7 (43.8%) | 218 (36.8%) | 5.3 (22.3%) | |
| | Varm teknik | 9 (56.3%) | 339 (57.2%) | 18.3 (77.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.5 (2.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 0 | 317 (53.5%) | 10.8 (45.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | . (.) | 8 (2.6%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | . (.) | 4 (1.3%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | . (.) | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | . (.) | 23 (7.5%) | 1.8 (17.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | . (.) | 8 (2.6%) | 0.8 (7.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | . (.) | 165 (53.4%) | 2.0 (32.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 (12.5%) | 281 (47.4%) | 7.5 (31.9%) |
| Besvären är borta | | 1 (50.0%) | 162 (58.1%) | 6.0 (80.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (50.0%) | 89 (31.9%) | 1.3 (16.7%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0.3 (3.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Centralsjukhuset i Karlstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 107 | 4618 | 101.3 | |
| Kön | Kvinnor | 49 (45.8%) | 1982 (42.9%) | 46.0 (45.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.1 | 5.1 | 5.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 105 (98.1%) | 4568 (98.9%) | 100.3 (99.0%) | |
| | Infektion | 2 (1.9%) | 31 (0.7%) | 0.8 (0.7%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 98 (91.6%) | 3905 (85.9%) | 93.3 (92.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.3 (0.2%) | |
| | Varm teknik | 106 (100%) | 4153 (90.6%) | 100.8 (99.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 68 (63.6%) | 1850 (40.1%) | 23.8 (23.5%) | |
| | Varm teknik | 39 (36.4%) | 2566 (55.6%) | 77.0 (76.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0.5 (0.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 2.3 (2.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 8 (7.5%) | 2457 (53.2%) | 41.8 (41.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 1.0 (2.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.5 (1.2%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 3.3 (7.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 2.3 (5.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (87.5%) | 1234 (52.0%) | 9.3 (44.0%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 20 (18.7%) | 2157 (46.7%) | 30.3 (29.9%) | |
| | Besvären är borta | 15 (75.0%) | 1425 (66.3%) | 23.0 (76.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (20.0%) | 604 (28.1%) | 6.8 (22.3%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (5.0%) | 113 (5.3%) | 0.5 (1.7%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 105 | 4497 | 127.8 | |
| Kön | Kvinnor | 60 (57.1%) | 2660 (59.2%) | 76.0 (59.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 27.3 | 23.4 | 24.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 26 (24.8%) | 901 (20.0%) | 19.8 (15.5%) | |
| | Infektion | 69 (65.7%) | 3399 (75.6%) | 105.5 (82.6%) | |
| | Annan | 10 (9.5%) | 197 (4.4%) | 2.5 (2.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 88 (83.8%) | 3000 (67.3%) | 102.0 (79.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 103 (99.0%) | 3216 (72.1%) | 119.8 (93.7%) | |
| | Varm teknik | 1 (1.0%) | 1159 (26.0%) | 8.0 (6.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 7 (6.7%) | 904 (20.1%) | 11.0 (8.6%) | |
| | Varm teknik | 98 (93.3%) | 3472 (77.2%) | 116.5 (91.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 (0.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (3.1%) | 129 (3.0%) | 1.3 (1.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 70 (66.7%) | 2298 (51.1%) | 82.0 (64.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 7 (10.0%) | 323 (14.4%) | 10.3 (14.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 6 (8.6%) | 211 (9.5%) | 6.8 (9.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (1.4%) | 64 (2.9%) | 1.5 (2.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 15 (21.7%) | 614 (27.5%) | 13.8 (19.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 6 (8.7%) | 184 (8.3%) | 7.3 (10.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 29 (41.4%) | 1207 (54.3%) | 21.5 (40.2%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 59 (56.2%) | 2078 (46.2%) | 49.5 (38.7%) | |
| | Besvären är borta | 44 (74.6%) | 1502 (72.8%) | 35.3 (72.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 12 (20.3%) | 478 (23.2%) | 10.3 (21.1%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (1.7%) | 72 (3.5%) | 2.8 (5.7%) | |
| | Besvären har förvärrats | 2 (3.4%) | 10 (0.5%) | 0.3 (0.5%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Centralsjukhuset Kristianstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 56 | 1804 | 37.8 | |
| Kön | Kvinnor | 25 (44.6%) | 803 (44.5%) | 18.8 (49.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.2 | 7.4 | 7.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 32 (57.1%) | 1362 (75.5%) | 16.0 (42.4%) | |
| | Infektion | 24 (42.9%) | 421 (23.3%) | 21.5 (57.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (0.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 31 (56.4%) | 1262 (71.4%) | 21.8 (57.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 53 (94.6%) | 1317 (73.7%) | 26.8 (70.9%) | |
| | Varm teknik | 3 (5.4%) | 456 (25.5%) | 10.8 (28.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0.3 (0.7%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (14.3%) | 672 (37.3%) | 8.5 (22.5%) | |
| | Varm teknik | 48 (85.7%) | 1066 (59.1%) | 29.0 (76.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.3 (0.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.9%) | 23 (1.4%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 23 (41.1%) | 804 (44.6%) | 24.8 (65.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (9.1%) | 46 (5.9%) | 1.8 (7.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (4.5%) | 31 (4.0%) | 1.5 (6.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.8 (3.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (21.7%) | 124 (16.1%) | 3.5 (16.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (13.0%) | 64 (8.3%) | 1.5 (6.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (30.4%) | 403 (51.7%) | 7.3 (41.4%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 26 (46.4%) | 705 (39.1%) | 14.3 (37.7%) |
| Besvären är borta | | 16 (61.5%) | 469 (67.1%) | 10.3 (74.5%) | |
| Blivit ganska bra | | 8 (30.8%) | 197 (28.2%) | 2.3 (16.4%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (7.7%) | 30 (4.3%) | 1.3 (9.1%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 16 | 593 | 33.0 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (43.8%) | 296 (49.9%) | 15.0 (45.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 10.6 | 10.4 | 12.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 16 (100%) | 555 (93.6%) | 29.5 (89.4%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 2.8 (8.3%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.8 (2.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 (66.7%) | 489 (84.0%) | 23.0 (69.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Varm teknik | 16 (100%) | 543 (92.0%) | 32.8 (99.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (50.0%) | 218 (36.8%) | 15.3 (46.2%) | |
| | Varm teknik | 8 (50.0%) | 339 (57.2%) | 16.5 (50.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 1.3 (3.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (43.8%) | 317 (53.5%) | 21.3 (64.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 1.5 (7.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 1.0 (5.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.5 (2.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.8 (3.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 1.0 (5.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (57.1%) | 165 (53.4%) | 4.3 (34.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (31.3%) | 281 (47.4%) | 11.5 (34.8%) |
| Besvären är borta | | 1 (20.0%) | 162 (58.1%) | 7.8 (67.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 4 (80.0%) | 89 (31.9%) | 2.5 (21.7%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 1.3 (10.9%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Centralsjukhuset Kristianstad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 266 | 4618 | 207.8 | |
| Kön | Kvinnor | 105 (39.5%) | 1982 (42.9%) | 86.5 (41.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.0 | 5.1 | 5.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 264 (99.2%) | 4568 (98.9%) | 206.5 (99.4%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 1.3 (0.6%) | |
| | Annan | 2 (0.8%) | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 147 (57.4%) | 3905 (85.9%) | 103.3 (49.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.5 (0.2%) | |
| | Varm teknik | 263 (99.2%) | 4153 (90.6%) | 204.5 (98.6%) | |
| | Annan teknik | 2 (0.8%) | 150 (3.3%) | 2.5 (1.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 107 (40.2%) | 1850 (40.1%) | 111.8 (53.8%) | |
| | Varm teknik | 149 (56.0%) | 2566 (55.6%) | 82.0 (39.5%) | |
| | Annan teknik | 10 (3.8%) | 202 (4.4%) | 14.0 (6.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (1.2%) | 47 (1.1%) | 1.3 (0.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 155 (58.3%) | 2457 (53.2%) | 143.3 (69.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (1.9%) | 61 (2.5%) | 1.8 (1.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (1.3%) | 31 (1.3%) | 1.0 (0.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (0.6%) | 2 (0.1%) | 0.3 (0.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 7 (4.6%) | 165 (6.9%) | 7.8 (6.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (2.6%) | 119 (5.0%) | 9.8 (7.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 67 (43.5%) | 1234 (52.0%) | 25.3 (26.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 146 (54.9%) | 2157 (46.7%) | 84.3 (40.6%) |
| Besvären är borta | | 101 (69.7%) | 1425 (66.3%) | 57.8 (69.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 37 (25.5%) | 604 (28.1%) | 20.3 (24.3%) | |
| Besvären är kvar | | 7 (4.8%) | 113 (5.3%) | 5.0 (6.0%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.3%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 37 | 4497 | 34.3 | |
| Kön | Kvinnor | 26 (70.3%) | 2660 (59.2%) | 21.8 (63.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 20.1 | 23.4 | 23.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 10 (27.0%) | 901 (20.0%) | 9.0 (26.3%) | |
| | Infektion | 27 (73.0%) | 3399 (75.6%) | 22.8 (66.4%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 2.5 (7.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 37 (100%) | 3000 (67.3%) | 34.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 34 (91.9%) | 3216 (72.1%) | 34.3 (100%) | |
| | Varm teknik | 3 (8.1%) | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (2.7%) | 904 (20.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 36 (97.3%) | 3472 (77.2%) | 34.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (2.7%) | 129 (3.0%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 17 (45.9%) | 2298 (51.1%) | 19.8 (57.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (11.8%) | 323 (14.4%) | 2.5 (12.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 2.0 (10.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.0 (5.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (35.3%) | 614 (27.5%) | 6.5 (33.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (17.6%) | 184 (8.3%) | 1.5 (7.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 8 (50.0%) | 1207 (54.3%) | 5.3 (31.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 16 (43.2%) | 2078 (46.2%) | 10.5 (30.7%) | |
| | Besvären är borta | 13 (81.3%) | 1502 (72.8%) | 7.0 (66.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (12.5%) | 478 (23.2%) | 2.5 (23.8%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (6.3%) | 72 (3.5%) | 0.8 (7.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (2.4%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Lindesbergs lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 12 | 1804 | 6.8 | |
| Kön | Kvinnor | 9 (75.0%) | 803 (44.5%) | 3.5 (51.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 12.4 | 7.4 | 6.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 8 (66.7%) | 1362 (75.5%) | 4.8 (70.4%) | |
| | Infektion | 4 (33.3%) | 421 (23.3%) | 2.0 (29.6%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 12 (100%) | 1262 (71.4%) | 6.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 11 (91.7%) | 1317 (73.7%) | 6.8 (100%) | |
| | Varm teknik | 1 (8.3%) | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 12 (100%) | 1066 (59.1%) | 6.8 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 6 (50.0%) | 804 (44.6%) | 4.0 (59.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (6.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.3 (6.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (6.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (50.0%) | 124 (16.1%) | 0.8 (18.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (16.7%) | 64 (8.3%) | 0.5 (14.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (16.7%) | 403 (51.7%) | 2.0 (61.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (33.3%) | 705 (39.1%) | 2.0 (29.6%) |
| Besvären är borta | | 3 (75.0%) | 469 (67.1%) | 1.3 (62.5%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (25.0%) | 197 (28.2%) | 0.8 (37.5%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 593 | 4.5 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (60.0%) | 296 (49.9%) | 2.3 (50.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.9 | 10.4 | 9.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 5 (100%) | 555 (93.6%) | 4.0 (88.9%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.5 (11.1%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (100%) | 489 (84.0%) | 4.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (5.6%) | |
| | Varm teknik | 5 (100%) | 543 (92.0%) | 4.3 (94.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (20.0%) | 218 (36.8%) | 0.3 (5.6%) | |
| | Varm teknik | 4 (80.0%) | 339 (57.2%) | 4.0 (88.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0.3 (5.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 4 (80.0%) | 317 (53.5%) | 2.3 (50.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (25.0%) | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (25.0%) | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (25.0%) | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (25.0%) | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (100%) | 165 (53.4%) | 0.5 (28.6%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (80.0%) | 281 (47.4%) | 2.0 (44.4%) |
| Besvären är borta | | 3 (75.0%) | 162 (58.1%) | 1.5 (75.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 0 | 89 (31.9%) | 0.3 (12.5%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (25.0%) | 24 (8.6%) | 0.3 (12.5%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 90% | 84% | 85% | |
| Antal registrerade operationer | | 18 | 4618 | 17.3 | |
| Kön | Kvinnor | 5 (27.8%) | 1982 (42.9%) | 8.0 (46.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.7 | 5.1 | 5.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 17 (94.4%) | 4568 (98.9%) | 17.3 (100%) | |
| | Infektion | 1 (5.6%) | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 18 (100%) | 3905 (85.9%) | 17.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.3 (1.4%) | |
| | Varm teknik | 18 (100%) | 4153 (90.6%) | 17.0 (98.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (27.8%) | 1850 (40.1%) | 2.0 (11.6%) | |
| | Varm teknik | 13 (72.2%) | 2566 (55.6%) | 14.8 (85.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0.5 (2.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (5.6%) | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 14 (77.8%) | 2457 (53.2%) | 10.3 (59.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 0.3 (2.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0.5 (5.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (78.6%) | 1234 (52.0%) | 3.5 (50.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 12 (66.7%) | 2157 (46.7%) | 5.3 (30.4%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 9 (75.0%) | 1425 (66.3%) | 3.0 (57.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (25.0%) | 604 (28.1%) | 2.0 (38.1%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 0.3 (4.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 86% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 25 | 4497 | 24.0 | |
| Kön | Kvinnor | 12 | 2660 (59.2%) | 14.3 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 20.3 | 23.4 | 20.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 5 | 901 (20.0%) | 8.3 | |
| | Infektion | 19 | 3399 (75.6%) | 15.8 | |
| | Annan | 1 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 | 3000 (67.3%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 25 | 3216 (72.1%) | 24.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 | 904 (20.1%) | 16.5 | |
| | Varm teknik | 17 | 3472 (77.2%) | 7.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 | 129 (3.0%) | 0.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 25 | 2298 (51.1%) | 24.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 323 (14.4%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 7 | 614 (27.5%) | 4.8 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 1.0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 | 1207 (54.3%) | 3.3 | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 19 | 2078 (46.2%) | 24.0 |
| Besvären är borta | | 9 | 1502 (72.8%) | 12.0 | |
| Blivit ganska bra | | 1 | 478 (23.2%) | 3.0 | |
| Besvären är kvar | | 1 | 72 (3.5%) | 0.8 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Ljungby lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 86% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 2 | 1804 | 11.0 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 803 (44.5%) | 5.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.7 | 7.4 | 7.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 | 1362 (75.5%) | 9.0 | |
| | Infektion | 0 | 421 (23.3%) | 2.0 | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 | 1317 (73.7%) | 11.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillnings- metod | Kall teknik | 1 | 672 (37.3%) | 9.5 | |
| | Varm teknik | 1 | 1066 (59.1%) | 1.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 | 804 (44.6%) | 11.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0.8 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 403 (51.7%) | 1.5 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 | 705 (39.1%) | 11.0 | |
| | Besvären är borta | 1 | 469 (67.1%) | 7.5 | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 197 (28.2%) | 0.5 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Ljungby lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 86% | 84% | 90% | |
| Antal registrerade operationer | | 11 | 4618 | 1.8 | |
| Kön | Kvinnor | 2 | 1982 (42.9%) | 0.3 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.4 | 5.1 | 5.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 11 | 4568 (98.9%) | 1.8 | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 | 3905 (85.9%) | 1.3 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 11 | 4153 (90.6%) | 1.8 | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 | 1850 (40.1%) | 1.8 | |
| | Varm teknik | 3 | 2566 (55.6%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 11 | 2457 (53.2%) | 1.8 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 | 119 (5.0%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 | 1234 (52.0%) | 1.3 | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 9 | 2157 (46.7%) | 1.8 |
| Besvären är borta | | 7 | 1425 (66.3%) | 1.0 | |
| Blivit ganska bra | | 2 | 604 (28.1%) | 0.5 | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 64 | 4497 | 94.3 | |
| Kön | Kvinnor | 44 (68.8%) | 2660 (59.2%) | 61.0 (64.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 21.9 | 23.4 | 21.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (6.3%) | 901 (20.0%) | 8.3 (8.8%) | |
| | Infektion | 59 (92.2%) | 3399 (75.6%) | 85.3 (90.5%) | |
| | Annan | 1 (1.6%) | 197 (4.4%) | 0.8 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 (1.6%) | 3000 (67.3%) | 1.8 (1.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 43 (68.3%) | 3216 (72.1%) | 74.5 (79.0%) | |
| | Varm teknik | 19 (30.2%) | 1159 (26.0%) | 10.0 (10.6%) | |
| | Annan teknik | 1 (1.6%) | 87 (1.9%) | 9.8 (10.3%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 18 (28.1%) | 904 (20.1%) | 16.0 (17.0%) | |
| | Varm teknik | 46 (71.9%) | 3472 (77.2%) | 78.0 (82.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 (0.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 1.8 (1.9%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 26 (40.6%) | 2298 (51.1%) | 52.0 (55.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (16.0%) | 323 (14.4%) | 8.8 (16.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (8.3%) | 211 (9.5%) | 6.5 (12.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (4.2%) | 64 (2.9%) | 0.8 (1.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 10 (38.5%) | 614 (27.5%) | 14.0 (27.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (8.7%) | 184 (8.3%) | 4.8 (9.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 16 (64.0%) | 1207 (54.3%) | 14.3 (48.3%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 25 (39.1%) | 2078 (46.2%) | 31.5 (33.4%) | |
| | Besvären är borta | 17 (68.0%) | 1502 (72.8%) | 24.5 (78.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 7 (28.0%) | 478 (23.2%) | 5.8 (18.4%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (4.0%) | 72 (3.5%) | 1.0 (3.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Lundby sjukhus, Capio

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 28 | 1804 | 27.0 | |
| Kön | Kvinnor | 15 (53.6%) | 803 (44.5%) | 11.8 (43.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.7 | 7.4 | 8.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 12 (42.9%) | 1362 (75.5%) | 14.5 (53.7%) | |
| | Infektion | 15 (53.6%) | 421 (23.3%) | 12.5 (46.3%) | |
| | Annan | 1 (3.6%) | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 20 (71.4%) | 1317 (73.7%) | 21.3 (78.7%) | |
| | Varm teknik | 7 (25.0%) | 456 (25.5%) | 2.8 (10.2%) | |
| | Annan teknik | 1 (3.6%) | 13 (0.7%) | 3.0 (11.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (28.6%) | 672 (37.3%) | 5.5 (20.4%) | |
| | Varm teknik | 20 (71.4%) | 1066 (59.1%) | 21.5 (79.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 13 (46.4%) | 804 (44.6%) | 16.5 (61.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (7.7%) | 46 (5.9%) | 0.8 (4.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (8.3%) | 31 (4.0%) | 0.5 (3.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (1.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 1.8 (10.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.5 (3.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (38.5%) | 403 (51.7%) | 4.0 (38.1%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 13 (46.4%) | 705 (39.1%) | 11.0 (40.7%) | |
| | Besvären är borta | 12 (92.3%) | 469 (67.1%) | 7.8 (72.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (7.7%) | 197 (28.2%) | 2.8 (25.6%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 19 | 593 | 13.3 | |
| Kön | Kvinnor | 9 (47.4%) | 296 (49.9%) | 8.0 (60.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 17.8 | 10.4 | 15.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 19 (100%) | 555 (93.6%) | 11.3 (84.9%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 2.0 (15.1%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 16 (88.9%) | 489 (84.0%) | 7.3 (55.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 1.8 (13.2%) | |
| | Varm teknik | 18 (100%) | 543 (92.0%) | 11.0 (83.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.5 (3.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (42.1%) | 218 (36.8%) | 5.3 (39.6%) | |
| | Varm teknik | 11 (57.9%) | 339 (57.2%) | 8.0 (60.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 5 (26.3%) | 317 (53.5%) | 5.5 (41.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.0 (20.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (9.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (20.0%) | 165 (53.4%) | 1.8 (46.7%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 4 (21.1%) | 281 (47.4%) | 2.8 (20.8%) | |
| | Besvären är borta | 2 (50.0%) | 162 (58.1%) | 1.5 (54.5%) | |
| Blivit ganska bra | 2 (50.0%) | 89 (31.9%) | 1.0 (36.4%) | | |
| Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 0.3 (9.1%) | | |
| Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Lundby sjukhus, Capio

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 88 | 4618 | 92.8 | |
| Kön | Kvinnor | 35 (39.8%) | 1982 (42.9%) | 37.8 (40.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.6 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 87 (98.9%) | 4568 (98.9%) | 92.0 (99.2%) | |
| | Infektion | 1 (1.1%) | 31 (0.7%) | 0.8 (0.8%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 84 (96.6%) | 3905 (85.9%) | 53.5 (58.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.8 (0.8%) | |
| | Varm teknik | 88 (100%) | 4153 (90.6%) | 91.3 (98.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0.8 (0.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 67 (76.1%) | 1850 (40.1%) | 59.5 (64.2%) | |
| | Varm teknik | 21 (23.9%) | 2566 (55.6%) | 32.0 (34.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 1.3 (1.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 37 (42.0%) | 2457 (53.2%) | 50.0 (53.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (2.8%) | 61 (2.5%) | 0.8 (1.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (2.9%) | 165 (6.9%) | 1.8 (3.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 1.5 (3.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 17 (45.9%) | 1234 (52.0%) | 12.8 (42.1%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 36 (40.9%) | 2157 (46.7%) | 30.8 (33.2%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 19 (52.8%) | 1425 (66.3%) | 20.5 (67.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 16 (44.4%) | 604 (28.1%) | 8.5 (27.9%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.8%) | 113 (5.3%) | 1.5 (4.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 21% | 84% | 48% | |
| Antal registrerade operationer | | 2 | 4497 | 17.5 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 2660 (59.2%) | 9.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.0 | 23.4 | 19.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 | 901 (20.0%) | 3.3 | |
| | Infektion | 1 | 3399 (75.6%) | 12.8 | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 1.5 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 2 | 3000 (67.3%) | 14.3 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 | 3216 (72.1%) | 15.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 2.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.5 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 0.8 | |
| | Varm teknik | 2 | 3472 (77.2%) | 16.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 2.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 | 2298 (51.1%) | 8.5 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 323 (14.4%) | 0.8 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 0.5 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 | 614 (27.5%) | 1.0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 0.8 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 | 1207 (54.3%) | 0.8 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 | 2078 (46.2%) | 6.5 | |
| | Besvären är borta | 1 | 1502 (72.8%) | 3.0 | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 478 (23.2%) | 1.5 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 0.3 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 21% | 84% | 48% | |
| Antal registrerade operationer | | 1 | 1804 | 13.5 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 803 (44.5%) | 5.0 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 3.9 | 7.4 | 4.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 | 1362 (75.5%) | 9.0 | |
| | Infektion | 0 | 421 (23.3%) | 4.5 | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 | 1262 (71.4%) | 8.3 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 | 1317 (73.7%) | 12.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 1.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0.5 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 | 672 (37.3%) | 1.8 | |
| | Varm teknik | 0 | 1066 (59.1%) | 11.8 | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.5 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 | 804 (44.6%) | 7.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.5 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.5 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0.8 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.3 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 403 (51.7%) | 0.3 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 | 705 (39.1%) | 5.3 | |
| | Besvären är borta | 1 | 469 (67.1%) | 4.0 | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 197 (28.2%) | 0.5 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0.3 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Skåne Universitetssjukhus, Malmö

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 21% | 84% | 48% | |
| Antal registrerade operationer | | 1 | 4618 | 18.8 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 1982 (42.9%) | 7.8 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 3.3 | 5.1 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 | 4568 (98.9%) | 18.5 | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 | 3905 (85.9%) | 11.8 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.3 | |
| | Varm teknik | 1 | 4153 (90.6%) | 18.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 1850 (40.1%) | 4.3 | |
| | Varm teknik | 1 | 2566 (55.6%) | 14.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 | 2457 (53.2%) | 11.8 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0.8 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 1234 (52.0%) | 0.5 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 | 2157 (46.7%) | 10.0 | |
| | Besvären är borta | 0 | 1425 (66.3%) | 4.8 | |
| | Blivit ganska bra | 1 | 604 (28.1%) | 3.5 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 96% | |
| Antal registrerade operationer | | 136 | 4497 | 215.8 | |
| Kön | Kvinnor | 74 (54.4%) | 2660 (59.2%) | 127.5 (59.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.2 | 23.4 | 21.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 25 (18.4%) | 901 (20.0%) | 43.0 (19.9%) | |
| | Infektion | 107 (78.7%) | 3399 (75.6%) | 167.8 (77.8%) | |
| | Annan | 4 (2.9%) | 197 (4.4%) | 5.0 (2.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 135 (99.3%) | 3000 (67.3%) | 215.3 (99.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 107 (79.9%) | 3216 (72.1%) | 191.0 (88.8%) | |
| | Varm teknik | 27 (20.1%) | 1159 (26.0%) | 23.5 (10.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.5 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 26 (19.1%) | 904 (20.1%) | 44.5 (20.6%) | |
| | Varm teknik | 95 (69.9%) | 3472 (77.2%) | 165.3 (76.6%) | |
| | Annan teknik | 15 (11.0%) | 121 (2.7%) | 6.0 (2.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 6 (4.5%) | 129 (3.0%) | 10.0 (4.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 58 (42.6%) | 2298 (51.1%) | 168.8 (78.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 6 (10.7%) | 323 (14.4%) | 10.8 (7.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (7.3%) | 211 (9.5%) | 6.5 (4.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 3.0 (2.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 13 (24.1%) | 614 (27.5%) | 36.3 (26.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (1.9%) | 184 (8.3%) | 11.0 (7.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 39 (73.6%) | 1207 (54.3%) | 42.0 (46.8%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 61 (44.9%) | 2078 (46.2%) | 148.3 (68.7%) | |
| | Besvären är borta | 44 (72.1%) | 1502 (72.8%) | 78.0 (81.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 16 (26.2%) | 478 (23.2%) | 15.8 (16.4%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (1.6%) | 72 (3.5%) | 2.5 (2.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 96% | |
| Antal registrerade operationer | | 14 | 1804 | 40.5 | |
| Kön | Kvinnor | 6 (42.9%) | 803 (44.5%) | 18.5 (45.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.5 | 7.4 | 7.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 9 (64.3%) | 1362 (75.5%) | 32.8 (80.9%) | |
| | Infektion | 5 (35.7%) | 421 (23.3%) | 7.5 (18.5%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (0.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 14 (100%) | 1262 (71.4%) | 40.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 8 (57.1%) | 1317 (73.7%) | 32.0 (79.0%) | |
| | Varm teknik | 6 (42.9%) | 456 (25.5%) | 8.5 (21.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 7 (50.0%) | 672 (37.3%) | 11.0 (27.2%) | |
| | Varm teknik | 7 (50.0%) | 1066 (59.1%) | 28.5 (70.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 1.0 (2.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.3 (3.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (50.0%) | 804 (44.6%) | 30.5 (75.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.8 (2.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.5 (2.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (14.3%) | 124 (16.1%) | 5.5 (21.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.5 (1.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (28.6%) | 403 (51.7%) | 9.0 (54.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (28.6%) | 705 (39.1%) | 29.0 (71.6%) | |
| | Besvären är borta | 2 (50.0%) | 469 (67.1%) | 16.3 (78.3%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (50.0%) | 197 (28.2%) | 3.8 (18.1%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.8 (3.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 96% | |
| Antal registrerade operationer | | 37 | 593 | 22.3 | |
| Kön | Kvinnor | 18 (48.6%) | 296 (49.9%) | 9.0 (40.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.9 | 10.4 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 37 (100%) | 555 (93.6%) | 21.8 (97.8%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.5 (2.2%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 37 (100%) | 489 (84.0%) | 22.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.5 (2.2%) | |
| | Varm teknik | 37 (100%) | 543 (92.0%) | 21.5 (96.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.3 (1.1%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 32 (86.5%) | 218 (36.8%) | 17.3 (77.5%) | |
| | Varm teknik | 4 (10.8%) | 339 (57.2%) | 4.0 (18.0%) | |
| | Annan teknik | 1 (2.7%) | 36 (6.1%) | 1.0 (4.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (1.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 19 (51.4%) | 317 (53.5%) | 15.3 (68.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 9 (50.0%) | 165 (53.4%) | 3.8 (44.1%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 14 (37.8%) | 281 (47.4%) | 14.3 (64.0%) |
| Besvären är borta | | 10 (71.4%) | 162 (58.1%) | 7.3 (61.7%) | |
| Blivit ganska bra | | 3 (21.4%) | 89 (31.9%) | 4.0 (34.0%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (7.1%) | 24 (8.6%) | 0.5 (4.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 93% | 84% | 96% | |
| Antal registrerade operationer | | 87 | 4618 | 129.0 | |
| Kön | Kvinnor | 30 (34.5%) | 1982 (42.9%) | 51.8 (40.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.6 | 5.1 | 4.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 86 (98.9%) | 4568 (98.9%) | 127.8 (99.0%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 1.0 (0.8%) | |
| | Annan | 1 (1.1%) | 19 (0.4%) | 0.3 (0.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 87 (100%) | 3905 (85.9%) | 128.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (1.2%) | 281 (6.1%) | 2.8 (2.1%) | |
| | Varm teknik | 84 (98.8%) | 4153 (90.6%) | 126.0 (97.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 52 (59.8%) | 1850 (40.1%) | 79.5 (61.6%) | |
| | Varm teknik | 21 (24.1%) | 2566 (55.6%) | 38.3 (29.7%) | |
| | Annan teknik | 14 (16.1%) | 202 (4.4%) | 11.3 (8.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (2.3%) | 47 (1.1%) | 1.0 (0.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 49 (56.3%) | 2457 (53.2%) | 95.5 (74.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 1.0 (1.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.8 (0.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.5 (0.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (4.2%) | 165 (6.9%) | 4.8 (5.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (6.5%) | 119 (5.0%) | 4.0 (4.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 32 (69.6%) | 1234 (52.0%) | 27.5 (54.2%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 42 (48.3%) | 2157 (46.7%) | 86.0 (66.7%) | |
| | Besvären är borta | 31 (73.8%) | 1425 (66.3%) | 54.3 (80.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 10 (23.8%) | 604 (28.1%) | 11.3 (16.6%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.4%) | 113 (5.3%) | 2.3 (3.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 110 | 4497 | 139.3 | |
| Kön | Kvinnor | 56 (50.9%) | 2660 (59.2%) | 82.3 (59.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.4 | 23.4 | 24.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 28 (25.5%) | 901 (20.0%) | 38.3 (27.5%) | |
| | Infektion | 76 (69.1%) | 3399 (75.6%) | 95.5 (68.6%) | |
| | Annan | 6 (5.5%) | 197 (4.4%) | 5.5 (3.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 3000 (67.3%) | 0.5 (0.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 109 (100%) | 3216 (72.1%) | 137.8 (98.9%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 1.3 (0.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.3 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 52 (47.3%) | 904 (20.1%) | 38.0 (27.3%) | |
| | Varm teknik | 56 (50.9%) | 3472 (77.2%) | 99.8 (71.6%) | |
| | Annan teknik | 2 (1.8%) | 121 (2.7%) | 1.5 (1.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (2.8%) | 129 (3.0%) | 7.8 (5.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 61 (55.5%) | 2298 (51.1%) | 84.5 (60.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 11 (18.3%) | 323 (14.4%) | 11.3 (13.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 6 (10.2%) | 211 (9.5%) | 7.8 (9.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.3 (1.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 21 (35.0%) | 614 (27.5%) | 25.3 (30.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 10 (16.7%) | 184 (8.3%) | 17.0 (20.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 17 (29.3%) | 1207 (54.3%) | 14.3 (29.8%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 48 (43.6%) | 2078 (46.2%) | 54.0 (38.8%) | |
| | Besvären är borta | 33 (68.8%) | 1502 (72.8%) | 35.8 (66.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 10 (20.8%) | 478 (23.2%) | 15.3 (28.2%) | |
| | Besvären är kvar | 4 (8.3%) | 72 (3.5%) | 2.3 (4.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (2.1%) | 10 (0.5%) | 0.8 (1.4%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Skaraborgs sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 24 | 1804 | 45.5 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (33.3%) | 803 (44.5%) | 20.3 (44.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.6 | 7.4 | 7.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 18 (75.0%) | 1362 (75.5%) | 37.3 (81.9%) | |
| | Infektion | 6 (25.0%) | 421 (23.3%) | 7.3 (15.9%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 1.0 (2.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 22 (95.7%) | 1317 (73.7%) | 45.0 (98.9%) | |
| | Varm teknik | 1 (4.3%) | 456 (25.5%) | 0.5 (1.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (33.3%) | 672 (37.3%) | 13.3 (29.1%) | |
| | Varm teknik | 15 (62.5%) | 1066 (59.1%) | 31.8 (69.8%) | |
| | Annan teknik | 1 (4.2%) | 66 (3.7%) | 0.5 (1.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.0 (2.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 15 (62.5%) | 804 (44.6%) | 29.3 (64.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (6.7%) | 46 (5.9%) | 1.3 (4.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (6.7%) | 31 (4.0%) | 0.8 (2.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (13.3%) | 124 (16.1%) | 4.3 (14.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (21.4%) | 64 (8.3%) | 3.8 (12.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (50.0%) | 403 (51.7%) | 4.3 (28.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 13 (54.2%) | 705 (39.1%) | 21.0 (46.2%) | |
| | Besvären är borta | 13 (100%) | 469 (67.1%) | 16.8 (79.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 197 (28.2%) | 4.0 (19.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (1.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 14 | 593 | 6.5 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (21.4%) | 296 (49.9%) | 2.0 (30.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.5 | 10.4 | 11.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 12 (85.7%) | 555 (93.6%) | 6.0 (92.3%) | |
| | Infektion | 2 (14.3%) | 22 (3.7%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.3 (3.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 13 (92.9%) | 489 (84.0%) | 3.3 (50.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Varm teknik | 14 (100%) | 543 (92.0%) | 6.0 (92.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.3 (3.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (57.1%) | 218 (36.8%) | 4.0 (61.5%) | |
| | Varm teknik | 5 (35.7%) | 339 (57.2%) | 2.5 (38.5%) | |
| | Annan teknik | 1 (7.1%) | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 10 (71.4%) | 317 (53.5%) | 4.3 (65.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (10.0%) | 23 (7.5%) | 0.5 (11.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 (17.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (30.0%) | 165 (53.4%) | 1.0 (23.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 8 (57.1%) | 281 (47.4%) | 3.5 (53.8%) |
| Besvären är borta | | 4 (50.0%) | 162 (58.1%) | 2.3 (64.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 3 (37.5%) | 89 (31.9%) | 0.8 (21.4%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (12.5%) | 24 (8.6%) | 0.5 (14.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Skaraborgs sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 120 | 4618 | 35.8 | |
| Kön | Kvinnor | 51 (42.5%) | 1982 (42.9%) | 16.8 (46.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.6 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 118 (98.3%) | 4568 (98.9%) | 35.8 (100%) | |
| | Infektion | 1 (0.8%) | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 1 (0.8%) | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 117 (97.5%) | 3905 (85.9%) | 24.8 (69.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (0.8%) | 281 (6.1%) | 1.5 (4.2%) | |
| | Varm teknik | 117 (97.5%) | 4153 (90.6%) | 34.3 (95.8%) | |
| | Annan teknik | 2 (1.7%) | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 63 (52.5%) | 1850 (40.1%) | 22.3 (62.2%) | |
| | Varm teknik | 53 (44.2%) | 2566 (55.6%) | 12.5 (35.0%) | |
| | Annan teknik | 4 (3.3%) | 202 (4.4%) | 1.0 (2.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (2.5%) | 47 (1.1%) | 1.3 (3.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 67 (55.8%) | 2457 (53.2%) | 21.8 (60.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (4.5%) | 61 (2.5%) | 0.5 (2.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.5%) | 31 (1.3%) | 0.3 (1.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (1.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (4.5%) | 165 (6.9%) | 1.0 (4.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (4.5%) | 119 (5.0%) | 1.5 (7.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 24 (35.8%) | 1234 (52.0%) | 6.5 (30.6%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 56 (46.7%) | 2157 (46.7%) | 18.5 (51.7%) |
| Besvären är borta | | 37 (66.1%) | 1425 (66.3%) | 13.0 (71.2%) | |
| Blivit ganska bra | | 14 (25.0%) | 604 (28.1%) | 4.5 (24.7%) | |
| Besvären är kvar | | 5 (8.9%) | 113 (5.3%) | 0.8 (4.1%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 75% | 84% | 50% | |
| Antal registrerade operationer | | 65 | 4497 | 70.7 | |
| Kön | Kvinnor | 40 (61.5%) | 2660 (59.2%) | 41.3 (58.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.3 | 23.4 | 24.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 14 (21.5%) | 901 (20.0%) | 11.3 (16.0%) | |
| | Infektion | 50 (76.9%) | 3399 (75.6%) | 56.7 (80.2%) | |
| | Annan | 1 (1.5%) | 197 (4.4%) | 2.7 (3.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 39 (60.0%) | 3000 (67.3%) | 40.7 (57.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 62 (95.4%) | 3216 (72.1%) | 70.3 (99.5%) | |
| | Varm teknik | 2 (3.1%) | 1159 (26.0%) | 0.3 (0.5%) | |
| | Annan teknik | 1 (1.5%) | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 15 (23.1%) | 904 (20.1%) | 5.0 (7.1%) | |
| | Varm teknik | 47 (72.3%) | 3472 (77.2%) | 65.3 (92.5%) | |
| | Annan teknik | 3 (4.6%) | 121 (2.7%) | 0.3 (0.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (3.1%) | 129 (3.0%) | 2.3 (3.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 29 (44.6%) | 2298 (51.1%) | 27.0 (38.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (3.4%) | 323 (14.4%) | 2.7 (10.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 2.0 (7.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.0 (3.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (10.7%) | 614 (27.5%) | 7.0 (27.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 1.7 (6.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 19 (67.9%) | 1207 (54.3%) | 11.3 (44.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 31 (47.7%) | 2078 (46.2%) | 24.3 (34.4%) |
| Besvären är borta | | 26 (83.9%) | 1502 (72.8%) | 17.0 (70.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 5 (16.1%) | 478 (23.2%) | 5.7 (23.6%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 72 (3.5%) | 1.3 (5.6%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Länssjukhuset i Sundsvall

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 75% | 84% | 50% | |
| Antal registrerade operationer | | 7 | 1804 | 12.7 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (57.1%) | 803 (44.5%) | 8.7 (68.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.1 | 7.4 | 8.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (85.7%) | 1362 (75.5%) | 7.0 (55.3%) | |
| | Infektion | 1 (14.3%) | 421 (23.3%) | 5.0 (39.5%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.7 (5.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 (14.3%) | 1262 (71.4%) | 3.0 (23.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 7 (100%) | 1317 (73.7%) | 12.7 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (14.3%) | 672 (37.3%) | 1.7 (13.2%) | |
| | Varm teknik | 6 (85.7%) | 1066 (59.1%) | 11.0 (86.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (2.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 (28.6%) | 804 (44.6%) | 3.0 (23.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (11.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.3 (11.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (50.0%) | 403 (51.7%) | 2.0 (66.7%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 (14.3%) | 705 (39.1%) | 2.7 (21.1%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 1 (100%) | 469 (67.1%) | 1.7 (71.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 197 (28.2%) | 0.7 (28.6%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 75% | 84% | 50% | |
| Antal registrerade operationer | | 6 | 593 | 5.3 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (33.3%) | 296 (49.9%) | 2.7 (50.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.5 | 10.4 | 11.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 5 (83.3%) | 555 (93.6%) | 5.0 (93.8%) | |
| | Infektion | 1 (16.7%) | 22 (3.7%) | 0.3 (6.3%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (100%) | 489 (84.0%) | 4.7 (87.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (16.7%) | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 2 (33.3%) | 543 (92.0%) | 5.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 3 (50.0%) | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (83.3%) | 218 (36.8%) | 0.7 (12.5%) | |
| | Varm teknik | 1 (16.7%) | 339 (57.2%) | 4.3 (81.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0.3 (6.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 (33.3%) | 317 (53.5%) | 1.3 (25.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 165 (53.4%) | 0.7 (50.0%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (50.0%) | 281 (47.4%) | 2.0 (37.5%) | |
| | Besvären är borta | 2 (66.7%) | 162 (58.1%) | 1.3 (66.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (33.3%) | 89 (31.9%) | 0.7 (33.3%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Länssjukhuset i Sundsvall

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 75% | 84% | 50% | |
| Antal registrerade operationer | | 53 | 4618 | 43.7 | |
| Kön | Kvinnor | 23 (43.4%) | 1982 (42.9%) | 19.0 (43.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.3 | 5.1 | 5.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 53 (100%) | 4568 (98.9%) | 42.3 (96.9%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 1.3 (3.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 53 (100%) | 3905 (85.9%) | 42.3 (96.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 9 (17.0%) | 281 (6.1%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Varm teknik | 9 (17.0%) | 4153 (90.6%) | 37.0 (84.7%) | |
| | Annan teknik | 35 (66.0%) | 150 (3.3%) | 6.3 (14.5%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 42 (79.2%) | 1850 (40.1%) | 13.0 (29.8%) | |
| | Varm teknik | 3 (5.7%) | 2566 (55.6%) | 29.7 (67.9%) | |
| | Annan teknik | 8 (15.1%) | 202 (4.4%) | 1.0 (2.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 27 (50.9%) | 2457 (53.2%) | 14.7 (33.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (8.3%) | 165 (6.9%) | 1.0 (6.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (4.3%) | 119 (5.0%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (50.0%) | 1234 (52.0%) | 5.0 (35.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 25 (47.2%) | 2157 (46.7%) | 14.3 (32.8%) |
| Besvären är borta | | 16 (66.7%) | 1425 (66.3%) | 10.3 (73.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 7 (29.2%) | 604 (28.1%) | 3.7 (26.2%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (4.2%) | 113 (5.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 72% | |
| Antal registrerade operationer | | 135 | 4497 | 87.0 | |
| Kön | Kvinnor | 84 (62.2%) | 2660 (59.2%) | 51.3 (58.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 20.9 | 23.4 | 20.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 40 (29.6%) | 901 (20.0%) | 16.5 (19.0%) | |
| | Infektion | 90 (66.7%) | 3399 (75.6%) | 68.0 (78.2%) | |
| | Annan | 5 (3.7%) | 197 (4.4%) | 2.5 (2.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 135 (100%) | 3000 (67.3%) | 86.8 (99.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 133 (98.5%) | 3216 (72.1%) | 85.0 (97.7%) | |
| | Varm teknik | 2 (1.5%) | 1159 (26.0%) | 2.0 (2.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 58 (43.0%) | 904 (20.1%) | 19.5 (22.4%) | |
| | Varm teknik | 58 (43.0%) | 3472 (77.2%) | 67.3 (77.3%) | |
| | Annan teknik | 19 (14.1%) | 121 (2.7%) | 0.3 (0.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.7%) | 129 (3.0%) | 2.5 (2.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 65 (48.1%) | 2298 (51.1%) | 49.3 (56.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (6.2%) | 323 (14.4%) | 3.8 (7.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.6%) | 211 (9.5%) | 2.0 (4.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.3 (2.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (4.6%) | 614 (27.5%) | 8.0 (16.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 3.8 (7.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 54 (83.1%) | 1207 (54.3%) | 25.5 (59.3%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 70 (51.9%) | 2078 (46.2%) | 34.0 (39.1%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 50 (71.4%) | 1502 (72.8%) | 24.0 (71.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 19 (27.1%) | 478 (23.2%) | 9.0 (26.9%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (1.4%) | 72 (3.5%) | 0.5 (1.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Lasarettet Trelleborg

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 72% | |
| Antal registrerade operationer | | 56 | 1804 | 24.8 | |
| Kön | Kvinnor | 28 (50.0%) | 803 (44.5%) | 12.0 (48.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.3 | 7.4 | 7.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 55 (98.2%) | 1362 (75.5%) | 14.3 (57.6%) | |
| | Infektion | 1 (1.8%) | 421 (23.3%) | 10.5 (42.4%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 56 (100%) | 1262 (71.4%) | 24.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 56 (100%) | 1317 (73.7%) | 24.0 (97.0%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0.8 (3.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 21 (37.5%) | 672 (37.3%) | 7.3 (29.3%) | |
| | Varm teknik | 19 (33.9%) | 1066 (59.1%) | 17.0 (68.7%) | |
| | Annan teknik | 16 (28.6%) | 66 (3.7%) | 0.5 (2.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 30 (53.6%) | 804 (44.6%) | 14.5 (58.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (3.4%) | 124 (16.1%) | 1.0 (7.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.8 (5.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 22 (73.3%) | 403 (51.7%) | 8.8 (70.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 27 (48.2%) | 705 (39.1%) | 11.0 (44.4%) |
| Besvären är borta | | 17 (63.0%) | 469 (67.1%) | 7.8 (70.5%) | |
| Blivit ganska bra | | 8 (29.6%) | 197 (28.2%) | 2.5 (22.7%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (7.4%) | 30 (4.3%) | 0.8 (6.8%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 72% | | |
| Antal registrerade operationer | | 22 | 593 | 20.5 | | |
| Kön | Kvinnor | 11 (50.0%) | 296 (49.9%) | 11.5 (56.1%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.7 | 10.4 | 7.3 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 22 (100%) | 555 (93.6%) | 19.3 (93.9%) | | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.3 (6.1%) | | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 22 (100%) | 489 (84.0%) | 20.5 (100%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (1.2%) | | |
| | Varm teknik | 22 (100%) | 543 (92.0%) | 20.3 (98.8%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 19 (86.4%) | 218 (36.8%) | 8.3 (40.2%) | | |
| | Varm teknik | 2 (9.1%) | 339 (57.2%) | 11.8 (57.3%) | | |
| | Annan teknik | 1 (4.5%) | 36 (6.1%) | 0.5 (2.4%) | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (1.2%) | | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 12 (54.5%) | 317 (53.5%) | 12.5 (61.0%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.0 (8.3%) | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (2.0%) | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 8 (66.7%) | 165 (53.4%) | 6.0 (75.0%) | | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 11 (50.0%) | 281 (47.4%) | 9.0 (43.9%) | |
| | | Besvären är borta | 9 (81.8%) | 162 (58.1%) | 6.3 (69.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (18.2%) | 89 (31.9%) | 2.8 (30.6%) | | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0 | | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 72% | |
| Antal registrerade operationer | | 145 | 4618 | 77.5 | |
| Kön | Kvinnor | 61 (42.1%) | 1982 (42.9%) | 37.0 (47.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.4 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 144 (99.3%) | 4568 (98.9%) | 77.0 (99.4%) | |
| | Infektion | 1 (0.7%) | 31 (0.7%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 145 (100%) | 3905 (85.9%) | 77.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 1.0 (1.3%) | |
| | Varm teknik | 144 (100%) | 4153 (90.6%) | 76.5 (98.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 94 (64.8%) | 1850 (40.1%) | 37.5 (48.4%) | |
| | Varm teknik | 40 (27.6%) | 2566 (55.6%) | 38.0 (49.0%) | |
| | Annan teknik | 11 (7.6%) | 202 (4.4%) | 2.0 (2.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 94 (64.8%) | 2457 (53.2%) | 49.3 (63.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (2.1%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (2.1%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (2.2%) | 165 (6.9%) | 0.8 (1.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (4.3%) | 119 (5.0%) | 1.8 (3.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 73 (79.3%) | 1234 (52.0%) | 35.0 (81.9%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 76 (52.4%) | 2157 (46.7%) | 31.5 (40.6%) |
| Besvären är borta | | 48 (63.2%) | 1425 (66.3%) | 22.5 (72.6%) | |
| Blivit ganska bra | | 23 (30.3%) | 604 (28.1%) | 7.0 (22.6%) | |
| Besvären är kvar | | 5 (6.6%) | 113 (5.3%) | 1.3 (4.0%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.8%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 88% | |
| Antal registrerade operationer | | 32 | 4497 | 31.8 | |
| Kön | Kvinnor | 18 (56.3%) | 2660 (59.2%) | 21.3 (66.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 18.8 | 23.4 | 21.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 8 (25.0%) | 901 (20.0%) | 7.5 (23.6%) | |
| | Infektion | 22 (68.8%) | 3399 (75.6%) | 24.0 (75.6%) | |
| | Annan | 2 (6.3%) | 197 (4.4%) | 0.3 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 32 (100%) | 3000 (67.3%) | 4.5 (14.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 19 (61.3%) | 3216 (72.1%) | 2.0 (6.3%) | |
| | Varm teknik | 12 (38.7%) | 1159 (26.0%) | 29.8 (93.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (6.3%) | 904 (20.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 30 (93.8%) | 3472 (77.2%) | 9.8 (30.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 22.0 (69.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (3.1%) | 129 (3.0%) | 0.8 (2.4%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 28 (87.5%) | 2298 (51.1%) | 28.0 (88.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (14.3%) | 323 (14.4%) | 2.5 (9.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (7.7%) | 211 (9.5%) | 2.0 (7.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (7.4%) | 614 (27.5%) | 4.5 (16.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 1.8 (6.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 15 (55.6%) | 1207 (54.3%) | 13.0 (56.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 23 (71.9%) | 2078 (46.2%) | 25.8 (81.1%) | |
| | Besvären är borta | 20 (87.0%) | 1502 (72.8%) | 20.8 (83.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (13.0%) | 478 (23.2%) | 4.3 (17.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Högländssjukhuset Eksjö

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 88% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 1804 | 6.5 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (50.0%) | 803 (44.5%) | 3.8 (57.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 12.0 | 7.4 | 7.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (50.0%) | 1362 (75.5%) | 2.8 (42.3%) | |
| | Infektion | 4 (50.0%) | 421 (23.3%) | 3.8 (57.7%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (85.7%) | 1262 (71.4%) | 0.8 (11.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 3 (37.5%) | 1317 (73.7%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Varm teknik | 5 (62.5%) | 456 (25.5%) | 6.3 (96.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 8 (100%) | 1066 (59.1%) | 1.8 (26.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 4.8 (73.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 6 (75.0%) | 804 (44.6%) | 4.8 (73.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0.3 (5.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.3 (5.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (60.0%) | 403 (51.7%) | 1.3 (35.7%) | |
| | | | | | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 7 (87.5%) | 705 (39.1%) | 4.8 (73.1%) | |
| | Besvären är borta | 5 (71.4%) | 469 (67.1%) | 4.3 (89.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (14.3%) | 197 (28.2%) | 0.5 (10.5%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (14.3%) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 88% | |
| Antal registrerade operationer | | 7 | 593 | 14.8 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (57.1%) | 296 (49.9%) | 7.5 (50.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.6 | 10.4 | 10.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 7 (100%) | 555 (93.6%) | 13.8 (93.2%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.0 (6.8%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 7 (100%) | 489 (84.0%) | 8.8 (59.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (14.3%) | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 5 (71.4%) | 543 (92.0%) | 14.3 (98.3%) | |
| | Annan teknik | 1 (14.3%) | 33 (5.6%) | 0.3 (1.7%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (14.3%) | 218 (36.8%) | 0 | |
| | Varm teknik | 6 (85.7%) | 339 (57.2%) | 6.0 (40.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 8.8 (59.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 5 (71.4%) | 317 (53.5%) | 13.0 (88.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (3.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (2.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.5 (3.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (3.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (40.0%) | 165 (53.4%) | 3.0 (29.3%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 6 (85.7%) | 281 (47.4%) | 12.0 (81.4%) |
| Besvären är borta | | 5 (83.3%) | 162 (58.1%) | 10.3 (85.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (16.7%) | 89 (31.9%) | 1.8 (14.6%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Höglandssjukhuset Eksjö

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 88% | |
| Antal registrerade operationer | | 59 | 4618 | 43.5 | |
| Kön | Kvinnor | 24 (40.7%) | 1982 (42.9%) | 19.5 (44.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.6 | 5.1 | 5.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 57 (96.6%) | 4568 (98.9%) | 42.3 (97.1%) | |
| | Infektion | 1 (1.7%) | 31 (0.7%) | 1.0 (2.3%) | |
| | Annan | 1 (1.7%) | 19 (0.4%) | 0.3 (0.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 57 (98.3%) | 3905 (85.9%) | 22.0 (50.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 11 (19.0%) | 281 (6.1%) | 1.0 (2.3%) | |
| | Varm teknik | 46 (79.3%) | 4153 (90.6%) | 42.3 (97.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (1.7%) | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (5.1%) | 1850 (40.1%) | 0.5 (1.1%) | |
| | Varm teknik | 53 (89.8%) | 2566 (55.6%) | 18.0 (41.4%) | |
| | Annan teknik | 3 (5.1%) | 202 (4.4%) | 25.0 (57.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (3.6%) | 47 (1.1%) | 0.8 (1.7%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 53 (89.8%) | 2457 (53.2%) | 41.3 (94.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (7.5%) | 165 (6.9%) | 1.0 (2.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 1.8 (4.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 25 (47.2%) | 1234 (52.0%) | 15.3 (46.2%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 42 (71.2%) | 2157 (46.7%) | 38.3 (87.9%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 31 (73.8%) | 1425 (66.3%) | 29.5 (77.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 10 (23.8%) | 604 (28.1%) | 8.0 (21.1%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.4%) | 113 (5.3%) | 0.5 (1.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi, NU-sjukvården, Trollhättan

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 128 | 4497 | 191.3 | |
| Kön | Kvinnor | 64 (50.0%) | 2660 (59.2%) | 111.5 (58.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 26.5 | 23.4 | 23.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 23 (18.0%) | 901 (20.0%) | 47.3 (24.7%) | |
| | Infektion | 94 (73.4%) | 3399 (75.6%) | 138.0 (72.2%) | |
| | Annan | 11 (8.6%) | 197 (4.4%) | 6.0 (3.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (4.7%) | 3000 (67.3%) | 1.8 (0.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 128 (100%) | 3216 (72.1%) | 190.5 (99.6%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0.8 (0.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (3.1%) | 904 (20.1%) | 5.5 (2.9%) | |
| | Varm teknik | 124 (96.9%) | 3472 (77.2%) | 185.5 (97.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 (0.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.9%) | 129 (3.0%) | 1.3 (0.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 96 (75.0%) | 2298 (51.1%) | 131.0 (68.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 17 (17.9%) | 323 (14.4%) | 14.0 (10.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 9 (9.8%) | 211 (9.5%) | 9.5 (7.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 3 (3.3%) | 64 (2.9%) | 2.8 (2.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 24 (25.3%) | 614 (27.5%) | 30.5 (23.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (4.3%) | 184 (8.3%) | 11.5 (8.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 53 (55.8%) | 1207 (54.3%) | 31.0 (36.9%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 92 (71.9%) | 2078 (46.2%) | 109.0 (57.0%) | |
| | Besvären är borta | 71 (77.2%) | 1502 (72.8%) | 79.8 (73.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 19 (20.7%) | 478 (23.2%) | 24.0 (22.2%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (2.2%) | 72 (3.5%) | 3.5 (3.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 1.0 (0.9%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, NU-sjukvården, Trollhättan

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 25 | 1804 | 71.8 | |
| Kön | Kvinnor | 13 (52.0%) | 803 (44.5%) | 35.3 (49.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.7 | 7.4 | 7.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 15 (60.0%) | 1362 (75.5%) | 58.0 (80.8%) | |
| | Infektion | 9 (36.0%) | 421 (23.3%) | 13.5 (18.8%) | |
| | Annan | 1 (4.0%) | 21 (1.2%) | 0.3 (0.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 23 (92.0%) | 1317 (73.7%) | 71.5 (99.7%) | |
| | Varm teknik | 2 (8.0%) | 456 (25.5%) | 0.3 (0.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (4.0%) | 672 (37.3%) | 2.8 (3.8%) | |
| | Varm teknik | 24 (96.0%) | 1066 (59.1%) | 69.0 (96.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.0 (1.6%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 20 (80.0%) | 804 (44.6%) | 50.0 (69.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (10.0%) | 46 (5.9%) | 1.8 (3.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (5.0%) | 31 (4.0%) | 0.8 (1.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (0.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (20.0%) | 124 (16.1%) | 7.3 (14.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (10.0%) | 64 (8.3%) | 5.0 (10.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (50.0%) | 403 (51.7%) | 6.3 (26.6%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 19 (76.0%) | 705 (39.1%) | 32.8 (45.6%) | |
| | Besvären är borta | 16 (84.2%) | 469 (67.1%) | 25.3 (78.9%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (10.5%) | 197 (28.2%) | 6.8 (21.1%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (5.3%) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi, NU-sjukvården, Trollhättan

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 17 | 593 | 16.5 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (47.1%) | 296 (49.9%) | 7.0 (42.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 15.0 | 10.4 | 11.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 16 (94.1%) | 555 (93.6%) | 14.3 (86.4%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.8 (10.6%) | |
| | Annan | 1 (5.9%) | 16 (2.7%) | 0.5 (3.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (29.4%) | 489 (84.0%) | 0.3 (1.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 2.3 (13.6%) | |
| | Varm teknik | 17 (100%) | 543 (92.0%) | 14.3 (86.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (5.9%) | 218 (36.8%) | 1.8 (10.6%) | |
| | Varm teknik | 16 (94.1%) | 339 (57.2%) | 14.8 (89.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 15 (88.2%) | 317 (53.5%) | 11.3 (68.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (6.7%) | 23 (7.5%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (4.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (66.7%) | 165 (53.4%) | 5.3 (48.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 13 (76.5%) | 281 (47.4%) | 10.5 (63.6%) |
| | Besvären är borta | 9 (69.2%) | 162 (58.1%) | 7.8 (73.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (15.4%) | 89 (31.9%) | 1.8 (16.7%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (15.4%) | 24 (8.6%) | 1.0 (9.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, NU-sjukvården, Trollhättan

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 98 | 4618 | 59.5 | |
| Kön | Kvinnor | 33 (33.7%) | 1982 (42.9%) | 23.0 (38.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.7 | 5.1 | 5.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 95 (96.9%) | 4568 (98.9%) | 58.8 (98.7%) | |
| | Infektion | 3 (3.1%) | 31 (0.7%) | 0.5 (0.8%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 36 (36.7%) | 3905 (85.9%) | 2.3 (3.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (1.0%) | 281 (6.1%) | 1.5 (2.5%) | |
| | Varm teknik | 97 (99.0%) | 4153 (90.6%) | 57.8 (97.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 9 (9.2%) | 1850 (40.1%) | 8.8 (14.7%) | |
| | Varm teknik | 89 (90.8%) | 2566 (55.6%) | 50.8 (85.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (3.6%) | 47 (1.1%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 76 (77.6%) | 2457 (53.2%) | 44.5 (74.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (2.6%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (1.3%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (7.9%) | 165 (6.9%) | 2.0 (4.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (3.9%) | 119 (5.0%) | 2.3 (5.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 41 (56.2%) | 1234 (52.0%) | 14.3 (33.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 75 (76.5%) | 2157 (46.7%) | 40.8 (68.5%) | |
| | Besvären är borta | 50 (66.7%) | 1425 (66.3%) | 30.8 (75.9%) | |
| | Blivit ganska bra | 15 (20.0%) | 604 (28.1%) | 8.0 (19.8%) | |
| | Besvären är kvar | 8 (10.7%) | 113 (5.3%) | 1.8 (4.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 2 (2.7%) | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Skellefteå lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 81% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 131 | 4497 | 93.5 | |
| Kön | Kvinnor | 74 (56.5%) | 2660 (59.2%) | 52.3 (55.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.0 | 23.4 | 24.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 36 (27.5%) | 901 (20.0%) | 36.5 (39.0%) | |
| | Infektion | 91 (69.5%) | 3399 (75.6%) | 53.8 (57.5%) | |
| | Annan | 4 (3.1%) | 197 (4.4%) | 3.3 (3.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 25 (19.2%) | 3000 (67.3%) | 29.0 (31.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 71 (54.2%) | 3216 (72.1%) | 50.8 (54.3%) | |
| | Varm teknik | 58 (44.3%) | 1159 (26.0%) | 42.0 (44.9%) | |
| | Annan teknik | 2 (1.5%) | 87 (1.9%) | 0.8 (0.8%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (3.8%) | 904 (20.1%) | 6.5 (7.0%) | |
| | Varm teknik | 115 (87.8%) | 3472 (77.2%) | 75.3 (80.5%) | |
| | Annan teknik | 11 (8.4%) | 121 (2.7%) | 11.8 (12.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (3.1%) | 129 (3.0%) | 2.5 (2.7%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 87 (66.4%) | 2298 (51.1%) | 52.0 (55.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 19 (21.8%) | 323 (14.4%) | 9.0 (18.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 15 (17.2%) | 211 (9.5%) | 5.5 (12.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 5 (5.7%) | 64 (2.9%) | 1.0 (2.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 29 (33.7%) | 614 (27.5%) | 14.3 (30.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 14 (16.3%) | 184 (8.3%) | 10.0 (21.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 47 (54.7%) | 1207 (54.3%) | 13.0 (45.2%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 75 (57.3%) | 2078 (46.2%) | 43.5 (46.5%) | |
| | Besvären är borta | 48 (64.0%) | 1502 (72.8%) | 34.0 (80.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 23 (30.7%) | 478 (23.2%) | 7.3 (17.2%) | |
| | Besvären är kvar | 3 (4.0%) | 72 (3.5%) | 1.0 (2.4%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (1.3%) | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Norrlands Universitetssjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Skellefteå lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 81% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 35 | 1804 | 23.5 | |
| Kön | Kvinnor | 20 (57.1%) | 803 (44.5%) | 11.0 (46.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.2 | 7.4 | 9.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 27 (77.1%) | 1362 (75.5%) | 19.0 (80.9%) | |
| | Infektion | 8 (22.9%) | 421 (23.3%) | 4.0 (17.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.5 (2.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (14.3%) | 1262 (71.4%) | 11.8 (50.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 15 (44.1%) | 1317 (73.7%) | 9.3 (39.4%) | |
| | Varm teknik | 18 (52.9%) | 456 (25.5%) | 14.3 (60.6%) | |
| | Annan teknik | 1 (2.9%) | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (5.7%) | 672 (37.3%) | 4.0 (17.0%) | |
| | Varm teknik | 32 (91.4%) | 1066 (59.1%) | 16.0 (68.1%) | |
| | Annan teknik | 1 (2.9%) | 66 (3.7%) | 3.5 (14.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (1.1%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 22 (62.9%) | 804 (44.6%) | 15.0 (63.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (23.8%) | 46 (5.9%) | 1.0 (7.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (18.2%) | 31 (4.0%) | 0.8 (5.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (9.1%) | 9 (1.2%) | 0.3 (1.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (13.6%) | 124 (16.1%) | 2.5 (19.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 7 (31.8%) | 64 (8.3%) | 1.8 (13.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 12 (54.5%) | 403 (51.7%) | 3.0 (41.4%) | |
| | Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 21 (60.0%) | 705 (39.1%) | 10.0 (42.6%) |
| Besvären är borta | | 14 (66.7%) | 469 (67.1%) | 7.3 (74.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 7 (33.3%) | 197 (28.2%) | 2.5 (25.6%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Skellefteå lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 81% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 28 | 593 | 75.8 | |
| Kön | Kvinnor | 14 (50.0%) | 296 (49.9%) | 40.0 (52.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.3 | 10.4 | 16.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 25 (89.3%) | 555 (93.6%) | 59.8 (78.9%) | |
| | Infektion | 2 (7.1%) | 22 (3.7%) | 14.5 (19.1%) | |
| | Annan | 1 (3.6%) | 16 (2.7%) | 1.5 (2.0%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 15 (55.6%) | 489 (84.0%) | 40.8 (54.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 1.0 (1.3%) | |
| | Varm teknik | 28 (100%) | 543 (92.0%) | 74.8 (98.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (14.3%) | 218 (36.8%) | 14.8 (19.5%) | |
| | Varm teknik | 21 (75.0%) | 339 (57.2%) | 35.8 (47.2%) | |
| | Annan teknik | 3 (10.7%) | 36 (6.1%) | 25.3 (33.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.8 (1.0%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 18 (64.3%) | 317 (53.5%) | 46.8 (61.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 3.5 (7.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 1.8 (4.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.5 (1.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (11.1%) | 23 (7.5%) | 5.5 (12.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (5.9%) | 8 (2.6%) | 5.0 (11.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (64.7%) | 165 (53.4%) | 9.0 (32.4%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 16 (57.1%) | 281 (47.4%) | 32.3 (42.6%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 8 (53.3%) | 162 (58.1%) | 20.8 (65.9%) | |
| | Blivit ganska bra | 6 (40.0%) | 89 (31.9%) | 8.5 (27.0%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (6.7%) | 24 (8.6%) | 2.3 (7.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Norrlands Universitetssjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Skellefteå lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 81% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 77 | 4618 | 119.3 | |
| Kön | Kvinnor | 39 (50.6%) | 1982 (42.9%) | 57.5 (48.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.7 | 5.1 | 7.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 76 (98.7%) | 4568 (98.9%) | 115.3 (96.6%) | |
| | Infektion | 1 (1.3%) | 31 (0.7%) | 3.5 (2.9%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.5 (0.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 25 (32.5%) | 3905 (85.9%) | 58.8 (49.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 1.5 (1.3%) | |
| | Varm teknik | 77 (100%) | 4153 (90.6%) | 117.3 (98.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0.3 (0.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 13 (16.9%) | 1850 (40.1%) | 38.8 (32.5%) | |
| | Varm teknik | 51 (66.2%) | 2566 (55.6%) | 44.8 (37.5%) | |
| | Annan teknik | 13 (16.9%) | 202 (4.4%) | 35.8 (30.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (2.6%) | 47 (1.1%) | 0.5 (0.4%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 48 (62.3%) | 2457 (53.2%) | 71.5 (60.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (10.4%) | 61 (2.5%) | 1.8 (2.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (4.2%) | 31 (1.3%) | 0.5 (0.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (4.2%) | 165 (6.9%) | 5.3 (8.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (4.2%) | 119 (5.0%) | 4.8 (7.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 23 (47.9%) | 1234 (52.0%) | 18.5 (41.3%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 43 (55.8%) | 2157 (46.7%) | 57.8 (48.4%) | |
| | Besvären är borta | 29 (67.4%) | 1425 (66.3%) | 41.3 (73.3%) | |
| | Blivit ganska bra | 13 (30.2%) | 604 (28.1%) | 12.5 (22.2%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.3%) | 113 (5.3%) | 1.8 (3.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.8 (1.3%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 26 | 4497 | 30.5 | |
| Kön | Kvinnor | 18 | 2660 (59.2%) | 20.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 25.5 | 23.4 | 22.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 | 901 (20.0%) | 7.0 | |
| | Infektion | 20 | 3399 (75.6%) | 21.5 | |
| | Annan | 2 | 197 (4.4%) | 2.0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 3000 (67.3%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 26 | 3216 (72.1%) | 21.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 8.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 1.3 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 | 904 (20.1%) | 1.3 | |
| | Varm teknik | 16 | 3472 (77.2%) | 29.3 | |
| | Annan teknik | 2 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 | 129 (3.0%) | 4.0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 15 | 2298 (51.1%) | 14.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 | 323 (14.4%) | 1.5 | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 | 211 (9.5%) | 1.3 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 | 614 (27.5%) | 3.3 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 | 184 (8.3%) | 2.3 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 9 | 1207 (54.3%) | 4.8 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 14 | 2078 (46.2%) | 11.0 | |
| | Besvären är borta | 11 | 1502 (72.8%) | 7.5 | |
| | Blivit ganska bra | 2 | 478 (23.2%) | 2.8 | |
| | Besvären är kvar | 1 | 72 (3.5%) | 0.3 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Visby lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 2 | 1804 | 6.8 | |
| Kön | Kvinnor | 2 | 803 (44.5%) | 3.8 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.8 | 7.4 | 10.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 | 1362 (75.5%) | 3.8 | |
| | Infektion | 1 | 421 (23.3%) | 2.8 | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 | 1317 (73.7%) | 5.5 | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 1.3 | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 | 672 (37.3%) | 0.3 | |
| | Varm teknik | 0 | 1066 (59.1%) | 6.3 | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0.3 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 | 804 (44.6%) | 3.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.3 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 1.3 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 | 64 (8.3%) | 0.3 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 | 403 (51.7%) | 1.5 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 | 705 (39.1%) | 3.0 | |
| | Besvären är borta | . | 469 (67.1%) | 2.3 | |
| | Blivit ganska bra | . | 197 (28.2%) | 0.5 | |
| | Besvären är kvar | . | 30 (4.3%) | 0.3 | |
| | Besvären har förvärrats | . | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 3 | 593 | 4.3 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 296 (49.9%) | 3.0 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.3 | 10.4 | 11.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 | 555 (93.6%) | 4.0 | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 489 (84.0%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.5 | |
| | Varm teknik | 3 | 543 (92.0%) | 3.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0.3 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 | 218 (36.8%) | 1.0 | |
| | Varm teknik | 2 | 339 (57.2%) | 3.3 | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 | 317 (53.5%) | 2.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.3 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | . | 165 (53.4%) | 0 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 | 281 (47.4%) | 1.0 | |
| | Besvären är borta | 1 | 162 (58.1%) | 0.8 | |
| | Blivit ganska bra | 1 | 89 (31.9%) | 0.3 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Visby lasarett

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 87% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 16 | 4618 | 11.8 | |
| Kön | Kvinnor | 10 | 1982 (42.9%) | 3.8 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.1 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 16 | 4568 (98.9%) | 11.8 | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 2 | 3905 (85.9%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 15 | 4153 (90.6%) | 11.8 | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 10 | 1850 (40.1%) | 4.3 | |
| | Varm teknik | 6 | 2566 (55.6%) | 7.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0.5 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 9 | 2457 (53.2%) | 7.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 0.5 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0.5 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 8 | 1234 (52.0%) | 2.3 | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 7 | 2157 (46.7%) | 6.3 |
| Besvären är borta | | 2 | 1425 (66.3%) | 4.8 | |
| Blivit ganska bra | | 5 | 604 (28.1%) | 1.5 | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 99% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 33 | 4497 | 40.3 | |
| Kön | Kvinnor | 21 (63.6%) | 2660 (59.2%) | 22.8 (56.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 26.9 | 23.4 | 22.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (18.2%) | 901 (20.0%) | 14.3 (35.4%) | |
| | Infektion | 27 (81.8%) | 3399 (75.6%) | 24.3 (60.2%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 1.8 (4.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 3000 (67.3%) | 0.5 (1.2%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 32 (100%) | 3216 (72.1%) | 39.3 (97.5%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0.5 (1.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.5 (1.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (9.1%) | 904 (20.1%) | 2.0 (5.0%) | |
| | Varm teknik | 30 (90.9%) | 3472 (77.2%) | 38.0 (94.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 (0.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 22 (66.7%) | 2298 (51.1%) | 33.5 (83.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (13.6%) | 323 (14.4%) | 3.5 (11.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (9.1%) | 211 (9.5%) | 2.0 (6.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (9.1%) | 64 (2.9%) | 1.3 (4.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (22.7%) | 614 (27.5%) | 9.0 (30.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (18.2%) | 184 (8.3%) | 4.8 (16.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (45.5%) | 1207 (54.3%) | 6.5 (41.9%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 20 (60.6%) | 2078 (46.2%) | 24.5 (60.9%) |
| Besvären är borta | | 17 (85.0%) | 1502 (72.8%) | 17.8 (76.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (10.0%) | 478 (23.2%) | 4.8 (20.4%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (5.0%) | 72 (3.5%) | 0.8 (3.2%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Västerviks sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 99% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 1804 | 6.8 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (50.0%) | 803 (44.5%) | 3.5 (51.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 14.0 | 7.4 | 9.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (75.0%) | 1362 (75.5%) | 4.8 (70.4%) | |
| | Infektion | 1 (12.5%) | 421 (23.3%) | 2.0 (29.6%) | |
| | Annan | 1 (12.5%) | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 7 (87.5%) | 1317 (73.7%) | 6.3 (92.6%) | |
| | Varm teknik | 1 (12.5%) | 456 (25.5%) | 0.5 (7.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (12.5%) | 672 (37.3%) | 0.5 (7.4%) | |
| | Varm teknik | 7 (87.5%) | 1066 (59.1%) | 6.3 (92.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 5 (62.5%) | 804 (44.6%) | 4.5 (66.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 1.0 (25.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.5 (12.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (60.0%) | 403 (51.7%) | 0.8 (25.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (62.5%) | 705 (39.1%) | 4.0 (59.3%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 3 (60.0%) | 469 (67.1%) | 3.5 (93.3%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (40.0%) | 197 (28.2%) | 0.3 (6.7%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 99% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 9 | 593 | 3.8 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (33.3%) | 296 (49.9%) | 2.3 (60.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 12.2 | 10.4 | 10.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 9 (100%) | 555 (93.6%) | 3.8 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3 (33.3%) | 489 (84.0%) | 0.3 (6.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 9 (100%) | 543 (92.0%) | 3.8 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (11.1%) | 218 (36.8%) | 1.5 (40.0%) | |
| | Varm teknik | 8 (88.9%) | 339 (57.2%) | 2.0 (53.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0.3 (6.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 5 (55.6%) | 317 (53.5%) | 2.8 (73.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.5 (22.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (40.0%) | 165 (53.4%) | 0.8 (50.0%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 5 (55.6%) | 281 (47.4%) | 2.0 (53.3%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 0 | 162 (58.1%) | 1.0 (50.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (80.0%) | 89 (31.9%) | 0.8 (37.5%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (20.0%) | 24 (8.6%) | 0.3 (12.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Västerviks sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 99% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 43 | 4618 | 24.0 | |
| Kön | Kvinnor | 22 (51.2%) | 1982 (42.9%) | 13.0 (54.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.8 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 43 (100%) | 4568 (98.9%) | 24.0 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 (23.3%) | 3905 (85.9%) | 9.5 (39.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Varm teknik | 43 (100%) | 4153 (90.6%) | 23.8 (99.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 13 (30.2%) | 1850 (40.1%) | 5.0 (20.8%) | |
| | Varm teknik | 27 (62.8%) | 2566 (55.6%) | 12.5 (52.1%) | |
| | Annan teknik | 3 (7.0%) | 202 (4.4%) | 6.5 (27.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 33 (76.7%) | 2457 (53.2%) | 19.8 (82.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (3.0%) | 61 (2.5%) | 0.3 (1.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (6.3%) | 165 (6.9%) | 1.0 (5.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (9.7%) | 119 (5.0%) | 1.8 (9.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (33.3%) | 1234 (52.0%) | 4.3 (29.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 25 (58.1%) | 2157 (46.7%) | 17.5 (72.9%) |
| Besvären är borta | | 14 (56.0%) | 1425 (66.3%) | 12.5 (71.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 11 (44.0%) | 604 (28.1%) | 4.8 (27.1%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0.3 (1.4%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | | |
| Antal registrerade operationer | | 44 | 4497 | 138.5 | | |
| Kön | Kvinnor | 27 (61.4%) | 2660 (59.2%) | 87.5 (63.2%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 30.0 | 23.4 | 23.9 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 7 (15.9%) | 901 (20.0%) | 38.8 (28.0%) | | |
| | Infektion | 25 (56.8%) | 3399 (75.6%) | 90.5 (65.3%) | | |
| | Annan | 12 (27.3%) | 197 (4.4%) | 9.3 (6.7%) | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 27 (61.4%) | 3000 (67.3%) | 121.8 (88.1%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 41 (93.2%) | 3216 (72.1%) | 30.0 (21.7%) | | |
| | Varm teknik | 3 (6.8%) | 1159 (26.0%) | 108.5 (78.3%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 7 (15.9%) | 904 (20.1%) | 29.0 (20.9%) | | |
| | Varm teknik | 37 (84.1%) | 3472 (77.2%) | 106.5 (76.9%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 3.0 (2.2%) | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (2.3%) | 129 (3.0%) | 0.5 (0.4%) | | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 33 (75.0%) | 2298 (51.1%) | 122.0 (88.1%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (12.1%) | 323 (14.4%) | 19.0 (19.8%) | | |
| | Inlagda pga. blödning | 3 (9.1%) | 211 (9.5%) | 13.0 (13.7%) | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 3.3 (3.4%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 11 (35.5%) | 614 (27.5%) | 33.8 (35.4%) | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (3.0%) | 184 (8.3%) | 10.3 (10.7%) | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 20 (60.6%) | 1207 (54.3%) | 27.3 (44.9%) | | |
| | Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 26 (59.1%) | 2078 (46.2%) | 84.8 (61.2%) | |
| | | Besvären är borta | 18 (72.0%) | 1502 (72.8%) | 61.0 (77.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 6 (24.0%) | 478 (23.2%) | 17.0 (21.5%) | | |
| Besvären är kvar | | 0 | 72 (3.5%) | 1.3 (1.6%) | | |
| Besvären har förvärrats | | 1 (4.0%) | 10 (0.5%) | 0 | | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Västmanlands sjukhus, Västerås

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 17 | 1804 | 38.0 | |
| Kön | Kvinnor | 10 (58.8%) | 803 (44.5%) | 17.8 (46.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.8 | 7.4 | 7.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 14 (82.4%) | 1362 (75.5%) | 26.5 (69.7%) | |
| | Infektion | 2 (11.8%) | 421 (23.3%) | 10.3 (27.0%) | |
| | Annan | 1 (5.9%) | 21 (1.2%) | 1.3 (3.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 7 (41.2%) | 1262 (71.4%) | 25.5 (67.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 16 (94.1%) | 1317 (73.7%) | 5.8 (15.1%) | |
| | Varm teknik | 1 (5.9%) | 456 (25.5%) | 32.3 (84.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 6 (35.3%) | 672 (37.3%) | 11.3 (29.6%) | |
| | Varm teknik | 11 (64.7%) | 1066 (59.1%) | 24.0 (63.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 2.8 (7.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 14 (82.4%) | 804 (44.6%) | 35.5 (93.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (14.3%) | 46 (5.9%) | 2.8 (9.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (14.3%) | 31 (4.0%) | 2.0 (6.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.8 (2.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (7.7%) | 124 (16.1%) | 10.0 (34.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 4.0 (13.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 6 (46.2%) | 403 (51.7%) | 6.8 (36.5%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 13 (76.5%) | 705 (39.1%) | 25.0 (65.8%) | |
| | Besvären är borta | 8 (66.7%) | 469 (67.1%) | 17.8 (74.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (33.3%) | 197 (28.2%) | 6.0 (25.3%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 7 | 593 | 13.8 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (28.6%) | 296 (49.9%) | 7.3 (52.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.4 | 10.4 | 11.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (85.7%) | 555 (93.6%) | 12.0 (87.3%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.3 (9.1%) | |
| | Annan | 1 (14.3%) | 16 (2.7%) | 0.5 (3.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (85.7%) | 489 (84.0%) | 11.8 (85.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 7 (100%) | 543 (92.0%) | 13.8 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (14.3%) | 218 (36.8%) | 4.8 (34.5%) | |
| | Varm teknik | 6 (85.7%) | 339 (57.2%) | 7.5 (54.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 1.5 (10.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 5 (71.4%) | 317 (53.5%) | 12.0 (87.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (5.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (2.6%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (20.0%) | 23 (7.5%) | 1.5 (15.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (5.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (80.0%) | 165 (53.4%) | 2.8 (34.4%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (57.1%) | 281 (47.4%) | 8.0 (58.2%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 2 (50.0%) | 162 (58.1%) | 6.0 (82.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (25.0%) | 89 (31.9%) | 0.8 (10.3%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (25.0%) | 24 (8.6%) | 0.3 (3.4%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0.3 (3.4%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Västmanlands sjukhus, Västerås

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 41 | 4618 | 77.0 | |
| Kön | Kvinnor | 16 (39.0%) | 1982 (42.9%) | 36.0 (46.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.0 | 5.1 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 41 (100%) | 4568 (98.9%) | 76.5 (99.4%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.5 (0.6%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 21 (51.2%) | 3905 (85.9%) | 55.3 (71.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 41 (100%) | 4153 (90.6%) | 77.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 28 (68.3%) | 1850 (40.1%) | 26.8 (34.7%) | |
| | Varm teknik | 13 (31.7%) | 2566 (55.6%) | 45.8 (59.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 4.5 (5.8%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (2.4%) | 47 (1.1%) | 0.3 (0.3%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 34 (82.9%) | 2457 (53.2%) | 70.0 (90.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (5.9%) | 61 (2.5%) | 0.5 (0.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (5.9%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 8 (24.2%) | 165 (6.9%) | 6.0 (10.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (9.1%) | 119 (5.0%) | 1.5 (2.6%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 18 (52.9%) | 1234 (52.0%) | 15.8 (42.9%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 28 (68.3%) | 2157 (46.7%) | 53.8 (69.8%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 22 (81.5%) | 1425 (66.3%) | 37.8 (77.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 5 (18.5%) | 604 (28.1%) | 9.5 (19.6%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 1.0 (2.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (0.5%) | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 74% | 84% | 63% | |
| Antal registrerade operationer | | 72 | 4497 | 89.3 | |
| Kön | Kvinnor | 42 (58.3%) | 2660 (59.2%) | 55.0 (61.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 21.6 | 23.4 | 19.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 8 (11.1%) | 901 (20.0%) | 28.3 (31.7%) | |
| | Infektion | 56 (77.8%) | 3399 (75.6%) | 58.0 (64.9%) | |
| | Annan | 8 (11.1%) | 197 (4.4%) | 3.0 (3.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 40 (55.6%) | 3000 (67.3%) | 33.3 (37.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 71 (100%) | 3216 (72.1%) | 88.7 (99.3%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0.3 (0.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.3 (0.4%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 1.7 (1.9%) | |
| | Varm teknik | 71 (98.6%) | 3472 (77.2%) | 87.7 (98.1%) | |
| | Annan teknik | 1 (1.4%) | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (4.2%) | 129 (3.0%) | 2.7 (3.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 44 (61.1%) | 2298 (51.1%) | 60.7 (67.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (11.4%) | 323 (14.4%) | 8.0 (14.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (4.5%) | 211 (9.5%) | 3.3 (5.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 1.3 (2.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 12 (27.3%) | 614 (27.5%) | 12.3 (21.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (2.3%) | 184 (8.3%) | 4.0 (7.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 16 (36.4%) | 1207 (54.3%) | 8.0 (35.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 50 (69.4%) | 2078 (46.2%) | 53.0 (59.3%) |
| Besvären är borta | | 35 (70.0%) | 1502 (72.8%) | 38.3 (72.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 11 (22.0%) | 478 (23.2%) | 12.0 (22.6%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (8.0%) | 72 (3.5%) | 2.3 (4.4%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.6%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Centralasarettet Växjö

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 74% | 84% | 63% | |
| Antal registrerade operationer | | 28 | 1804 | 78.3 | |
| Kön | Kvinnor | 13 (46.4%) | 803 (44.5%) | 32.3 (41.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.7 | 7.4 | 6.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 19 (67.9%) | 1362 (75.5%) | 66.0 (84.3%) | |
| | Infektion | 7 (25.0%) | 421 (23.3%) | 11.3 (14.5%) | |
| | Annan | 2 (7.1%) | 21 (1.2%) | 1.0 (1.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3 (10.7%) | 1262 (71.4%) | 2.7 (3.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 26 (96.3%) | 1317 (73.7%) | 77.7 (99.1%) | |
| | Varm teknik | 1 (3.7%) | 456 (25.5%) | 0.7 (0.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (3.6%) | 672 (37.3%) | 1.3 (1.7%) | |
| | Varm teknik | 26 (92.9%) | 1066 (59.1%) | 76.3 (97.4%) | |
| | Annan teknik | 1 (3.6%) | 66 (3.7%) | 0.7 (0.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (3.6%) | 23 (1.4%) | 1.3 (1.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 19 (67.9%) | 804 (44.6%) | 55.7 (71.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (5.3%) | 46 (5.9%) | 3.0 (5.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 2.3 (4.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 1.7 (3.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (11.1%) | 124 (16.1%) | 5.3 (9.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (5.6%) | 64 (8.3%) | 2.7 (5.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (36.8%) | 403 (51.7%) | 9.3 (45.9%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 15 (53.6%) | 705 (39.1%) | 38.7 (49.4%) | |
| | Besvären är borta | 9 (60.0%) | 469 (67.1%) | 32.3 (85.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 6 (40.0%) | 197 (28.2%) | 5.7 (14.9%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 74% | 84% | 63% | | |
| Antal registrerade operationer | | 4 | 593 | 0.7 | | |
| Kön | Kvinnor | 4 (100%) | 296 (49.9%) | 0.3 (50.0%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.1 | 10.4 | 13.6 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (100%) | 555 (93.6%) | 0.7 (100%) | | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 2 (50.0%) | 489 (84.0%) | 0.7 (100%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | | |
| | Varm teknik | 4 (100%) | 543 (92.0%) | 0.7 (100%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0.3 (50.0%) | | |
| | Varm teknik | 4 (100%) | 339 (57.2%) | 0.3 (50.0%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 3 (75.0%) | 317 (53.5%) | 0.3 (50.0%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (66.7%) | 165 (53.4%) | 0 | | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 (50.0%) | 281 (47.4%) | 0 | |
| | | Besvären är borta | 1 (50.0%) | 162 (58.1%) | . (.) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (50.0%) | 89 (31.9%) | . (.) | | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | . (.) | | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | . (.) | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Centrallasarettet Växjö

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 74% | 84% | 63% | |
| Antal registrerade operationer | | 32 | 4618 | 12.7 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (21.9%) | 1982 (42.9%) | 2.7 (21.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.2 | 5.1 | 5.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 32 (100%) | 4568 (98.9%) | 12.7 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 30 (93.8%) | 3905 (85.9%) | 12.0 (94.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 4 (12.5%) | 281 (6.1%) | 0.7 (5.3%) | |
| | Varm teknik | 28 (87.5%) | 4153 (90.6%) | 12.0 (94.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (12.5%) | 1850 (40.1%) | 2.3 (18.4%) | |
| | Varm teknik | 28 (87.5%) | 2566 (55.6%) | 10.3 (81.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 24 (75.0%) | 2457 (53.2%) | 8.3 (65.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (4.3%) | 165 (6.9%) | 0.3 (4.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (4.3%) | 119 (5.0%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (30.4%) | 1234 (52.0%) | 3.7 (47.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 20 (62.5%) | 2157 (46.7%) | 8.0 (63.2%) |
| Besvären är borta | | 13 (65.0%) | 1425 (66.3%) | 4.7 (58.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 7 (35.0%) | 604 (28.1%) | 3.0 (37.5%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0.3 (4.2%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 108 | 4497 | 107.5 | |
| Kön | Kvinnor | 65 (60.2%) | 2660 (59.2%) | 64.8 (60.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.8 | 23.4 | 23.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 12 (11.1%) | 901 (20.0%) | 23.5 (21.9%) | |
| | Infektion | 95 (88.0%) | 3399 (75.6%) | 81.8 (76.0%) | |
| | Annan | 1 (0.9%) | 197 (4.4%) | 2.3 (2.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 89 (84.8%) | 3000 (67.3%) | 62.5 (58.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 94 (87.0%) | 3216 (72.1%) | 105.8 (98.4%) | |
| | Varm teknik | 14 (13.0%) | 1159 (26.0%) | 1.8 (1.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 34 (31.5%) | 904 (20.1%) | 28.3 (26.3%) | |
| | Varm teknik | 74 (68.5%) | 3472 (77.2%) | 78.5 (73.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.8 (0.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (1.9%) | 129 (3.0%) | 1.8 (1.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 68 (63.0%) | 2298 (51.1%) | 62.8 (58.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 20 (29.9%) | 323 (14.4%) | 10.3 (16.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 12 (17.9%) | 211 (9.5%) | 6.0 (9.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 3 (4.6%) | 64 (2.9%) | 2.8 (4.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 25 (38.5%) | 614 (27.5%) | 16.3 (26.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 9 (13.4%) | 184 (8.3%) | 6.5 (10.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 39 (57.4%) | 1207 (54.3%) | 18.3 (47.1%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 59 (54.6%) | 2078 (46.2%) | 39.3 (36.5%) | |
| | Besvären är borta | 53 (91.4%) | 1502 (72.8%) | 29.3 (75.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 5 (8.6%) | 478 (23.2%) | 8.0 (20.5%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 1.3 (3.2%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.5 (1.3%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Lasarettet i Ystad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 57 | 1804 | 46.3 | |
| Kön | Kvinnor | 29 (50.9%) | 803 (44.5%) | 20.8 (44.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.4 | 7.4 | 6.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 25 (43.9%) | 1362 (75.5%) | 29.0 (62.7%) | |
| | Infektion | 31 (54.4%) | 421 (23.3%) | 17.0 (36.8%) | |
| | Annan | 1 (1.8%) | 21 (1.2%) | 0.3 (0.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 38 (71.7%) | 1262 (71.4%) | 19.8 (42.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 49 (86.0%) | 1317 (73.7%) | 44.3 (95.7%) | |
| | Varm teknik | 8 (14.0%) | 456 (25.5%) | 2.0 (4.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 30 (52.6%) | 672 (37.3%) | 14.8 (31.9%) | |
| | Varm teknik | 27 (47.4%) | 1066 (59.1%) | 28.3 (61.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 3.3 (7.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 1.3 (2.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 36 (63.2%) | 804 (44.6%) | 28.8 (62.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (11.1%) | 46 (5.9%) | 2.8 (9.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (5.9%) | 31 (4.0%) | 2.0 (6.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.5 (1.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (16.7%) | 124 (16.1%) | 5.5 (19.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (8.3%) | 64 (8.3%) | 2.5 (8.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 19 (54.3%) | 403 (51.7%) | 9.5 (41.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 26 (45.6%) | 705 (39.1%) | 19.0 (41.1%) | |
| | Besvären är borta | 18 (69.2%) | 469 (67.1%) | 13.3 (69.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 6 (23.1%) | 197 (28.2%) | 5.0 (26.3%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (7.7%) | 30 (4.3%) | 0.5 (2.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0.3 (1.3%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 11 | 593 | 14.3 | |
| Kön | Kvinnor | 7 (63.6%) | 296 (49.9%) | 7.3 (50.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 10.0 | 10.4 | 16.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 10 (90.9%) | 555 (93.6%) | 10.8 (75.4%) | |
| | Infektion | 1 (9.1%) | 22 (3.7%) | 2.8 (19.3%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.8 (5.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (80.0%) | 489 (84.0%) | 6.5 (45.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (9.1%) | 14 (2.4%) | 3.8 (26.3%) | |
| | Varm teknik | 10 (90.9%) | 543 (92.0%) | 10.5 (73.7%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (36.4%) | 218 (36.8%) | 5.0 (35.1%) | |
| | Varm teknik | 7 (63.6%) | 339 (57.2%) | 5.3 (36.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 4.0 (28.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (63.6%) | 317 (53.5%) | 10.5 (73.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 1.0 (9.8%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.8 (7.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 2.3 (22.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 (7.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (57.1%) | 165 (53.4%) | 2.0 (33.3%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 6 (54.5%) | 281 (47.4%) | 6.8 (47.4%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 6 (100%) | 162 (58.1%) | 3.8 (55.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 89 (31.9%) | 2.0 (29.6%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 1.0 (14.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Lasarettet i Ystad

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 180 | 4618 | 182.3 | |
| Kön | Kvinnor | 77 (42.8%) | 1982 (42.9%) | 83.3 (45.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.3 | 5.1 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 179 (99.4%) | 4568 (98.9%) | 181.3 (99.5%) | |
| | Infektion | 1 (0.6%) | 31 (0.7%) | 1.0 (0.5%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 122 (73.9%) | 3905 (85.9%) | 73.0 (40.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 (1.1%) | 281 (6.1%) | 2.3 (1.2%) | |
| | Varm teknik | 177 (98.9%) | 4153 (90.6%) | 179.3 (98.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0.5 (0.3%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 43 (23.9%) | 1850 (40.1%) | 53.5 (29.4%) | |
| | Varm teknik | 136 (75.6%) | 2566 (55.6%) | 57.8 (31.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.6%) | 202 (4.4%) | 71.0 (39.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.6%) | 47 (1.1%) | 0.5 (0.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 108 (60.0%) | 2457 (53.2%) | 118.0 (64.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (0.9%) | 61 (2.5%) | 3.0 (2.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (0.9%) | 31 (1.3%) | 1.3 (1.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 1.0 (0.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 7 (6.7%) | 165 (6.9%) | 7.0 (6.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 8 (7.6%) | 119 (5.0%) | 7.0 (6.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 57 (54.3%) | 1234 (52.0%) | 35.3 (42.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 96 (53.3%) | 2157 (46.7%) | 73.0 (40.1%) |
| Besvären är borta | | 68 (70.8%) | 1425 (66.3%) | 52.8 (72.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 24 (25.0%) | 604 (28.1%) | 17.3 (23.8%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (4.2%) | 113 (5.3%) | 2.5 (3.4%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 97 | 4497 | 44.8 | |
| Kön | Kvinnor | 63 (64.9%) | 2660 (59.2%) | 25.8 (57.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 19.3 | 23.4 | 21.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 21 (21.6%) | 901 (20.0%) | 11.5 (25.7%) | |
| | Infektion | 73 (75.3%) | 3399 (75.6%) | 30.8 (68.7%) | |
| | Annan | 3 (3.1%) | 197 (4.4%) | 2.5 (5.6%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 96 (99.0%) | 3000 (67.3%) | 44.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 97 (100%) | 3216 (72.1%) | 43.5 (97.2%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 1.3 (2.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 28 (28.9%) | 904 (20.1%) | 3.8 (8.4%) | |
| | Varm teknik | 56 (57.7%) | 3472 (77.2%) | 40.5 (90.5%) | |
| | Annan teknik | 13 (13.4%) | 121 (2.7%) | 0.5 (1.1%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (3.1%) | 129 (3.0%) | 1.0 (2.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 47 (48.5%) | 2298 (51.1%) | 32.3 (72.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 4 (9.1%) | 323 (14.4%) | 3.8 (13.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 3 (6.8%) | 211 (9.5%) | 2.8 (10.2%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 14 (31.1%) | 614 (27.5%) | 6.5 (25.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 8 (18.6%) | 184 (8.3%) | 2.5 (9.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 23 (52.3%) | 1207 (54.3%) | 5.5 (26.2%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 39 (40.2%) | 2078 (46.2%) | 31.8 (70.9%) | |
| | Besvären är borta | 24 (61.5%) | 1502 (72.8%) | 18.5 (72.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 13 (33.3%) | 478 (23.2%) | 5.8 (22.5%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (5.1%) | 72 (3.5%) | 1.3 (4.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Ängelholms sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 40 | 1804 | 10.5 | |
| Kön | Kvinnor | 14 (35.0%) | 803 (44.5%) | 5.0 (47.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.2 | 7.4 | 8.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 27 (67.5%) | 1362 (75.5%) | 7.5 (71.4%) | |
| | Infektion | 12 (30.0%) | 421 (23.3%) | 2.8 (26.2%) | |
| | Annan | 1 (2.5%) | 21 (1.2%) | 0.3 (2.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 40 (100%) | 1262 (71.4%) | 10.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 31 (79.5%) | 1317 (73.7%) | 9.5 (90.5%) | |
| | Varm teknik | 8 (20.5%) | 456 (25.5%) | 1.0 (9.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 17 (42.5%) | 672 (37.3%) | 1.5 (14.3%) | |
| | Varm teknik | 17 (42.5%) | 1066 (59.1%) | 8.8 (83.3%) | |
| | Annan teknik | 6 (15.0%) | 66 (3.7%) | 0.3 (2.4%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 18 (45.0%) | 804 (44.6%) | 6.3 (59.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.5 (8.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.5 (8.7%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.3 (4.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (55.6%) | 403 (51.7%) | 0.8 (33.3%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 16 (40.0%) | 705 (39.1%) | 7.3 (69.0%) | |
| | Besvären är borta | 7 (43.8%) | 469 (67.1%) | 4.0 (66.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 8 (50.0%) | 197 (28.2%) | 2.0 (33.3%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (6.3%) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 30 | 593 | 27.3 | |
| Kön | Kvinnor | 19 (63.3%) | 296 (49.9%) | 17.0 (62.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.1 | 10.4 | 14.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 28 (93.3%) | 555 (93.6%) | 25.0 (91.7%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.8 (6.4%) | |
| | Annan | 2 (6.7%) | 16 (2.7%) | 0.5 (1.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 30 (100%) | 489 (84.0%) | 27.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 30 (100%) | 543 (92.0%) | 27.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 13 (43.3%) | 218 (36.8%) | 6.8 (24.8%) | |
| | Varm teknik | 14 (46.7%) | 339 (57.2%) | 20.5 (75.2%) | |
| | Annan teknik | 3 (10.0%) | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 17 (56.7%) | 317 (53.5%) | 20.3 (74.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (11.8%) | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (5.9%) | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (6.3%) | 23 (7.5%) | 0.5 (3.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (6.3%) | 8 (2.6%) | 0.3 (1.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 8 (47.1%) | 165 (53.4%) | 4.3 (34.7%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 14 (46.7%) | 281 (47.4%) | 19.0 (69.7%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 3 (21.4%) | 162 (58.1%) | 8.3 (63.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 9 (64.3%) | 89 (31.9%) | 3.3 (25.0%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (14.3%) | 24 (8.6%) | 1.5 (11.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Ängelholms sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 96% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 229 | 4618 | 77.8 | |
| Kön | Kvinnor | 110 (48.0%) | 1982 (42.9%) | 37.5 (48.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.4 | 5.1 | 6.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 227 (99.1%) | 4568 (98.9%) | 76.8 (98.7%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 1.0 (1.3%) | |
| | Annan | 2 (0.9%) | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 229 (100%) | 3905 (85.9%) | 77.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 (0.9%) | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 227 (99.1%) | 4153 (90.6%) | 76.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 151 (65.9%) | 1850 (40.1%) | 23.5 (30.2%) | |
| | Varm teknik | 61 (26.6%) | 2566 (55.6%) | 53.5 (68.8%) | |
| | Annan teknik | 17 (7.4%) | 202 (4.4%) | 0.8 (1.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (0.4%) | 47 (1.1%) | 1.0 (1.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 128 (55.9%) | 2457 (53.2%) | 59.3 (76.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (1.6%) | 61 (2.5%) | 0.8 (1.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (0.8%) | 31 (1.3%) | 0.8 (1.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0.3 (0.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (3.3%) | 165 (6.9%) | 2.3 (4.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (1.7%) | 119 (5.0%) | 2.0 (3.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 71 (60.2%) | 1234 (52.0%) | 17.3 (41.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 99 (43.2%) | 2157 (46.7%) | 52.3 (67.2%) |
| Besvären är borta | | 54 (55.1%) | 1425 (66.3%) | 27.8 (66.1%) | |
| Blivit ganska bra | | 36 (36.7%) | 604 (28.1%) | 11.3 (26.8%) | |
| Besvären är kvar | | 8 (8.2%) | 113 (5.3%) | 3.0 (7.1%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 20 | 4497 | 33.8 | |
| Kön | Kvinnor | 12 (60.0%) | 2660 (59.2%) | 19.3 (57.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 32.0 | 23.4 | 20.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 (15.0%) | 901 (20.0%) | 9.0 (26.7%) | |
| | Infektion | 13 (65.0%) | 3399 (75.6%) | 21.8 (64.4%) | |
| | Annan | 4 (20.0%) | 197 (4.4%) | 3.0 (8.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 14 (70.0%) | 3000 (67.3%) | 27.3 (80.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 16 (80.0%) | 3216 (72.1%) | 32.5 (96.3%) | |
| | Varm teknik | 1 (5.0%) | 1159 (26.0%) | 0.5 (1.5%) | |
| | Annan teknik | 3 (15.0%) | 87 (1.9%) | 0.8 (2.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (5.0%) | 904 (20.1%) | 1.0 (3.0%) | |
| | Varm teknik | 19 (95.0%) | 3472 (77.2%) | 32.3 (95.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.5 (1.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 0.8 (2.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 10 (50.0%) | 2298 (51.1%) | 21.5 (63.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (10.0%) | 323 (14.4%) | 2.3 (11.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (10.0%) | 211 (9.5%) | 1.5 (7.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (10.0%) | 64 (2.9%) | 1.0 (5.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (10.0%) | 614 (27.5%) | 6.5 (34.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 2.8 (14.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (33.3%) | 1207 (54.3%) | 4.5 (39.1%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 12 (60.0%) | 2078 (46.2%) | 17.0 (50.4%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 8 (66.7%) | 1502 (72.8%) | 12.3 (83.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (33.3%) | 478 (23.2%) | 1.8 (11.9%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 0.8 (5.1%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Universitetssjukhuset Örebro

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 1804 | 8.8 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (40.0%) | 803 (44.5%) | 4.8 (54.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.3 | 7.4 | 8.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (80.0%) | 1362 (75.5%) | 7.8 (88.6%) | |
| | Infektion | 1 (20.0%) | 421 (23.3%) | 1.0 (11.4%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 4 (80.0%) | 1262 (71.4%) | 8.5 (97.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 4 (80.0%) | 1317 (73.7%) | 7.8 (88.6%) | |
| | Varm teknik | 1 (20.0%) | 456 (25.5%) | 1.0 (11.4%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 0.5 (5.7%) | |
| | Varm teknik | 5 (100%) | 1066 (59.1%) | 8.3 (94.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (2.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 (20.0%) | 804 (44.6%) | 6.8 (77.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.5 (8.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.5 (8.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 1.3 (20.0%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.5 (8.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 403 (51.7%) | 0.5 (15.4%) | |
| | | | | | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 0 | 705 (39.1%) | 6.0 (68.6%) | |
| | Besvären är borta | . (.) | 469 (67.1%) | 3.3 (61.9%) | |
| | Blivit ganska bra | . (.) | 197 (28.2%) | 1.8 (33.3%) | |
| | Besvären är kvar | . (.) | 30 (4.3%) | 0.3 (4.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | . (.) | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 593 | 10.8 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (50.0%) | 296 (49.9%) | 6.0 (55.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.1 | 10.4 | 7.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 8 (100%) | 555 (93.6%) | 10.3 (95.3%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0.5 (4.7%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (100%) | 489 (84.0%) | 10.3 (95.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Varm teknik | 7 (87.5%) | 543 (92.0%) | 10.5 (97.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (12.5%) | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (12.5%) | 218 (36.8%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Varm teknik | 6 (75.0%) | 339 (57.2%) | 10.5 (97.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (12.5%) | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 6 (75.0%) | 317 (53.5%) | 6.3 (58.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (16.7%) | 8 (2.6%) | 0.5 (8.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (4.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.3 (4.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 1.0 (16.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 (12.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (50.0%) | 165 (53.4%) | 1.8 (36.8%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 4 (50.0%) | 281 (47.4%) | 4.0 (37.2%) |
| Besvären är borta | | 3 (75.0%) | 162 (58.1%) | 2.8 (73.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (25.0%) | 89 (31.9%) | 0.5 (13.3%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0.5 (13.3%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Universitetssjukhuset Örebro

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 91% | 84% | 87% | |
| Antal registrerade operationer | | 32 | 4618 | 28.0 | |
| Kön | Kvinnor | 12 (37.5%) | 1982 (42.9%) | 12.3 (43.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.4 | 5.1 | 5.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 32 (100%) | 4568 (98.9%) | 27.5 (98.2%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.5 (1.8%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 30 (93.8%) | 3905 (85.9%) | 27.0 (96.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 2 (6.3%) | 281 (6.1%) | 2.0 (7.1%) | |
| | Varm teknik | 29 (90.6%) | 4153 (90.6%) | 26.0 (92.9%) | |
| | Annan teknik | 1 (3.1%) | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (12.5%) | 1850 (40.1%) | 2.0 (7.1%) | |
| | Varm teknik | 26 (81.3%) | 2566 (55.6%) | 24.8 (88.4%) | |
| | Annan teknik | 2 (6.3%) | 202 (4.4%) | 1.3 (4.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (3.1%) | 47 (1.1%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 15 (46.9%) | 2457 (53.2%) | 16.8 (59.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 1.5 (9.2%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 1.3 (7.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (26.7%) | 1234 (52.0%) | 4.5 (45.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 21 (65.6%) | 2157 (46.7%) | 13.8 (49.1%) | |
| Patientnytta | Besvärerna är borta | 17 (81.0%) | 1425 (66.3%) | 8.5 (63.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (19.0%) | 604 (28.1%) | 4.0 (29.6%) | |
| | Besvärerna är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 1.0 (7.4%) | |
| | Besvärerna har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 3 | 4497 | 7.3 | |
| Kön | Kvinnor | 1 | 2660 (59.2%) | 3.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.6 | 23.4 | 22.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 | 901 (20.0%) | 1.0 | |
| | Infektion | 1 | 3399 (75.6%) | 6.0 | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0.3 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 3000 (67.3%) | 0.8 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 3216 (72.1%) | 5.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 1.8 | |
| | Annan teknik | 3 | 87 (1.9%) | 0.5 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 1 | 3472 (77.2%) | 6.3 | |
| | Annan teknik | 2 | 121 (2.7%) | 1.0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 | 129 (3.0%) | 0.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 | 2298 (51.1%) | 5.8 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 | 323 (14.4%) | 0.8 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 0.5 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 | 614 (27.5%) | 0.8 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 | 184 (8.3%) | 0.3 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 | 1207 (54.3%) | 0.5 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 | 2078 (46.2%) | 4.3 | |
| | Besvären är borta | 3 | 1502 (72.8%) | 3.8 | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 478 (23.2%) | 0.5 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Örnsköldsviks sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 2 | 1804 | 1.3 | |
| Kön | Kvinnor | 1 | 803 (44.5%) | 0.8 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.2 | 7.4 | 8.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 | 1362 (75.5%) | 0.3 | |
| | Infektion | 1 | 421 (23.3%) | 1.0 | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 1317 (73.7%) | 1.3 | |
| | Varm teknik | 1 | 456 (25.5%) | 0 | |
| | Annan teknik | 1 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 2 | 1066 (59.1%) | 1.3 | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 | 804 (44.6%) | 1.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0.3 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 | 403 (51.7%) | 0.3 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 | 705 (39.1%) | 0.5 | |
| | Besvären är borta | 0 | 469 (67.1%) | 0.3 | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 197 (28.2%) | 0.3 | |
| | Besvären är kvar | 1 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 593 | 11.8 | |
| Kön | Kvinnor | 3 | 296 (49.9%) | 7.8 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 14.2 | 10.4 | 15.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 | 555 (93.6%) | 8.3 | |
| | Infektion | 2 | 22 (3.7%) | 3.5 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 | 489 (84.0%) | 11.8 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 4 | 543 (92.0%) | 11.3 | |
| | Annan teknik | 1 | 33 (5.6%) | 0.5 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0.8 | |
| | Varm teknik | 4 | 339 (57.2%) | 9.8 | |
| | Annan teknik | 1 | 36 (6.1%) | 1.3 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 3 | 317 (53.5%) | 9.5 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 2.0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.8 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 | 165 (53.4%) | 2.5 | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 3 | 281 (47.4%) | 8.8 | |
| | Besvären är borta | 2 | 162 (58.1%) | 4.8 | |
| | Blivit ganska bra | 1 | 89 (31.9%) | 2.8 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | 0.8 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Örnsköldsviks sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 92% | |
| Antal registrerade operationer | | 34 | 4618 | 24.0 | |
| Kön | Kvinnor | 12 | 1982 (42.9%) | 12.3 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.5 | 5.1 | 5.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 34 | 4568 (98.9%) | 24.0 | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 32 | 3905 (85.9%) | 23.3 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0.5 | |
| | Varm teknik | 25 | 4153 (90.6%) | 21.0 | |
| | Annan teknik | 9 | 150 (3.3%) | 2.5 | |
| Blodstillnings- metod | Kall teknik | 3 | 1850 (40.1%) | 2.8 | |
| | Varm teknik | 26 | 2566 (55.6%) | 17.3 | |
| | Annan teknik | 5 | 202 (4.4%) | 4.0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 20 | 2457 (53.2%) | 19.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 | 61 (2.5%) | 0.3 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.3 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 | 165 (6.9%) | 1.0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 | 119 (5.0%) | 1.0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 | 1234 (52.0%) | 2.5 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 18 | 2157 (46.7%) | 16.5 | |
| | Besvären är borta | 9 | 1425 (66.3%) | 12.0 | |
| | Blivit ganska bra | 9 | 604 (28.1%) | 3.8 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 0.8 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 66% | 84% | 78% | |
| Antal registrerade operationer | | 33 | 4497 | 54.3 | |
| Kön | Kvinnor | 21 (63.6%) | 2660 (59.2%) | 32.5 (59.9%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.9 | 23.4 | 24.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 12 (36.4%) | 901 (20.0%) | 12.5 (23.0%) | |
| | Infektion | 19 (57.6%) | 3399 (75.6%) | 37.8 (69.6%) | |
| | Annan | 2 (6.1%) | 197 (4.4%) | 4.0 (7.4%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 25 (92.6%) | 3000 (67.3%) | 34.0 (63.6%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 28 (90.3%) | 3216 (72.1%) | 47.3 (87.5%) | |
| | Varm teknik | 1 (3.2%) | 1159 (26.0%) | 4.3 (7.9%) | |
| | Annan teknik | 2 (6.5%) | 87 (1.9%) | 2.5 (4.6%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (12.1%) | 904 (20.1%) | 9.8 (18.0%) | |
| | Varm teknik | 28 (84.8%) | 3472 (77.2%) | 42.5 (78.3%) | |
| | Annan teknik | 1 (3.0%) | 121 (2.7%) | 2.0 (3.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (3.2%) | 129 (3.0%) | 3.0 (5.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 16 (48.5%) | 2298 (51.1%) | 31.0 (57.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (12.5%) | 323 (14.4%) | 3.0 (10.6%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (6.3%) | 211 (9.5%) | 1.8 (6.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (6.3%) | 64 (2.9%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (28.6%) | 614 (27.5%) | 10.3 (36.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (6.7%) | 184 (8.3%) | 3.3 (11.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (68.8%) | 1207 (54.3%) | 8.3 (39.8%) | |
| | | | | | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 12 (36.4%) | 2078 (46.2%) | 19.8 (36.4%) | |
| | Besvären är borta | 9 (75.0%) | 1502 (72.8%) | 14.0 (70.9%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (16.7%) | 478 (23.2%) | 4.3 (21.5%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (8.3%) | 72 (3.5%) | 1.5 (7.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Östersunds sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 66% | 84% | 78% | |
| Antal registrerade operationer | | 12 | 1804 | 12.0 | |
| Kön | Kvinnor | 6 (50.0%) | 803 (44.5%) | 7.8 (64.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.2 | 7.4 | 9.9 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 7 (58.3%) | 1362 (75.5%) | 7.3 (60.4%) | |
| | Infektion | 5 (41.7%) | 421 (23.3%) | 4.5 (37.5%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0.3 (2.1%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (80.0%) | 1262 (71.4%) | 10.0 (83.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 6 (50.0%) | 1317 (73.7%) | 10.0 (83.3%) | |
| | Varm teknik | 1 (8.3%) | 456 (25.5%) | 1.5 (12.5%) | |
| | Annan teknik | 5 (41.7%) | 13 (0.7%) | 0.5 (4.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (25.0%) | 672 (37.3%) | 4.0 (33.3%) | |
| | Varm teknik | 8 (66.7%) | 1066 (59.1%) | 7.5 (62.5%) | |
| | Annan teknik | 1 (8.3%) | 66 (3.7%) | 0.5 (4.2%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (2.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 4 (33.3%) | 804 (44.6%) | 7.8 (64.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (3.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0.3 (3.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 2.5 (34.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (75.0%) | 403 (51.7%) | 2.8 (47.8%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 7 (58.3%) | 705 (39.1%) | 4.3 (35.4%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 6 (85.7%) | 469 (67.1%) | 3.0 (70.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (14.3%) | 197 (28.2%) | 1.0 (23.5%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (5.9%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 66% | 84% | 78% | |
| Antal registrerade operationer | | 7 | 593 | 11.5 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (42.9%) | 296 (49.9%) | 6.8 (58.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.6 | 10.4 | 13.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (85.7%) | 555 (93.6%) | 10.0 (87.0%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.3 (10.9%) | |
| | Annan | 1 (14.3%) | 16 (2.7%) | 0.3 (2.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 4 (100%) | 489 (84.0%) | 10.5 (91.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.3 (2.2%) | |
| | Varm teknik | 2 (28.6%) | 543 (92.0%) | 10.8 (93.5%) | |
| | Annan teknik | 5 (71.4%) | 33 (5.6%) | 0.5 (4.3%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (42.9%) | 218 (36.8%) | 7.0 (60.9%) | |
| | Varm teknik | 2 (28.6%) | 339 (57.2%) | 3.3 (28.3%) | |
| | Annan teknik | 2 (28.6%) | 36 (6.1%) | 1.3 (10.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 (28.6%) | 317 (53.5%) | 6.3 (54.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.8 (12.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (4.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (50.0%) | 165 (53.4%) | 2.3 (69.2%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 (28.6%) | 281 (47.4%) | 4.5 (39.1%) |
| Besvären är borta | | 1 (50.0%) | 162 (58.1%) | 2.8 (61.1%) | |
| Blivit ganska bra | | 0 | 89 (31.9%) | 1.8 (38.9%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (50.0%) | 24 (8.6%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Östersunds sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 66% | 84% | 78% | |
| Antal registrerade operationer | | 45 | 4618 | 48.3 | |
| Kön | Kvinnor | 17 (37.8%) | 1982 (42.9%) | 18.0 (37.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.2 | 5.1 | 6.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 45 (100%) | 4568 (98.9%) | 47.8 (99.0%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.5 (1.0%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 41 (100%) | 3905 (85.9%) | 44.8 (92.7%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (2.4%) | 281 (6.1%) | 0.8 (1.6%) | |
| | Varm teknik | 26 (61.9%) | 4153 (90.6%) | 45.0 (93.3%) | |
| | Annan teknik | 15 (35.7%) | 150 (3.3%) | 2.5 (5.2%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 23 (51.1%) | 1850 (40.1%) | 33.0 (68.4%) | |
| | Varm teknik | 17 (37.8%) | 2566 (55.6%) | 12.0 (24.9%) | |
| | Annan teknik | 5 (11.1%) | 202 (4.4%) | 3.3 (6.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 22 (48.9%) | 2457 (53.2%) | 30.5 (63.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0.5 (2.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (4.5%) | 165 (6.9%) | 2.0 (7.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0.5 (2.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 11 (55.0%) | 1234 (52.0%) | 7.5 (45.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 22 (48.9%) | 2157 (46.7%) | 19.8 (40.9%) |
| Besvären är borta | | 11 (50.0%) | 1425 (66.3%) | 14.5 (73.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 8 (36.4%) | 604 (28.1%) | 3.3 (16.5%) | |
| Besvären är kvar | | 3 (13.6%) | 113 (5.3%) | 1.8 (8.9%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0.3 (1.3%) | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 59% | 84% | 57% | |
| Antal registrerade operationer | | 272 | 4497 | 253.0 | |
| Kön | Kvinnor | 165 (60.7%) | 2660 (59.2%) | 142.0 (56.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 25.6 | 23.4 | 24.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 38 (14.0%) | 901 (20.0%) | 34.3 (13.6%) | |
| | Infektion | 228 (83.8%) | 3399 (75.6%) | 216.7 (85.6%) | |
| | Annan | 6 (2.2%) | 197 (4.4%) | 2.0 (0.8%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 262 (97.0%) | 3000 (67.3%) | 218.0 (86.4%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 3216 (72.1%) | 0.3 (0.1%) | |
| | Varm teknik | 271 (100%) | 1159 (26.0%) | 252.3 (99.9%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 13 (4.8%) | 904 (20.1%) | 0.7 (0.3%) | |
| | Varm teknik | 258 (94.9%) | 3472 (77.2%) | 252.3 (99.7%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.4%) | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 3.0 (1.2%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 135 (49.6%) | 2298 (51.1%) | 71.0 (28.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 31 (23.3%) | 323 (14.4%) | 16.3 (23.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 22 (17.1%) | 211 (9.5%) | 10.3 (14.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 9 (7.0%) | 64 (2.9%) | 5.3 (7.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 41 (31.1%) | 614 (27.5%) | 24.3 (35.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 11 (8.7%) | 184 (8.3%) | 9.0 (12.9%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 69 (52.3%) | 1207 (54.3%) | 23.3 (34.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 119 (43.8%) | 2078 (46.2%) | 69.7 (27.5%) |
| Besvären är borta | | 86 (72.3%) | 1502 (72.8%) | 49.3 (71.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 29 (24.4%) | 478 (23.2%) | 17.0 (24.8%) | |
| Besvären är kvar | | 4 (3.4%) | 72 (3.5%) | 2.0 (2.9%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.5%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 59% | 84% | 57% | |
| Antal registrerade operationer | | 65 | 1804 | 46.3 | |
| Kön | Kvinnor | 30 (46.2%) | 803 (44.5%) | 23.3 (50.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 10.2 | 7.4 | 8.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 32 (49.2%) | 1362 (75.5%) | 27.3 (59.0%) | |
| | Infektion | 33 (50.8%) | 421 (23.3%) | 19.0 (41.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 64 (100%) | 1262 (71.4%) | 45.3 (97.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 1317 (73.7%) | 0 | |
| | Varm teknik | 65 (100%) | 456 (25.5%) | 46.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (1.5%) | 672 (37.3%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Varm teknik | 64 (98.5%) | 1066 (59.1%) | 46.0 (99.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.3 (0.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 23 (35.4%) | 804 (44.6%) | 11.7 (25.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (5.0%) | 46 (5.9%) | 1.3 (11.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (4.8%) | 31 (4.0%) | 1.0 (8.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (2.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (17.4%) | 124 (16.1%) | 3.3 (30.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (4.8%) | 64 (8.3%) | 1.3 (11.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 9 (39.1%) | 403 (51.7%) | 5.7 (48.6%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 22 (33.8%) | 705 (39.1%) | 12.0 (25.9%) | |
| | Besvären är borta | 15 (68.2%) | 469 (67.1%) | 9.3 (77.8%) | |
| | Blivit ganska bra | 7 (31.8%) | 197 (28.2%) | 2.0 (16.7%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (2.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0.3 (2.8%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 59% | 84% | 57% | |
| Antal registrerade operationer | | 6 | 593 | 12.3 | |
| Kön | Kvinnor | 3 (50.0%) | 296 (49.9%) | 6.0 (48.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.3 | 10.4 | 6.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (100%) | 555 (93.6%) | 12.0 (97.3%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (2.7%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (100%) | 489 (84.0%) | 12.0 (97.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 6 (100%) | 543 (92.0%) | 12.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (16.7%) | 218 (36.8%) | 0 | |
| | Varm teknik | 5 (83.3%) | 339 (57.2%) | 12.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 3 (50.0%) | 317 (53.5%) | 3.0 (24.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.7 (22.2%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (11.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (66.7%) | 165 (53.4%) | 2.0 (66.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (50.0%) | 281 (47.4%) | 3.3 (27.0%) |
| Besvären är borta | | 3 (100%) | 162 (58.1%) | 2.3 (70.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 0 | 89 (31.9%) | 1.0 (30.0%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Sophiahemmet

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 59% | 84% | 57% | |
| Antal registrerade operationer | | 139 | 4618 | 131.0 | |
| Kön | Kvinnor | 68 (48.9%) | 1982 (42.9%) | 60.3 (46.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.3 | 5.1 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 138 (99.3%) | 4568 (98.9%) | 130.7 (99.7%) | |
| | Infektion | 1 (0.7%) | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0.3 (0.3%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 139 (100%) | 3905 (85.9%) | 130.0 (99.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 139 (100%) | 4153 (90.6%) | 131.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 9 (6.5%) | 1850 (40.1%) | 3.0 (2.3%) | |
| | Varm teknik | 129 (92.8%) | 2566 (55.6%) | 127.7 (97.5%) | |
| | Annan teknik | 1 (0.7%) | 202 (4.4%) | 0.3 (0.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 1.7 (1.3%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 68 (48.9%) | 2457 (53.2%) | 35.7 (27.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0.3 (1.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.3 (0.9%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 7 (11.1%) | 165 (6.9%) | 4.7 (13.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (1.6%) | 119 (5.0%) | 1.0 (2.8%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 27 (42.9%) | 1234 (52.0%) | 11.7 (34.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 53 (38.1%) | 2157 (46.7%) | 37.3 (28.5%) | |
| | Besvären är borta | 43 (81.1%) | 1425 (66.3%) | 26.3 (72.5%) | |
| | Blivit ganska bra | 10 (18.9%) | 604 (28.1%) | 8.0 (22.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 2.0 (5.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 64 | 4497 | 51.3 | |
| Kön | Kvinnor | 50 (78.1%) | 2660 (59.2%) | 34.5 (67.3%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 18.9 | 23.4 | 19.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 (1.6%) | 901 (20.0%) | 13.3 (25.9%) | |
| | Infektion | 62 (96.9%) | 3399 (75.6%) | 37.8 (73.7%) | |
| | Annan | 1 (1.6%) | 197 (4.4%) | 0.3 (0.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 (1.6%) | 3000 (67.3%) | 0.3 (0.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 64 (100%) | 3216 (72.1%) | 21.3 (41.5%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 29.8 (58.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0.3 (0.5%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 3 (4.7%) | 904 (20.1%) | 18.3 (35.6%) | |
| | Varm teknik | 61 (95.3%) | 3472 (77.2%) | 19.8 (38.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 13.3 (25.9%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (4.7%) | 129 (3.0%) | 2.3 (4.4%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 46 (71.9%) | 2298 (51.1%) | 15.3 (29.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 5 (10.9%) | 323 (14.4%) | 3.5 (23.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (8.9%) | 211 (9.5%) | 1.5 (9.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (2.2%) | 64 (2.9%) | 0.3 (1.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 15 (34.1%) | 614 (27.5%) | 5.5 (36.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 3 (6.5%) | 184 (8.3%) | 0.5 (3.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 17 (38.6%) | 1207 (54.3%) | 5.8 (48.9%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 47 (73.4%) | 2078 (46.2%) | 17.0 (33.2%) | |
| | Besvären är borta | 38 (80.9%) | 1502 (72.8%) | 13.8 (82.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 8 (17.0%) | 478 (23.2%) | 2.8 (16.4%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.1%) | 72 (3.5%) | 0.3 (1.5%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Frölunda Specialistsjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 1804 | 17.5 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (40.0%) | 803 (44.5%) | 6.5 (37.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.0 | 7.4 | 5.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 (20.0%) | 1362 (75.5%) | 15.8 (90.0%) | |
| | Infektion | 4 (80.0%) | 421 (23.3%) | 1.8 (10.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 0 | 1262 (71.4%) | 0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 5 (100%) | 1317 (73.7%) | 3.8 (21.4%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 13.8 (78.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 11.0 (62.9%) | |
| | Varm teknik | 5 (100%) | 1066 (59.1%) | 3.0 (17.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 3.5 (20.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.5 (2.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 4 (80.0%) | 804 (44.6%) | 4.8 (27.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (33.3%) | 124 (16.1%) | 2.0 (42.1%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0.3 (5.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (66.7%) | 403 (51.7%) | 1.5 (50.0%) | |
| | | | | | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 5 (100%) | 705 (39.1%) | 5.0 (28.6%) | |
| | Besvären är borta | 4 (80.0%) | 469 (67.1%) | 4.3 (85.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (20.0%) | 197 (28.2%) | 0.5 (10.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0.3 (5.0%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 14 | 593 | 9.8 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (28.6%) | 296 (49.9%) | 4.0 (41.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.7 | 10.4 | 10.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 14 (100%) | 555 (93.6%) | 8.8 (89.7%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 1.0 (10.3%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 (71.4%) | 489 (84.0%) | 5.0 (51.3%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 10 (71.4%) | 543 (92.0%) | 9.8 (100%) | |
| | Annan teknik | 4 (28.6%) | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillnings- metod | Kall teknik | 6 (42.9%) | 218 (36.8%) | 4.5 (46.2%) | |
| | Varm teknik | 6 (42.9%) | 339 (57.2%) | 1.0 (10.3%) | |
| | Annan teknik | 2 (14.3%) | 36 (6.1%) | 4.3 (43.6%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (7.1%) | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 10 (71.4%) | 317 (53.5%) | 4.8 (48.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (10.0%) | 8 (2.6%) | 0.3 (5.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (10.0%) | 4 (1.3%) | 0.3 (5.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (10.0%) | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0.5 (10.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 5 (50.0%) | 165 (53.4%) | 2.3 (50.0%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 9 (64.3%) | 281 (47.4%) | 5.3 (53.8%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 3 (33.3%) | 162 (58.1%) | 3.8 (71.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (44.4%) | 89 (31.9%) | 1.3 (23.8%) | |
| | Besvären är kvar | 2 (22.2%) | 24 (8.6%) | 0.3 (4.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Frölunda Specialistsjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 94% | 84% | 95% | |
| Antal registrerade operationer | | 40 | 4618 | 24.5 | |
| Kön | Kvinnor | 22 (55.0%) | 1982 (42.9%) | 13.0 (53.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.0 | 5.1 | 5.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 39 (97.5%) | 4568 (98.9%) | 24.5 (100%) | |
| | Infektion | 1 (2.5%) | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 38 (95.0%) | 3905 (85.9%) | 9.3 (37.8%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 3 (7.5%) | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 27 (67.5%) | 4153 (90.6%) | 23.8 (100%) | |
| | Annan teknik | 10 (25.0%) | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 17 (42.5%) | 1850 (40.1%) | 15.0 (61.2%) | |
| | Varm teknik | 15 (37.5%) | 2566 (55.6%) | 1.3 (5.1%) | |
| | Annan teknik | 8 (20.0%) | 202 (4.4%) | 8.3 (33.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 27 (67.5%) | 2457 (53.2%) | 7.5 (30.6%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (3.7%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (11.5%) | 165 (6.9%) | 0.5 (6.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0.3 (3.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 16 (61.5%) | 1234 (52.0%) | 3.5 (58.3%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 27 (67.5%) | 2157 (46.7%) | 10.8 (43.9%) | |
| | Besvären är borta | 22 (81.5%) | 1425 (66.3%) | 8.0 (74.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 5 (18.5%) | 604 (28.1%) | 2.5 (23.3%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 0.3 (2.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 80% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 63 | 4497 | 53.7 | |
| Kön | Kvinnor | 36 (57.1%) | 2660 (59.2%) | 28.3 (52.8%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 22.8 | 23.4 | 22.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 7 (11.1%) | 901 (20.0%) | 2.0 (3.7%) | |
| | Infektion | 49 (77.8%) | 3399 (75.6%) | 51.7 (96.3%) | |
| | Annan | 7 (11.1%) | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 63 (100%) | 3000 (67.3%) | 53.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 3216 (72.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 62 (100%) | 1159 (26.0%) | 53.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (1.6%) | 904 (20.1%) | 17.3 (32.3%) | |
| | Varm teknik | 62 (98.4%) | 3472 (77.2%) | 13.0 (24.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 23.3 (43.5%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 5 (8.1%) | 129 (3.0%) | 4.7 (8.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 27 (42.9%) | 2298 (51.1%) | 13.0 (24.2%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (3.7%) | 323 (14.4%) | 2.7 (21.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (3.8%) | 211 (9.5%) | 1.3 (10.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (3.8%) | 64 (2.9%) | 1.0 (7.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (19.2%) | 614 (27.5%) | 3.0 (24.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 5 (18.5%) | 184 (8.3%) | 1.0 (8.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (40.0%) | 1207 (54.3%) | 7.7 (60.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 29 (46.0%) | 2078 (46.2%) | 15.7 (29.2%) |
| Besvären är borta | | 17 (58.6%) | 1502 (72.8%) | 11.7 (74.5%) | |
| Blivit ganska bra | | 11 (37.9%) | 478 (23.2%) | 3.7 (23.4%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (3.4%) | 72 (3.5%) | 0.3 (2.1%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Öron-, Näs- och Halskliniken, Söderma

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 80% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 1804 | 6.7 | |
| Kön | Kvinnor | 2 (25.0%) | 803 (44.5%) | 3.3 (50.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.2 | 7.4 | 7.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 (25.0%) | 1362 (75.5%) | 3.0 (45.0%) | |
| | Infektion | 6 (75.0%) | 421 (23.3%) | 3.7 (55.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (100%) | 1262 (71.4%) | 6.7 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 1317 (73.7%) | 0 | |
| | Varm teknik | 8 (100%) | 456 (25.5%) | 6.7 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 672 (37.3%) | 1.0 (15.0%) | |
| | Varm teknik | 8 (100%) | 1066 (59.1%) | 2.3 (35.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 3.3 (50.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 (87.5%) | 804 (44.6%) | 1.0 (15.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (33.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (16.7%) | 124 (16.1%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (42.9%) | 403 (51.7%) | 0.7 (66.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 7 (87.5%) | 705 (39.1%) | 1.3 (20.0%) |
| Besvären är borta | | 5 (71.4%) | 469 (67.1%) | 0.7 (50.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (28.6%) | 197 (28.2%) | 0.3 (25.0%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0.3 (25.0%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 80% | 84% | 79% | | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 593 | 8.0 | | |
| Kön | Kvinnor | 3 (60.0%) | 296 (49.9%) | 4.7 (58.3%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 20.0 | 10.4 | 10.8 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 5 (100%) | 555 (93.6%) | 7.7 (95.8%) | | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (4.2%) | | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (100%) | 489 (84.0%) | 8.0 (100%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | | |
| | Varm teknik | 5 (100%) | 543 (92.0%) | 8.0 (100%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 2.0 (25.0%) | | |
| | Varm teknik | 5 (100%) | 339 (57.2%) | 3.0 (37.5%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 3.0 (37.5%) | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0.7 (8.3%) | | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 3 (60.0%) | 317 (53.5%) | 2.0 (25.0%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (33.3%) | 23 (7.5%) | 0.3 (16.7%) | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (100%) | 165 (53.4%) | 1.3 (66.7%) | | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 (60.0%) | 281 (47.4%) | 2.0 (25.0%) | |
| | | Besvären är borta | 1 (33.3%) | 162 (58.1%) | 2.0 (100%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (66.7%) | 89 (31.9%) | 0 | | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0 | | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Öron-, Näs- och Halskliniken, Södermal

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 80% | 84% | 79% | |
| Antal registrerade operationer | | 83 | 4618 | 67.3 | |
| Kön | Kvinnor | 34 (41.0%) | 1982 (42.9%) | 25.7 (38.1%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.6 | 5.1 | 4.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 83 (100%) | 4568 (98.9%) | 67.3 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 82 (100%) | 3905 (85.9%) | 67.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 83 (100%) | 4153 (90.6%) | 67.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 1850 (40.1%) | 23.7 (35.1%) | |
| | Varm teknik | 83 (100%) | 2566 (55.6%) | 21.0 (31.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 22.7 (33.7%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.2%) | 47 (1.1%) | 0.7 (1.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 29 (34.9%) | 2457 (53.2%) | 13.7 (20.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0.3 (2.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0.3 (2.4%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (12.0%) | 165 (6.9%) | 0.7 (4.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (3.7%) | 119 (5.0%) | 1.7 (12.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 13 (46.4%) | 1234 (52.0%) | 5.0 (37.5%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 32 (38.6%) | 2157 (46.7%) | 16.0 (23.8%) |
| Besvären är borta | | 22 (68.8%) | 1425 (66.3%) | 11.3 (70.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 9 (28.1%) | 604 (28.1%) | 4.0 (25.0%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (3.1%) | 113 (5.3%) | 0.7 (4.2%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 3 | 593 | 2.3 | |
| Kön | Kvinnor | 2 | 296 (49.9%) | 1.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 17.4 | 10.4 | 19.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 | 555 (93.6%) | 2.0 | |
| | Infektion | 1 | 22 (3.7%) | 0.3 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 3 | 489 (84.0%) | 2.3 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 3 | 543 (92.0%) | 2.3 | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 | 218 (36.8%) | 0.3 | |
| | Varm teknik | 2 | 339 (57.2%) | 2.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 2 | 317 (53.5%) | 1.3 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 165 (53.4%) | 0.5 | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 2 | 281 (47.4%) | 0.5 | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 1 | 162 (58.1%) | 0.5 | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 89 (31.9%) | 0 | |
| | Besvären är kvar | 1 | 24 (8.6%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Sollefteå sjukhus

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 97% | |
| Antal registrerade operationer | | 10 | 4618 | 30.0 | |
| Kön | Kvinnor | 5 | 1982 (42.9%) | 16.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.8 | 5.1 | 6.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 10 | 4568 (98.9%) | 29.8 | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.3 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 10 | 3905 (85.9%) | 29.8 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 10 | 4153 (90.6%) | 30.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 | 1850 (40.1%) | 0.8 | |
| | Varm teknik | 9 | 2566 (55.6%) | 29.3 | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 7 | 2457 (53.2%) | 19.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 | 165 (6.9%) | 0.3 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 | 119 (5.0%) | 0.3 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 | 1234 (52.0%) | 5.0 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 8 | 2157 (46.7%) | 18.3 | |
| | Besvären är borta | 6 | 1425 (66.3%) | 12.0 | |
| | Blivit ganska bra | 2 | 604 (28.1%) | 4.8 | |
| | Besvären är kvar | 0 | 113 (5.3%) | 0.5 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0.5 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | ej tillgänglig | 84% | . | |
| Antal registrerade operationer | | 326 | 4497 | 82.5 | |
| Kön | Kvinnor | 209 (64.1%) | 2660 (59.2%) | 50.0 (60.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 23.1 | 23.4 | 26.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 22 (6.7%) | 901 (20.0%) | 0.5 (0.6%) | |
| | Infektion | 302 (92.6%) | 3399 (75.6%) | 81.0 (98.2%) | |
| | Annan | 2 (0.6%) | 197 (4.4%) | 1.0 (1.2%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 326 (100%) | 3000 (67.3%) | 79.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 16 (4.9%) | 3216 (72.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 310 (95.1%) | 1159 (26.0%) | 82.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 60 (18.4%) | 904 (20.1%) | 16.0 (19.4%) | |
| | Varm teknik | 266 (81.6%) | 3472 (77.2%) | 66.5 (80.6%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (0.6%) | 129 (3.0%) | 3.0 (3.7%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 64 (19.6%) | 2298 (51.1%) | 19.0 (23.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 13 (21.3%) | 323 (14.4%) | 3.5 (20.0%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 11 (18.0%) | 211 (9.5%) | 2.5 (14.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 4 (6.6%) | 64 (2.9%) | 1.0 (5.7%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 22 (36.7%) | 614 (27.5%) | 5.0 (30.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (3.3%) | 184 (8.3%) | 4.0 (23.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 45 (72.6%) | 1207 (54.3%) | 10.5 (61.8%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 57 (17.5%) | 2078 (46.2%) | 21.5 (26.1%) | |
| | Besvären är borta | 38 (66.7%) | 1502 (72.8%) | 14.5 (67.4%) | |
| | Blivit ganska bra | 17 (29.8%) | 478 (23.2%) | 5.5 (25.6%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (1.8%) | 72 (3.5%) | 1.5 (7.0%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (1.8%) | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | ej tillgänglig | 84% | . | |
| Antal registrerade operationer | | 96 | 1804 | 32.5 | |
| Kön | Kvinnor | 51 (53.1%) | 803 (44.5%) | 16.0 (49.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.9 | 7.4 | 8.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 71 (74.0%) | 1362 (75.5%) | 20.5 (63.1%) | |
| | Infektion | 24 (25.0%) | 421 (23.3%) | 12.0 (36.9%) | |
| | Annan | 1 (1.0%) | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 96 (100%) | 1262 (71.4%) | 31.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 7 (7.4%) | 1317 (73.7%) | 0 | |
| | Varm teknik | 87 (92.6%) | 456 (25.5%) | 32.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 27 (28.1%) | 672 (37.3%) | 10.0 (30.8%) | |
| | Varm teknik | 69 (71.9%) | 1066 (59.1%) | 22.5 (69.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0.5 (1.5%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 9 (9.4%) | 804 (44.6%) | 5.5 (16.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (11.1%) | 46 (5.9%) | 0.5 (9.1%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (11.1%) | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (44.4%) | 124 (16.1%) | 1.5 (27.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (12.5%) | 64 (8.3%) | 1.5 (30.0%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (87.5%) | 403 (51.7%) | 3.5 (70.0%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 15 (15.6%) | 705 (39.1%) | 4.0 (12.3%) |
| Besvären är borta | | 13 (86.7%) | 469 (67.1%) | 3.0 (75.0%) | |
| Blivit ganska bra | | 2 (13.3%) | 197 (28.2%) | 0.5 (12.5%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 30 (4.3%) | 0.5 (12.5%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | ej tillgänglig | 84% | . | |
| Antal registrerade operationer | | 176 | 4618 | 50.5 | |
| Kön | Kvinnor | 73 (41.5%) | 1982 (42.9%) | 18.5 (36.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.9 | 5.1 | 5.0 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 174 (98.9%) | 4568 (98.9%) | 49.0 (97.0%) | |
| | Infektion | 2 (1.1%) | 31 (0.7%) | 1.5 (3.0%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 176 (100%) | 3905 (85.9%) | 50.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 176 (100%) | 4153 (90.6%) | 49.5 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 64 (36.4%) | 1850 (40.1%) | 23.0 (45.5%) | |
| | Varm teknik | 112 (63.6%) | 2566 (55.6%) | 27.5 (54.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.5 (1.0%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 30 (17.0%) | 2457 (53.2%) | 11.5 (22.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 2 (6.7%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (3.7%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 4 (13.8%) | 165 (6.9%) | 2.5 (22.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (3.6%) | 119 (5.0%) | 1.0 (9.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 24 (82.8%) | 1234 (52.0%) | 7.0 (66.7%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 28 (15.9%) | 2157 (46.7%) | 11.5 (22.8%) |
| Besvären är borta | | 20 (71.4%) | 1425 (66.3%) | 9.0 (78.3%) | |
| Blivit ganska bra | | 8 (28.6%) | 604 (28.1%) | 2.5 (21.7%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 94% | |
| Antal registrerade operationer | | 38 | 4497 | 34.5 | |
| Kön | Kvinnor | 17 (44.7%) | 2660 (59.2%) | 20.5 (59.4%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 21.0 | 23.4 | 21.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 7 (18.4%) | 901 (20.0%) | 14.5 (42.0%) | |
| | Infektion | 31 (81.6%) | 3399 (75.6%) | 20.0 (58.0%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 38 (100%) | 3000 (67.3%) | 34.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 34 (100%) | 3216 (72.1%) | 33.3 (97.8%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0.8 (2.2%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 4 (10.5%) | 904 (20.1%) | 1.0 (2.9%) | |
| | Varm teknik | 34 (89.5%) | 3472 (77.2%) | 33.5 (97.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 4 (11.1%) | 129 (3.0%) | 2.3 (6.6%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 18 (47.4%) | 2298 (51.1%) | 13.3 (38.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (17.6%) | 323 (14.4%) | 1.3 (9.4%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (11.1%) | 211 (9.5%) | 0.8 (5.8%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 2 (11.1%) | 64 (2.9%) | 0.3 (1.9%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 8 (44.4%) | 614 (27.5%) | 3.8 (28.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (11.1%) | 184 (8.3%) | 1.8 (13.2%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 7 (43.8%) | 1207 (54.3%) | 3.5 (32.6%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 15 (39.5%) | 2078 (46.2%) | 12.5 (36.2%) | |
| | Besvären är borta | 11 (73.3%) | 1502 (72.8%) | 9.8 (78.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (20.0%) | 478 (23.2%) | 2.5 (20.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 0.3 (2.0%) | |
| | Besvären har förvärrats | 1 (6.7%) | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Serafimerlasarettet

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 94% | |
| Antal registrerade operationer | | 19 | 1804 | 5.5 | |
| Kön | Kvinnor | 11 (57.9%) | 803 (44.5%) | 3.5 (63.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 16 (84.2%) | 1362 (75.5%) | 4.3 (77.3%) | |
| | Infektion | 3 (15.8%) | 421 (23.3%) | 1.3 (22.7%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 19 (100%) | 1262 (71.4%) | 5.5 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 19 (100%) | 1317 (73.7%) | 5.3 (95.5%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillnings- metod | Kall teknik | 2 (10.5%) | 672 (37.3%) | 1.0 (18.2%) | |
| | Varm teknik | 17 (89.5%) | 1066 (59.1%) | 4.5 (81.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 2 (10.5%) | 23 (1.4%) | 0.5 (9.1%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 8 (42.1%) | 804 (44.6%) | 1.8 (31.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (14.3%) | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (12.5%) | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (12.5%) | 124 (16.1%) | 0.3 (14.3%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (12.5%) | 64 (8.3%) | 0.3 (14.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (57.1%) | 403 (51.7%) | 0.3 (25.0%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 8 (42.1%) | 705 (39.1%) | 2.5 (45.5%) | |
| | Besvären är borta | 6 (75.0%) | 469 (67.1%) | 1.5 (60.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 2 (25.0%) | 197 (28.2%) | 1.0 (40.0%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 94% | |
| Antal registrerade operationer | | 1 | 593 | 1.0 | |
| Kön | Kvinnor | 1 (100%) | 296 (49.9%) | 0.8 (75.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.6 | 10.4 | 18.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 (100%) | 555 (93.6%) | 0.8 (75.0%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0.3 (25.0%) | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 (100%) | 489 (84.0%) | 1.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 1 (100%) | 543 (92.0%) | 1.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0.3 (25.0%) | |
| | Varm teknik | 1 (100%) | 339 (57.2%) | 0.8 (75.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | . (.) | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 0 | 317 (53.5%) | 0.3 (25.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | . (.) | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | . (.) | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | . (.) | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | . (.) | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | . (.) | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | . (.) | 165 (53.4%) | 0 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 0 | 281 (47.4%) | 0.3 (25.0%) | |
| | Besvären är borta | . (.) | 162 (58.1%) | 0 | |
| | Blivit ganska bra | . (.) | 89 (31.9%) | 0.3 (100%) | |
| | Besvären är kvar | . (.) | 24 (8.6%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | . (.) | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 100% | 84% | 94% | |
| Antal registrerade operationer | | 34 | 4618 | 17.8 | |
| Kön | Kvinnor | 10 (29.4%) | 1982 (42.9%) | 7.8 (43.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.4 | 5.1 | 4.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 33 (97.1%) | 4568 (98.9%) | 16.5 (93.0%) | |
| | Infektion | 1 (2.9%) | 31 (0.7%) | 1.3 (7.0%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 34 (100%) | 3905 (85.9%) | 17.8 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 30 (100%) | 4153 (90.6%) | 17.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (14.7%) | 1850 (40.1%) | 9.8 (54.9%) | |
| | Varm teknik | 29 (85.3%) | 2566 (55.6%) | 8.0 (45.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (8.8%) | 47 (1.1%) | 0.8 (4.2%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 17 (50.0%) | 2457 (53.2%) | 8.3 (46.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (6.3%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (6.3%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 5 (29.4%) | 165 (6.9%) | 1.3 (15.6%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (23.5%) | 119 (5.0%) | 2.3 (27.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (20.0%) | 1234 (52.0%) | 2.5 (35.7%) | |
| | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 15 (44.1%) | 2157 (46.7%) | 6.8 (38.0%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 7 (46.7%) | 1425 (66.3%) | 4.8 (73.1%) | |
| | Blivit ganska bra | 7 (46.7%) | 604 (28.1%) | 1.5 (23.1%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (6.7%) | 113 (5.3%) | 0.3 (3.8%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Nyköpings lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 89% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 76 | 4497 | 77.0 | |
| Kön | Kvinnor | 42 (55.3%) | 2660 (59.2%) | 47.0 (61.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 28.1 | 23.4 | 25.1 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 23 (30.3%) | 901 (20.0%) | 18.0 (23.4%) | |
| | Infektion | 51 (67.1%) | 3399 (75.6%) | 55.3 (71.8%) | |
| | Annan | 2 (2.6%) | 197 (4.4%) | 3.8 (4.9%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 67 (88.2%) | 3000 (67.3%) | 63.8 (83.1%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 36 (47.4%) | 3216 (72.1%) | 44.8 (58.1%) | |
| | Varm teknik | 37 (48.7%) | 1159 (26.0%) | 31.8 (41.2%) | |
| | Annan teknik | 3 (3.9%) | 87 (1.9%) | 0.5 (0.6%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 17 (22.4%) | 904 (20.1%) | 24.5 (31.8%) | |
| | Varm teknik | 56 (73.7%) | 3472 (77.2%) | 50.8 (65.9%) | |
| | Annan teknik | 3 (3.9%) | 121 (2.7%) | 1.8 (2.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (4.4%) | 129 (3.0%) | 1.0 (1.3%) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 43 (56.6%) | 2298 (51.1%) | 62.8 (81.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 8 (18.6%) | 323 (14.4%) | 5.3 (9.9%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 4 (9.3%) | 211 (9.5%) | 3.3 (6.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (2.3%) | 64 (2.9%) | 1.3 (2.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 11 (26.2%) | 614 (27.5%) | 15.8 (29.9%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (4.7%) | 184 (8.3%) | 5.0 (9.4%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 15 (34.9%) | 1207 (54.3%) | 9.5 (28.4%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 42 (55.3%) | 2078 (46.2%) | 53.3 (69.2%) | |
| | Besvären är borta | 31 (73.8%) | 1502 (72.8%) | 35.5 (80.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 10 (23.8%) | 478 (23.2%) | 8.0 (18.2%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (2.4%) | 72 (3.5%) | 0.3 (0.6%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0.3 (0.6%) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Sörmland ÖNH

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Nyköpings lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 89% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 9 | 1804 | 20.0 | |
| Kön | Kvinnor | 4 (44.4%) | 803 (44.5%) | 10.0 (50.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 11.7 | 7.4 | 8.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (66.7%) | 1362 (75.5%) | 11.3 (56.3%) | |
| | Infektion | 3 (33.3%) | 421 (23.3%) | 8.8 (43.8%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (66.7%) | 1262 (71.4%) | 19.5 (97.5%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 1317 (73.7%) | 3.3 (16.3%) | |
| | Varm teknik | 9 (100%) | 456 (25.5%) | 16.5 (82.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0.3 (1.3%) | |
| Blodstillnings- metod | Kall teknik | 1 (11.1%) | 672 (37.3%) | 7.8 (38.8%) | |
| | Varm teknik | 8 (88.9%) | 1066 (59.1%) | 11.0 (55.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 1.3 (6.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 5 (55.6%) | 804 (44.6%) | 16.0 (80.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (20.0%) | 46 (5.9%) | 0.5 (3.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (20.0%) | 31 (4.0%) | 0.5 (3.5%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0.3 (1.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (40.0%) | 124 (16.1%) | 2.3 (15.8%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (40.0%) | 64 (8.3%) | 0.8 (5.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (50.0%) | 403 (51.7%) | 2.0 (22.9%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 4 (44.4%) | 705 (39.1%) | 12.5 (62.5%) | |
| | Besvären är borta | 2 (50.0%) | 469 (67.1%) | 9.8 (88.6%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (25.0%) | 197 (28.2%) | 1.3 (11.4%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (25.0%) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Nyköpings lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 89% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 21 | 593 | 10.0 | |
| Kön | Kvinnor | 11 (52.4%) | 296 (49.9%) | 4.8 (47.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.7 | 10.4 | 10.3 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 20 (95.2%) | 555 (93.6%) | 9.8 (97.5%) | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 1 (4.8%) | 16 (2.7%) | 0.3 (2.5%) | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 17 (81.0%) | 489 (84.0%) | 9.3 (94.9%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0.5 (5.0%) | |
| | Varm teknik | 18 (85.7%) | 543 (92.0%) | 9.3 (92.5%) | |
| | Annan teknik | 3 (14.3%) | 33 (5.6%) | 0.3 (2.5%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 5 (23.8%) | 218 (36.8%) | 3.8 (37.5%) | |
| | Varm teknik | 14 (66.7%) | 339 (57.2%) | 3.3 (32.5%) | |
| | Annan teknik | 2 (9.5%) | 36 (6.1%) | 3.0 (30.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 9 (42.9%) | 317 (53.5%) | 8.5 (85.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0.5 (6.3%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0.3 (3.1%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0.3 (3.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (11.1%) | 23 (7.5%) | 0.8 (9.4%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0.3 (3.1%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (22.2%) | 165 (53.4%) | 1.5 (25.0%) | |
| | Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 12 (57.1%) | 281 (47.4%) | 8.3 (82.5%) |
| Besvären är borta | | 7 (58.3%) | 162 (58.1%) | 6.3 (80.6%) | |
| Blivit ganska bra | | 3 (25.0%) | 89 (31.9%) | 1.5 (19.4%) | |
| Besvären är kvar | | 2 (16.7%) | 24 (8.6%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) Nota Bene! Ingen operation utförd på Nyköpings lasarett är registrerad i kvalitetsregistret | | 89% | 84% | 82% | |
| Antal registrerade operationer | | 95 | 4618 | 63.0 | |
| Kön | Kvinnor | 37 (38.9%) | 1982 (42.9%) | 27.8 (44.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.2 | 5.1 | 5.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 95 (100%) | 4568 (98.9%) | 62.8 (99.6%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0.3 (0.4%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 79 (84.0%) | 3905 (85.9%) | 61.8 (98.0%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 7 (7.4%) | 281 (6.1%) | 0.5 (0.8%) | |
| | Varm teknik | 85 (89.5%) | 4153 (90.6%) | 61.3 (97.2%) | |
| | Annan teknik | 3 (3.2%) | 150 (3.3%) | 1.3 (2.0%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 26 (27.4%) | 1850 (40.1%) | 25.0 (39.7%) | |
| | Varm teknik | 66 (69.5%) | 2566 (55.6%) | 27.8 (44.0%) | |
| | Annan teknik | 3 (3.2%) | 202 (4.4%) | 10.3 (16.3%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (1.2%) | 47 (1.1%) | 0 | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 56 (58.9%) | 2457 (53.2%) | 51.8 (82.1%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (5.5%) | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (3.6%) | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (3.7%) | 165 (6.9%) | 2.5 (5.7%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (3.6%) | 119 (5.0%) | 0.8 (1.7%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 12 (23.1%) | 1234 (52.0%) | 8.3 (29.7%) | |
| | Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 50 (52.6%) | 2157 (46.7%) | 49.0 (77.8%) |
| Besvären är borta | | 38 (77.6%) | 1425 (66.3%) | 35.5 (86.1%) | |
| Blivit ganska bra | | 10 (20.4%) | 604 (28.1%) | 5.3 (12.7%) | |
| Besvären är kvar | | 1 (2.0%) | 113 (5.3%) | 0.5 (1.2%) | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 69% | 84% | 84% | |
| Antal registrerade operationer | | 47 | 4497 | 34.3 | |
| Kön | Kvinnor | 29 (61.7%) | 2660 (59.2%) | 21.0 (61.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 21.7 | 23.4 | 21.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 (6.4%) | 901 (20.0%) | 4.3 (12.6%) | |
| | Infektion | 44 (93.6%) | 3399 (75.6%) | 30.0 (87.4%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 47 (100%) | 3000 (67.3%) | 34.3 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 41 (100%) | 3216 (72.1%) | 34.0 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 26 (55.3%) | 904 (20.1%) | 24.0 (69.9%) | |
| | Varm teknik | 21 (44.7%) | 3472 (77.2%) | 10.0 (29.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0.3 (1.0%) | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (5.3%) | 129 (3.0%) | 0.7 (1.9%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 9 (19.1%) | 2298 (51.1%) | 8.3 (24.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (12.5%) | 323 (14.4%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 (11.1%) | 211 (9.5%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (11.1%) | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 614 (27.5%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 0.7 (8.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 3 (37.5%) | 1207 (54.3%) | 5.3 (66.7%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 15 (31.9%) | 2078 (46.2%) | 9.0 (26.2%) | |
| | Besvären är borta | 12 (80.0%) | 1502 (72.8%) | 7.7 (85.2%) | |
| | Blivit ganska bra | 3 (20.0%) | 478 (23.2%) | 1.3 (14.8%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 72 (3.5%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi + abrasio, Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 69% | 84% | 84% | |
| Antal registrerade operationer | | 14 | 1804 | 13.0 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (57.1%) | 803 (44.5%) | 5.3 (41.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.3 | 7.4 | 7.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 9 (64.3%) | 1362 (75.5%) | 7.7 (59.0%) | |
| | Infektion | 5 (35.7%) | 421 (23.3%) | 5.3 (41.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 14 (100%) | 1262 (71.4%) | 12.7 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 11 (84.6%) | 1317 (73.7%) | 11.3 (87.2%) | |
| | Varm teknik | 2 (15.4%) | 456 (25.5%) | 1.7 (12.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 10 (71.4%) | 672 (37.3%) | 10.0 (76.9%) | |
| | Varm teknik | 4 (28.6%) | 1066 (59.1%) | 3.0 (23.1%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 6 (42.9%) | 804 (44.6%) | 2.0 (15.4%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0.3 (16.7%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (80.0%) | 403 (51.7%) | 1.0 (50.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 7 (50.0%) | 705 (39.1%) | 1.7 (12.8%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 5 (71.4%) | 469 (67.1%) | 1.0 (60.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (14.3%) | 197 (28.2%) | 0.7 (40.0%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (14.3%) | 30 (4.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |
| | | | | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 69% | 84% | 84% | |
| Antal registrerade operationer | | 8 | 593 | 3.3 | |
| Kön | Kvinnor | 8 (100%) | 296 (49.9%) | 1.0 (30.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 13.4 | 10.4 | 9.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (50.0%) | 555 (93.6%) | 3.3 (100%) | |
| | Infektion | 4 (50.0%) | 22 (3.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 8 (100%) | 489 (84.0%) | 3.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 4 (50.0%) | 14 (2.4%) | 0 | |
| | Varm teknik | 4 (50.0%) | 543 (92.0%) | 3.3 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 8 (100%) | 218 (36.8%) | 2.7 (80.0%) | |
| | Varm teknik | 0 | 339 (57.2%) | 0.7 (20.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 1 (14.3%) | 3 (0.5%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 (12.5%) | 317 (53.5%) | 0.3 (10.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 165 (53.4%) | 0.3 (100%) | |
| | | | | | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 1 (12.5%) | 281 (47.4%) | 0 | |
| | Besvären är borta | 1 (100%) | 162 (58.1%) | . (.) | |
| | Blivit ganska bra | 0 | 89 (31.9%) | . (.) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 24 (8.6%) | . (.) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 4 (1.4%) | . (.) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 69% | 84% | 84% | |
| Antal registrerade operationer | | 69 | 4618 | 42.0 | |
| Kön | Kvinnor | 29 (42.0%) | 1982 (42.9%) | 18.3 (43.7%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.4 | 5.1 | 5.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 69 (100%) | 4568 (98.9%) | 42.0 (100%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 69 (100%) | 3905 (85.9%) | 41.7 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 69 (100%) | 4153 (90.6%) | 42.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 52 (75.4%) | 1850 (40.1%) | 36.0 (85.7%) | |
| | Varm teknik | 17 (24.6%) | 2566 (55.6%) | 6.0 (14.3%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0.3 (0.8%) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 27 (39.1%) | 2457 (53.2%) | 7.3 (17.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (3.7%) | 165 (6.9%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0.3 (4.5%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 13 (52.0%) | 1234 (52.0%) | 3.0 (42.9%) | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 22 (31.9%) | 2157 (46.7%) | 8.0 (19.0%) |
| Besvären är borta | | 16 (72.7%) | 1425 (66.3%) | 5.7 (70.8%) | |
| Blivit ganska bra | | 6 (27.3%) | 604 (28.1%) | 2.3 (29.2%) | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillektomi, Aleris specialistvård Handen

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 85% | 84% | 57% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 4497 | 6.5 | |
| Kön | Kvinnor | 2 | 2660 (59.2%) | 3.5 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 26.7 | 23.4 | 19.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 1 | 901 (20.0%) | 1.0 | |
| | Infektion | 4 | 3399 (75.6%) | 5.5 | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 | 3000 (67.3%) | 6.5 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 3216 (72.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 5 | 1159 (26.0%) | 6.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 1.0 | |
| | Varm teknik | 5 | 3472 (77.2%) | 5.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 2 | 2298 (51.1%) | 3.5 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 | 323 (14.4%) | 0.5 | |
| | Inlagda pga. blödning | 1 | 211 (9.5%) | 0.5 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0.5 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 | 614 (27.5%) | 0.5 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 | 1207 (54.3%) | 2.5 | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 | 2078 (46.2%) | 2.5 |
| Besvären är borta | | 1 | 1502 (72.8%) | 2.5 | |
| Blivit ganska bra | | 1 | 478 (23.2%) | 0 | |
| Besvären är kvar | | 0 | 72 (3.5%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Aleris specialistvård Handen

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 85% | 84% | 57% | |
| Antal registrerade operationer | | 6 | 4618 | 12.5 | |
| Kön | Kvinnor | 2 | 1982 (42.9%) | 5.0 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 4.4 | 5.1 | 5.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 | 4568 (98.9%) | 12.5 | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 | 3905 (85.9%) | 12.5 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 6 | 4153 (90.6%) | 12.5 | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 6 | 1850 (40.1%) | 8.5 | |
| | Varm teknik | 0 | 2566 (55.6%) | 4.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 4 | 2457 (53.2%) | 4.5 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 165 (6.9%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 119 (5.0%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 | 1234 (52.0%) | 3.5 | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 3 | 2157 (46.7%) | 6.0 |
| Besvären är borta | | 2 | 1425 (66.3%) | 3.5 | |
| Blivit ganska bra | | 1 | 604 (28.1%) | 2.5 | |
| Besvären är kvar | | 0 | 113 (5.3%) | 0 | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 80 | 4497 | 15.0 | |
| Kön | Kvinnor | 61 (76.3%) | 2660 (59.2%) | 9.0 (60.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 28.5 | 23.4 | 28.2 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 4 (5.0%) | 901 (20.0%) | 1.0 (6.7%) | |
| | Infektion | 76 (95.0%) | 3399 (75.6%) | 14.0 (93.3%) | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 80 (100%) | 3000 (67.3%) | 10.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 75 (100%) | 3216 (72.1%) | 14.0 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 80 (100%) | 904 (20.1%) | 15.0 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 3472 (77.2%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | . (.) | 129 (3.0%) | . (.) | |
| | <i>Svarande på 30 dagarsenkäten *</i> | 38 (47.5%) | 2298 (51.1%) | 2.0 (13.3%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (8.3%) | 323 (14.4%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 9 (24.3%) | 614 (27.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 2 (5.4%) | 184 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 9 (26.5%) | 1207 (54.3%) | 1.0 (50.0%) | |
| Patientnytta | <i>Svarande på 6 månadersenkäten *</i> | 30 (37.5%) | 2078 (46.2%) | 4.0 (26.7%) | |
| | Besvären är borta | 17 (58.6%) | 1502 (72.8%) | 1.0 (33.3%) | |
| | Blivit ganska bra | 11 (37.9%) | 478 (23.2%) | 2.0 (66.7%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (3.4%) | 72 (3.5%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | |
| Antal registrerade operationer | | 71 | 1804 | 17.0 | |
| Kön | Kvinnor | 38 (53.5%) | 803 (44.5%) | 12.0 (70.6%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 8.2 | 7.4 | 11.8 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 46 (64.8%) | 1362 (75.5%) | 12.0 (70.6%) | |
| | Infektion | 25 (35.2%) | 421 (23.3%) | 5.0 (29.4%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 64 (100%) | 1262 (71.4%) | 5.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 64 (100%) | 1317 (73.7%) | 3.0 (75.0%) | |
| | Varm teknik | 0 | 456 (25.5%) | 1.0 (25.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 71 (100%) | 672 (37.3%) | 17.0 (100%) | |
| | Varm teknik | 0 | 1066 (59.1%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | . (.) | 23 (1.4%) | . (.) | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 18 (25.4%) | 804 (44.6%) | 4.0 (23.5%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 3 (18.8%) | 124 (16.1%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 4 (25.0%) | 403 (51.7%) | 0 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 16 (22.5%) | 705 (39.1%) | 3.0 (17.6%) | |
| | Besvären är borta | 15 (93.8%) | 469 (67.1%) | 1.0 (33.3%) | |
| | Blivit ganska bra | 1 (6.3%) | 197 (28.2%) | 1.0 (33.3%) | |
| | Besvären är kvar | 0 | 30 (4.3%) | 1.0 (33.3%) | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 3 (0.4%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Tonsillotomi + abrasio, Doctorekliniken Älvsjö ÖNH

Klinikrapport, 2015

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 92% | 84% | 93% | | |
| Antal registrerade operationer | | 78 | 4618 | 42.0 | | |
| Kön | Kvinnor | 42 (53.8%) | 1982 (42.9%) | 21.0 (50.0%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 6.7 | 5.1 | 5.9 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 77 (98.7%) | 4568 (98.9%) | 42.0 (100%) | | |
| | Infektion | 1 (1.3%) | 31 (0.7%) | 0 | | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 72 (100%) | 3905 (85.9%) | 27.0 (100%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 67 (100%) | 281 (6.1%) | 21.0 (100%) | | |
| | Varm teknik | 0 | 4153 (90.6%) | 0 | | |
| | Annan teknik | 0 | 150 (3.3%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 78 (100%) | 1850 (40.1%) | 42.0 (100%) | | |
| | Varm teknik | 0 | 2566 (55.6%) | 0 | | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | . (.) | 47 (1.1%) | . (.) | | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 27 (34.6%) | 2457 (53.2%) | 14.0 (33.3%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 (3.8%) | 61 (2.5%) | 0 | | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 2 (8.0%) | 165 (6.9%) | 1.0 (7.1%) | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 5 (19.2%) | 119 (5.0%) | 1.0 (7.1%) | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 10 (37.0%) | 1234 (52.0%) | 2.0 (14.3%) | | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 23 (29.5%) | 2157 (46.7%) | 11.0 (26.2%) | |
| | | Besvären är borta | 12 (52.2%) | 1425 (66.3%) | 4.0 (36.4%) | |
| Blivit ganska bra | | 8 (34.8%) | 604 (28.1%) | 6.0 (54.5%) | | |
| Besvären är kvar | | 3 (13.0%) | 113 (5.3%) | 1.0 (9.1%) | | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 6 (0.3%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 42 | 4497 | 23.0 | |
| Kön | Kvinnor | 25 (59.5%) | 2660 (59.2%) | 15.0 (65.2%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 24.9 | 23.4 | 21.6 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 3 (7.1%) | 901 (20.0%) | 4.0 (17.4%) | |
| | Infektion | 38 (90.5%) | 3399 (75.6%) | 19.0 (82.6%) | |
| | Annan | 1 (2.4%) | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 41 (100%) | 3000 (67.3%) | 22.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 7 (16.7%) | 3216 (72.1%) | 10.0 (43.5%) | |
| | Varm teknik | 35 (83.3%) | 1159 (26.0%) | 13.0 (56.5%) | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 42 (100%) | 3472 (77.2%) | 23.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 3 (7.3%) | 129 (3.0%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 23 (54.8%) | 2298 (51.1%) | 8.0 (34.8%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 3 (13.6%) | 323 (14.4%) | 1.0 (12.5%) | |
| | Inlagda pga. blödning | 2 (9.5%) | 211 (9.5%) | 1.0 (14.3%) | |
| | Reopererats pga. blödning | 1 (5.0%) | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 6 (26.1%) | 614 (27.5%) | 3.0 (37.5%) | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 4 (17.4%) | 184 (8.3%) | 1.0 (14.3%) | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 18 (81.8%) | 1207 (54.3%) | 7.0 (87.5%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 23 (54.8%) | 2078 (46.2%) | 12.0 (52.2%) | |
| | Besvären är borta | 18 (78.3%) | 1502 (72.8%) | 5.0 (41.7%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (17.4%) | 478 (23.2%) | 7.0 (58.3%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (4.3%) | 72 (3.5%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 10 (0.5%) | 0 | |

*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 5 | 1804 | 4.0 | |
| Kön | Kvinnor | 1 (20.0%) | 803 (44.5%) | 3.0 (75.0%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 9.7 | 7.4 | 21.5 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 2 (40.0%) | 1362 (75.5%) | 1.0 (25.0%) | |
| | Infektion | 3 (60.0%) | 421 (23.3%) | 3.0 (75.0%) | |
| | Annan | 0 | 21 (1.2%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 5 (100%) | 1262 (71.4%) | 4.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 (20.0%) | 1317 (73.7%) | 2.0 (50.0%) | |
| | Varm teknik | 4 (80.0%) | 456 (25.5%) | 2.0 (50.0%) | |
| | Annan teknik | 0 | 13 (0.7%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 1 (20.0%) | 672 (37.3%) | 0 | |
| | Varm teknik | 4 (80.0%) | 1066 (59.1%) | 4.0 (100%) | |
| | Annan teknik | 0 | 66 (3.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 23 (1.4%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 (20.0%) | 804 (44.6%) | 1.0 (25.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 46 (5.9%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (4.0%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 9 (1.2%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 124 (16.1%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 64 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 1 (100%) | 403 (51.7%) | 1.0 (100%) | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 0 | 705 (39.1%) | 0 | |
| | Besvären är borta | . (.) | 469 (67.1%) | . (.) | |
| | Blivit ganska bra | . (.) | 197 (28.2%) | . (.) | |
| | Besvären är kvar | . (.) | 30 (4.3%) | . (.) | |
| | Besvären har förvärrats | . (.) | 3 (0.4%) | . (.) | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 40% | | |
| Antal registrerade operationer | | 6 | 593 | 3.0 | | |
| Kön | Kvinnor | 3 (50.0%) | 296 (49.9%) | 1.0 (33.3%) | | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 7.4 | 10.4 | 6.9 | | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 6 (100%) | 555 (93.6%) | 3.0 (100%) | | |
| | Infektion | 0 | 22 (3.7%) | 0 | | |
| | Annan | 0 | 16 (2.7%) | 0 | | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 6 (100%) | 489 (84.0%) | 3.0 (100%) | | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 14 (2.4%) | 0 | | |
| | Varm teknik | 6 (100%) | 543 (92.0%) | 3.0 (100%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 33 (5.6%) | 0 | | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 218 (36.8%) | 0 | | |
| | Varm teknik | 6 (100%) | 339 (57.2%) | 3.0 (100%) | | |
| | Annan teknik | 0 | 36 (6.1%) | 0 | | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 3 (0.5%) | 0 | | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 3 (50.0%) | 317 (53.5%) | 1.0 (33.3%) | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 4 (1.3%) | 0 | | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 3 (1.0%) | 0 | | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 0 | 23 (7.5%) | 0 | | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 8 (2.6%) | 0 | | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 2 (100%) | 165 (53.4%) | 1.0 (100%) | | |
| | Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 2 (33.3%) | 281 (47.4%) | 2.0 (66.7%) | |
| | | Besvären är borta | 1 (50.0%) | 162 (58.1%) | 2.0 (100%) | |
| Blivit ganska bra | | 1 (50.0%) | 89 (31.9%) | 0 | | |
| Besvären är kvar | | 0 | 24 (8.6%) | 0 | | |
| Besvären har förvärrats | | 0 | 4 (1.4%) | 0 | | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | 95% | 84% | 40% | |
| Antal registrerade operationer | | 23 | 4618 | 16.0 | |
| Kön | Kvinnor | 9 (39.1%) | 1982 (42.9%) | 6.0 (37.5%) | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 5.6 | 5.1 | 5.4 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 23 (100%) | 4568 (98.9%) | 15.0 (93.8%) | |
| | Infektion | 0 | 31 (0.7%) | 1.0 (6.3%) | |
| | Annan | 0 | 19 (0.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 23 (100%) | 3905 (85.9%) | 16.0 (100%) | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 0 | 281 (6.1%) | 1.0 (6.3%) | |
| | Varm teknik | 21 (91.3%) | 4153 (90.6%) | 13.0 (81.3%) | |
| | Annan teknik | 2 (8.7%) | 150 (3.3%) | 2.0 (12.5%) | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 2 (8.7%) | 1850 (40.1%) | 1.0 (6.3%) | |
| | Varm teknik | 21 (91.3%) | 2566 (55.6%) | 15.0 (93.8%) | |
| | Annan teknik | 0 | 202 (4.4%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 47 (1.1%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 14 (60.9%) | 2457 (53.2%) | 4.0 (25.0%) | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 0 | 61 (2.5%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 31 (1.3%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 2 (0.1%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 (7.1%) | 165 (6.9%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 1 (7.7%) | 119 (5.0%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 13 (92.9%) | 1234 (52.0%) | 3.0 (75.0%) | |
| | Svarande på 6 månadersenkäten * | 11 (47.8%) | 2157 (46.7%) | 4.0 (25.0%) | |
| Patientnytta | Besvären är borta | 5 (50.0%) | 1425 (66.3%) | 2.0 (50.0%) | |
| | Blivit ganska bra | 4 (40.0%) | 604 (28.1%) | 2.0 (50.0%) | |
| | Besvären är kvar | 1 (10.0%) | 113 (5.3%) | 0 | |
| | Besvären har förvärrats | 0 | 6 (0.3%) | 0 | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

| Data från kvalitetsregistret för tonsilloperationer 160822. | | Kliniken 2015 Antal (andel) | Nationen 2015 Antal (andel) | Kliniken 2011-2014 Medelvärde (andel) | Trendjämförelser 2011-2015 relativa mått. Kliniken grön streckad, nationen blå heldragen. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen) | | ej tillgänglig | 84% | . | |
| Antal registrerade operationer | | 1 | 4497 | 1.0 | |
| Kön | Kvinnor | 0 | 2660 (59.2%) | 0 | |
| Ålder | Medelålder vid operation | 39.4 | 23.4 | 40.7 | |
| Indikation | Obstruktion/snarkning | 0 | 901 (20.0%) | 1.0 | |
| | Infektion | 1 | 3399 (75.6%) | 0 | |
| | Annan | 0 | 197 (4.4%) | 0 | |
| Vårdform | Dagkirurgi | 1 | 3000 (67.3%) | 1.0 | |
| Operationsteknik | Kall teknik | 1 | 3216 (72.1%) | 1.0 | |
| | Varm teknik | 0 | 1159 (26.0%) | 0 | |
| | Annan teknik | 0 | 87 (1.9%) | 0 | |
| Blodstillningsmetod | Kall teknik | 0 | 904 (20.1%) | 0 | |
| | Varm teknik | 1 | 3472 (77.2%) | 1.0 | |
| | Annan teknik | 0 | 121 (2.7%) | 0 | |
| Komplikationer | Blödning under vårdtiden | 0 | 129 (3.0%) | 0 | |
| | Svarande på 30 dagarsenkäten * | 1 | 2298 (51.1%) | 1.0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. blödning | 1 | 323 (14.4%) | 0 | |
| | Inlagda pga. blödning | 0 | 211 (9.5%) | 0 | |
| | Reopererats pga. blödning | 0 | 64 (2.9%) | 0 | |
| | Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta | 1 | 614 (27.5%) | 0 | |
| | Behandlats med antibiotika pga. postoperativ infektion | 0 | 184 (8.3%) | 0 | |
| | Tagit del av informationen på tonsilloperation.se | 0 | 1207 (54.3%) | 0 | |
| Patientnytta | Svarande på 6 månadersenkäten * | 0 | 2078 (46.2%) | 0 | |
| | Besvären är borta | . | 1502 (72.8%) | . | |
| | Blivit ganska bra | . | 478 (23.2%) | . | |
| | Besvären är kvar | . | 72 (3.5%) | . | |
| | Besvären har förvärrats | . | 10 (0.5%) | . | |

*) Svarshänsyn Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

Terminologi i tonsillenkäterna

AV: OLA SUNNERGREN, JOACIM STALFORS, ELISABETH ERICSSON, CLAES HEMLIN, LOTTA HESSÉN SÖDERMAN, ERIK ODHAGEN OCH PIA NERFELDT

Här finns samlat några av de termer som används i enkäterna i tonsillregistret. En förutsättning till att kunna tolka och använda data är att vi använder samma betydelse för indikatorer som registreras. Läs gärna igenom denna sida och diskutera på kliniken hur ni registrerar.

Indikation

Följande definitioner av indikation för tonsilloperation används:

Luftvägsobstruktion/snarkning/hypertrofa tonsiller:

Tonsillorsakad andningsstörning under sömn.

Upprepade tonsilliter: Minst tre episoder av akut tonsillit de senaste 12 månaderna

Peritonsillit: Incipient halsoöld eller halsoöld med pus som opereras akut alternativt om indikationen är tidigare genomgångna peritonsilliter.

Kronisk tonsillit: Långvarig inflammation i tonsillerna (minst 3 mån) av den grad att dagliga aktiviteter påverkas.

Systemkomplikation till tonsillit: Systemisk sjukdom som förvärras av utbrott av tonsillit, ex. psoriasis.

Operationstekniker

Ett flertal olika operationstekniker används i Sverige vid tonsilloperation. Följande operationstekniker kan registreras i kvalitetsregistret:

Kallt stål – Dissektionen utförs med ”kalla” instrument ex. kniv, sax eller elevatorium.

Radiofrekvens – Gemensamt för alla radiofrekvenstekniker är att radiofrekvensenergi används för att uppnå en skärande och koagulerande effekt.

En genomgång av Lisa Hellgård under 2014 visar att fyra olika radiofrekvensinstrument används:

- Arthrocare- Coblation®
- Ellman-Surgitron®
- Sutter-Curis®
- Olympus- Celon

Diatermisax – Operationen utförs med sax som samtidigt kan leverera bipolär diatermi över saxens skänklar. Instrumentet kan därigenom dela och koagulera vävnad simultant.

Ultracision – Harmonic Scalpel®. Operationen utförs med ett instrument som simultant delar och koagulerar vävnad. Tekniken baseras på ultraljudsvibrationer.

Dissektion med bipolär diatermi – Tonsillerna dissekeras bort med bipolär diatermi.

Annan – För att få kännedom om vilka ytterligare tekniker som används finns ett ”Annan-fält”. Informationen i detta fält kommer ligga till grund för framtida revisioner.

Blodstillningsmetoder

Ett flertal olika tekniker, utöver kompression, för att uppnå hemostas används i Sverige vid tonsilloperation. Följande blodstillningsmetoder kan registreras i kvalitetsregistret:

Infiltrationsanestesi med adrenalin – Hemostaseffekten uppnås genom adrenalinets kärlkonstringerande effekt.

Unipolär (monopolär) diatermi – Hemostaseffekten uppnås genom värmeokoagulation av kärl. Ström leds genom patientens vävnader till en neutralplatta.

Bipolär diatermi – Hemostaseffekten uppnås genom värmeokoagulation av kärl. Bipolära instrument (sax, pincett etc.) har två poler där strömmen leds från den ena till den andra polen. Ström passerar inte genom patientens övriga vävnader.

Ligatur – Med detta avses en knyttligatur av ”tonsillstjälk” som typiskt kan uppstå i tonsillens nedre pol. Tanken är att en bunt med kärl stängs genom ligaturen. Kan också innebära knut kring blödande kärl.

Suturligatur – Med detta avses en omstickning, dvs. en djup sutur med nål i mjukvävnaden.

Radiofrekvens – Blodstillning med radiofrekvensinstrument, tex coblation eller RF-pincett.

Därutöver finns alternativet ”Annan”.

Blödningskomplikationer

På den peroperativa enkäten registreras blödningskomplikation. Här anges om postoperativ blödningskomplikation har uppstått och krävt åtgärd under vårdtiden i samband med det operativa ingreppet. Med postoperativ blödning menas att blödningen uppstått efter att patienten extuberats.

På enkäten skall den åtgärd som vidtagits för att stoppa blödning registreras. Dessa är: cyklokapron/octostim, transfusion, stillande av blödning i narkos respektive Annat. Flera alternativ är möjliga att registrera. Profylaktiskt givet läkemedel för att minska risken för blödning skall inte registreras.

Årsrapport 2015

– Grav hörselnedsättning hos vuxna

PER-INGE CARLSSON

REGISTRET FÖR GRAV HÖRSELNEDSÄTTNING HOS VUXNA

Definitionen på grav hörselnedsättning hos vuxna är att man i hörseltest uppnår tonmedelvärde 70 dB eller sämre på bästa örat eller att taluppfattningen är sämre än 50 %. Med hörapparater och utan läppavläsningsstöd uppfattar patienter med grav hörselnedsättning inte ord och meningar från en meters håll i vardagsmiljö.


Registret syftar till att förbättra rehabilitering för dem med de svåraste hörselnedsättningarna. Med hjälp av data som samlas in från patienter och personal kan man dra slutsatser om hur bra rehabiliteringen fungerar. Registerdata är en utgångspunkt för förbättringsarbeten.

Registret hittas på www.orlqualitysweden.se

Viktiga variabler och målvärden


Kvalitetsregistret ger möjlighet till att studera ett stort antal variabler, de viktigaste är; (För mer detaljerad information, se Årsrapporten i supplementnummer till ÖNH-Tidskriften)

1. PIRS en skattningsskala som anger hur mycket hörselnedsättningen påverkar det dagliga livet




En grav hörselnedsättning försämrar inte bara möjligheterna till kommunikation, utan påverkar även annat socialt samspel och livskvalitet. Här visas hur patienterna skattar sin situation. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktisk. Skattningen görs med skalan PIRS som går från 0 till 100. 0 motsvarar att hörselnedsättningen inte påverkar det dagliga livet alls (bästa tänkbara tillstånd) och 100 motsvarar att hörselnedsättningen påverkar allt (värsta tänkbara tillstånd). Målvärdet är att minst 80 % av patienterna anger ett värde under 70 på skalan. Det är av största vikt att vårdgivaren identifierar de patienter som anger värden över 70, undersöker orsakerna till detta och erbjuder ytterligare rehabiliteringsinsatser.

2. Andel patienter som deltagit i utvidgad rehabilitering




Här visas vilken nytta personer med grav hörselnedsättning upplever att de haft av hörselvårdens insatser. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktisk. Målvärdet är att minst 80 % av patienterna ska ha haft god eller mycket god nytta av hörselvårdens insatser.

3. Nyttan av hörselvårdens insatser



För många personer med grav hörselnedsättning är det av stor vikt att få utvidgad rehabilitering. Det innebär att man får mer stöd än teknisk rehabilitering, det vill säga hörapparat och annan teknisk utrustning. Det kan finnas behov av kontakt med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, logoped etc. Här visas hur stor andel av patienterna som fått utvidgad rehabilitering. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktisk. Målvärdet är att minst 80 % av patienterna ska få utvidgad rehabilitering.

4. Kokleaimplantat



Här visas hur stor andel av personerna med grav hörselnedsättning som har kokleaimplantat i minst ett öra. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktisk.

Forskning och utveckling

Vetenskaplig produktion

Förutom att vara ett viktigt verktyg i uppföljningen av den audiologiska rehabiliteringen är det av största vikt att bedriva forskning och utveckling utifrån registerdata. Hittills har registerarbetet genererat, två examensarbeten på avancerad nivå samt två avhandlingsarbeten som pågår. I de två avhandlingsarbeten som är knutna till Örebro Universitet och Karolinska Institutet är sammanlagt åtta vetenskapliga artiklar planerade utifrån registerdata, två artiklar är publicerade (1,2) och en artikel är accepterad (3).

Prevalens

Utifrån registerdata har vi också kunnat ta fram prevalensen för patienter med grav hörselnedsättning i Sverige som ligger på 0,2 % dvs ca 20 000 patienter. Det här är helt ny kunskap och en tämligen unik kunskap eftersom prevalensen är mycket osäker i de allra flesta andra länder. Siffrorna valideras nu ytterligare och kommer inom kort att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Enkäter

I kvalitetsregistret pågår för närvarande arbetet med att stänga *kartläggningen*. Detta är en omfattande enkät som använts sedan registret startade för 10 år sedan. Det finns cirka 4 500 besvarade enkäter. Ett projekt som ingår i valideringen av prevalensen för patientgrup-

pen i landet har pågått under året. Utskick av kartläggningsenkäter har påbörjats till de patienter som ännu inte erhållit eller svarar på enkäten. Vi räknar med att det finns 20 000 vuxna patienter totalt med grav hörselnedsättning och vi har 4 5000 besvarade enkäter idag. Med en svarsfrekvens på 60% på resterande 15 500 utskickade enkäter kommer vi sammanlagt att närma oss 14 000 enkäter som kan analyseras. Registret innehåller en mängd demografiska data, hörsel- och rehabiliteringsdata samt livskvalitetsmått. Vår bedömning är att analyserna kommer att leda till 2–3 vetenskapliga artiklar som kommer att utgöra en viktig kunskapsbank för patientgruppen med grav hörselnedsättning i Sverige. Kartläggningsenkätens resultat kommer också att sammanfattas i en rapport förutom de vetenskapliga produktionerna, rapporten kommer att finnas tillgänglig via hemsidan.

Kartläggningsenkäten har ersatts av en *baselineenkät* och en *uppföljningsenkät*. Baselineenkäten fylls i då en ny rehabiliteringsinsats påbörjas och uppföljningsenkäten skickas ut till patienterna ett år därefter. I årsrapporten redovisas endast resultat från kartläggningsenkäten.

Klinikbesök

Varje klinik som registrerar patienter i kvalitetsregistret har en kontaktperson. Referensgruppen har kontinuerlig kontakt med dessa personer och besöker också många av klinikerna under året. Klinikbesöken är en viktig del i utvecklingen av registret genom validering av data, ökning av täckningsgraden och ge support i enkätarbetet. Vid besöken går man också igenom klinikens utdata och diskuterar förbättringsområden.

Täckningsgrad

Täckningsgraden vid kartläggningsenkätens stängning var 22%. Beräkningen baseras på 20 000 patienter med grav hörselnedsättning och 4 494 registreringar. Under hösten 2016 skickas enkäter till 15 500 patienter och vi räknar med att efter detta ha totalt ca 14 000 besvarade enkäter (se ovan). Om detta uppfylls blir den slutliga täckningsgraden för kartläggningsenkäten 70%.

Referenser

1. Severe to profound hearing impairment: quality of life, psychosocial consequences and audiological rehabilitation. Carlsson PI, Hjalldahl J, Magnuson A, Ternevall E, Edén M, Skagerstrand Å, Jönsson R. *Disabil Rehabil* 2015;37(20):1849-56.
2. Patients with severe to profound hearing impairment with severe vision impairment: A quality of life study.

Satu Turunen-Taheri*□ Åsa Skagerstrand† Sten Hellström□ Per-Inge Carlsson∞†

Acta Otolaryngologica. Print online September 2016. <http://dx.doi.org/10.1080/00016489.2016.1229025>

3. Severe to profound hearing impairment: Factors associated with the use of hearing aids and cochlear implants and participation in extended audiological rehabilitation.

Jennie Hjalldahl *□† Stephen Widén □ Per-Inge Carlsson

Accepterad i *Hearing, Balance and Communication*, September 2016.

Referensgrupp

Per-Inge Carlsson, ordförande, överläkare och medicine doktor
per-inge.carlsson@liv.se

Elisabeth Ternevall, överläkare
elisabeth.ternevall@karolinska.se

Margareta Edén, audionom
margareta.eden@vgregion.se

Radi Jönsson, överläkare och medicine doktor
radoslava.jonsson@vgregion.se

Satu Turunen-Taheri, audionom
satu.turunen.taheri@karolinska.se

Åsa Skagerstrand, audionom
asa.skagerstrand@regionorebrolan.se

Madelene Österberg, hörselpedagog
madelene.osterberg@ltblekinge.se

Jennie Hjalldahl, forskningsaudionom
jennie.hjalldahl@regionorebrolan.se

Representant för Hörselskadades Riksförbund

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

Det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering omfattar hörselrehabiliteringar med hörapparat. Registret är en del av de nationella kvalitetsregistren. Registret är ett delregister under Nationellt kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård.

Introduktion

De nationella kvalitetsregistren används löpande för lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

Kvalitetsregistret ger värdefullt information till vårdgivaren som kan användas vid uppföljning och utveckling av verksamheten.

Hur uppföljningen av den grundläggande rehabiliteringen ska utformas finns specificerat i en europeisk standard (SIS 2010). Registret följer de rekommenderade arbetsmetoderna.

Registret hanteras och utvecklas av Forskningsinstitutet Hörselbron i samråd med en referensgrupp.

Resultat

Täckningsgrad

Totala täckningsgraden för registret är 93 procent. Täckningsgraden för alla landsting utom Stockholm är 100 procent, för Stockholm är täckningsgraden 75 procent.

Resultaten är uppdelade i tre nivåer, nationell nivå och landstingsnivå.

För att lättare överblicka resultaten har vissa frågor som är relaterade till varandra slagits samman till en indikator. Nedan beskrivs de tre indikatorer som används.

Definition av indikatorer

Indikator - Tillfredsställelse

Indikatorn Tillfredsställelsen är huvudindikator och den viktigaste indikatorn. Den beräknas som medelvärdet för samtliga frågor i IOI-HA delen av enkäten, fråga 3-9. Medelvärdet beskriver det totala nyttan eller tillfredsställelsen som patienten upplever efter rehabiliteringen.

Indikator - Kontakt/Delaktighet

Indikatorn beräknas som medelvärdet för frågorna 16-20. Medelvärdet Kontakt/Information beskriver hur in-


formationsprocessen till patienten fungerar och hur personalen bemöter patienten.

Indikator - Funktion

Indikatorn beräknas som medelvärde för frågorna 11-14. Indikatorn anger hur patienten uppfattar hörapparatens funktion. Funktionen hos hörapparatens påverkas av hur den ställs in av audionomen och vilken modell som används. Patienten anger hur väl hörapparatens fungerar kring återkoppling, ljudkvalitet, obehagligt starka ljud och vid kommunikation i buller och i sociala sammanhang.

Nationella resultat

Åldersfördelningen för män och kvinnor redovisas i Figur 1. Andelen kvinnor är dominerande de övre åldersgrupperna (80-89, 90+) medan männen är fler i åldersgrupperna 60-69 och 70-79.



Figur 1 Åldersfördelning för män och kvinnor i kvalitetsregistret 2015.

Nationella värden

Nationella värden för indikatorerna redovisas i tabellen nedan.

| Indikator | Medel | Std | N | Män | | Kvinnor | |
|---------------------|-------|------|-------|-------|------|---------|------|
| | | | | Medel | Std | Medel | Std |
| Tillfredsställelse | 3.82 | 0.73 | 91263 | 3.81 | 0.72 | 3.84 | 0.75 |
| Kontakt/Information | 4.17 | 0.71 | 91267 | 4.17 | 0.68 | 4.18 | 0.74 |
| Funktion | 3.64 | 0.72 | 91267 | 3.64 | 0.70 | 3.65 | 0.75 |

Tabell 2 Nationella värden för indikatorerna, Tillfredsställelse, Kontakt/Information och Funktion. Data från åren 2012–2015.


Resultat uppdelat i landsting

Resultat uppdelat i landsting där samtliga kliniker i landstinget inkluderas och samtliga patientgrupper ingår.

Tillfredsställelse

| County | Value | CI low (95%) | CI high (95%) | Std | Age | PTA (dB) | Bilateral (%) | First time (%) | Value (Male) | Value (Female) | N (respondent) | N | Response rate (%) |
|----------------|-------|--------------|---------------|------|-----|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| KALMAR | 3.92 | 3.88 | 3.96 | 0.67 | 74 | 45 | 84 | 43 | 3.89 | 3.96 | 1188 | 2099 | 57 |
| JÖNKÖPING | 3.86 | 3.83 | 3.89 | 0.70 | 74 | | 85 | 39 | 3.84 | 3.89 | 2031 | 3652 | 56 |
| DALARNA | 3.85 | 3.82 | 3.89 | 0.72 | 74 | 47 | 77 | 34 | 3.83 | 3.89 | 1938 | 3071 | 63 |
| ÖREBRO | 3.84 | 3.81 | 3.87 | 0.70 | 72 | | 79 | 42 | 3.82 | 3.87 | 1973 | 3204 | 62 |
| HALLAND | 3.84 | 3.81 | 3.87 | 0.74 | 74 | | 80 | 39 | 3.83 | 3.86 | 1848 | 3135 | 59 |
| VÄSTMANLAND | 3.84 | 3.79 | 3.88 | 0.73 | 73 | 46 | 70 | 43 | 3.81 | 3.87 | 910 | 1503 | 61 |
| SKÅNE | 3.83 | 3.81 | 3.85 | 0.76 | 74 | | 87 | 41 | 3.82 | 3.84 | 5012 | 8954 | 56 |
| ÖSTERGÖTLAND | 3.82 | 3.79 | 3.85 | 0.72 | 74 | 49 | 79 | 38 | 3.80 | 3.85 | 2160 | 3519 | 61 |
| KRONOBERG | 3.81 | 3.76 | 3.86 | 0.71 | 74 | | 82 | 29 | 3.78 | 3.85 | 825 | 1433 | 58 |
| VÄSTERNORRLAND | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 0.76 | 73 | 48 | 74 | 35 | 3.76 | 3.88 | 1344 | 2089 | 64 |
| VÄRMLAND | 3.80 | 3.77 | 3.84 | 0.73 | 75 | | 80 | 39 | 3.80 | 3.80 | 1515 | 2448 | 62 |
| UPPSALA | 3.79 | 3.76 | 3.82 | 0.72 | 74 | | 85 | 34 | 3.76 | 3.83 | 1688 | 2918 | 58 |
| STOCKHOLM | 3.72 | 3.70 | 3.74 | 0.75 | 74 | 46 | 86 | 37 | 3.74 | 3.71 | 5473 | 10242 | 53 |

Tabell 4 Medelvärde för indikatorn Tillfredsställelse, IOI-HA. Fråga 3-9. Kolumnerna i tabellen visar i ordning: landsting, värde på indikator, undre gräns för konfidensintervall, över gräns för konfidensintervall, standardavvikelse, ålder, tonmedelvärde, andelen bilaterala utprovningar, andelen förstagångsförskrivningar, värde för män, värde för kvinnor, antal respondenter, antal utskick och svarsfrekvens.




Tabell 5 Konfidensintervall för indikatorn Tillfredsställelse, IOI-HA. Fråga 3-9.

Kontakt/Information

| County | Value | CI low (95%) | CI high (95%) | Std | Age | PTA (dB) | Bilateral (%) | First time (%) | Value (Male) | Value (Female) | N (respondent) | N | Response rate (%) |
|----------------|-------|--------------|---------------|------|-----|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| KALMAR | 4.33 | 4.30 | 4.37 | 0.60 | 74 | 45 | 84 | 43 | 4.34 | 4.33 | 1188 | 2099 | 57 |
| HALLAND | 4.26 | 4.23 | 4.29 | 0.66 | 74 | | 80 | 39 | 4.29 | 4.23 | 1848 | 3135 | 59 |
| ÖREBRO | 4.26 | 4.23 | 4.29 | 0.66 | 72 | | 79 | 42 | 4.25 | 4.27 | 1973 | 3204 | 62 |
| DALARNA | 4.24 | 4.21 | 4.27 | 0.66 | 74 | 47 | 77 | 34 | 4.22 | 4.26 | 1938 | 3071 | 63 |
| JÖNKÖPING | 4.23 | 4.20 | 4.26 | 0.65 | 74 | | 85 | 39 | 4.25 | 4.21 | 2031 | 3652 | 56 |
| VÄRMLAND | 4.21 | 4.17 | 4.24 | 0.68 | 75 | | 80 | 39 | 4.19 | 4.23 | 1515 | 2448 | 62 |
| VÄSTMANLAND | 4.20 | 4.16 | 4.25 | 0.67 | 73 | 46 | 70 | 43 | 4.20 | 4.20 | 910 | 1503 | 61 |
| SKÅNE | 4.19 | 4.17 | 4.21 | 0.70 | 74 | | 87 | 41 | 4.19 | 4.19 | 5012 | 8954 | 56 |
| ÖSTERGÖTLAND | 4.18 | 4.15 | 4.20 | 0.65 | 74 | 49 | 79 | 38 | 4.16 | 4.20 | 2160 | 3519 | 61 |
| KRONOBERG | 4.18 | 4.13 | 4.22 | 0.66 | 74 | | 82 | 29 | 4.18 | 4.17 | 825 | 1433 | 58 |
| VÄSTERNORRLAND | 4.17 | 4.13 | 4.20 | 0.70 | 73 | 48 | 74 | 35 | 4.13 | 4.21 | 1344 | 2089 | 64 |
| UPPSALA | 4.12 | 4.09 | 4.15 | 0.70 | 74 | | 85 | 34 | 4.10 | 4.15 | 1688 | 2918 | 58 |
| STOCKHOLM | 4.03 | 4.01 | 4.05 | 0.75 | 74 | 46 | 86 | 37 | 4.03 | 4.02 | 5473 | 10242 | 53 |

Tabell 6 Medelvärde för indikator Kontakt/Information. Fråga 16-20. Kolumnerna i tabellen visar i ordning: landsting, värde på indikator, undre gräns för konfidensintervall, över gräns för konfidensintervall, standardavvikelse, ålder, tonmedelvärde, andelen bilaterala utprovningar, andelen förstagångsförskrivningar, värde för män, värde för kvinnor, antal respondenter, antal utskick och svarsfrekvens.




Tabell 7 Konfidensintervall för indikator Kontakt/Information. Fråga 16-20.

Funktion

| County | Value | CI low (95%) | CI high (95%) | Std | Age | PTA (dB) | Bilateral (%) | First time (%) | Value (Male) | Value (Female) | N (respondent) | N | Response rate (%) |
|----------------|-------|--------------|---------------|------|-----|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| ÖREBRO | 3.70 | 3.67 | 3.73 | 0.71 | 72 | | 79 | 42 | 3.68 | 3.73 | 1973 | 3204 | 62 |
| DALARNA | 3.70 | 3.67 | 3.73 | 0.72 | 74 | 47 | 77 | 34 | 3.69 | 3.72 | 1938 | 3071 | 63 |
| JÖNKÖPING | 3.69 | 3.66 | 3.72 | 0.71 | 74 | | 85 | 39 | 3.69 | 3.69 | 2031 | 3652 | 56 |
| HALLAND | 3.69 | 3.66 | 3.72 | 0.71 | 74 | | 80 | 39 | 3.68 | 3.70 | 1848 | 3135 | 59 |
| SKÅNE | 3.69 | 3.67 | 3.71 | 0.73 | 74 | | 87 | 41 | 3.68 | 3.70 | 5012 | 8954 | 56 |
| KRONOBERG | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 0.72 | 74 | | 82 | 29 | 3.64 | 3.67 | 825 | 1433 | 58 |
| VÄSTMANLAND | 3.64 | 3.60 | 3.69 | 0.72 | 73 | 46 | 70 | 43 | 3.63 | 3.65 | 910 | 1503 | 61 |
| KALMAR | 3.64 | 3.60 | 3.68 | 0.71 | 74 | 45 | 84 | 43 | 3.62 | 3.67 | 1188 | 2099 | 57 |
| UPPSALA | 3.64 | 3.61 | 3.68 | 0.70 | 74 | | 85 | 34 | 3.62 | 3.68 | 1688 | 2918 | 58 |
| VÄRMLAND | 3.63 | 3.59 | 3.66 | 0.71 | 75 | | 80 | 39 | 3.61 | 3.64 | 1515 | 2448 | 62 |
| STOCKHOLM | 3.62 | 3.60 | 3.64 | 0.72 | 74 | 46 | 86 | 37 | 3.64 | 3.59 | 5473 | 10242 | 53 |
| ÖSTERGÖTLAND | 3.60 | 3.57 | 3.63 | 0.72 | 74 | 49 | 79 | 38 | 3.60 | 3.59 | 2160 | 3519 | 61 |
| VÄSTERNORRLAND | 3.59 | 3.55 | 3.63 | 0.75 | 73 | 48 | 74 | 35 | 3.57 | 3.63 | 1344 | 2089 | 64 |

Tabell 8 Medelvärde för indikator funktion. Fråga 11-14. Kolumnerna i tabellen visar i ordning: landsting, värde på indikator, undre gräns för konfidensintervall, över gräns för konfidensintervall, standardavvikelse, ålder, tonmedelvärde, andelen bilaterala utprovningar, andelen förstagångsförskrivningar, värde för män, värde för kvinnor, antal respondenter, antal utskick och svarsfrekvens.



Tabell 9 Konfidensintervall för indikator funktion. Fråga 11-14.

Referenser

Arlinger, Stig. 2005. "Translations of the International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA). Svensk version." Audionytt 3.

Hörselvårdstjänster, SIS/TK 523. 2010. "Tjänster vid utprovning av hörapparater, SS-EN 15927:2010."

Vill du uppdateras med vårt nyhetsbrev?

Nyhetsbrevet kommer till din mail några gånger per år och visar vad som hänt i ÖNH-registret senaste tiden.

Brevet är avsett att underlätta registreringsförfarandet samt att ge information och inspiration till vad kvalitetsregisterdata visar och kan användas till.

För att få nyhetsbrevet till din inkorg - skicka en intresseanmälan till onh@registercentrum.se!

